

as front page 18/5



L'AGRICOLTORE
SPERIMENTATO,
OVVERO
REGOLE GENERALI
SOPRA L'AGRICOLTURA,

Coltivazione delle Viti, e degl' Alberi d' ogni sorta, principalmente degli Ulivi, Gelli ec. Seminazion de' Terreni, e Fattura di Vini, all' uso di varie Provincie, con un Trattato sopra i Bachi da Seta, ed un altro sopra l' Api

DI COSIMO TRINCI
PISTOJESE.

S' aggiugne quanto hanno scritto M. BIDET sopra le Viti; Fr. AGOSTINO MANDIROLA, riguardo a' Giardini, e ZACCHARIA BETTI nel suo Trattato sopra la Ruca de' Meli; oltre altri Opuscoli appartenenti all' Agricoltura, tratti dalli Giornali più accreditati d' Europa.

O P E R A

ACCRESCIUTA IN QUESTA QUARTA EDIZIONE

*Di un' Appendice che contiene un nuovo Ritrovato
d' ingrassare il Terreno.*

E DI VARIE FIGURE ADORNATA



IN VENEZIA, MDCCLXXVIII.

PRESSO GIOVANNI GATTI.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.



L E T T O R E.

L'Agricoltura, che dovea essere, più che occupazione, divertimento dell' Uomo nello stato dell' innocenza, fu della disubbidienza del primo nostro Padre la pena. Questa pena però si è studiato mai sempre di rendersela non solo meno gravosa, ma deliziosa eziandio a tutta unitamente la posterità de' l' infelice Progenitore. Quindi è, che in tutte l'età le persone non solo d' oscuro sangue nate, e in mezzo agli stenti della Campagna nudrite, la praticarono; ma nobili ancora, e fra gli agi allevate della Città: e quelli fino d' impiegare nella medesima l' opera loro non ildegnarono, che l' antichità per altre molte gloriose gesta, stimò doverli nel più alto, e ragguardevole grado e degli Eroi, e degli Dei collocare. Quello poi, che più dee risvegliare la maraviglia per l' Agricoltura, e la stima, si è che non solo dall' aratro a maneggiare il baston del comando ne' Campi di Marte, passavano sovente gli Antichi Romani Imperadori: ma da' Campi di Marte per lo contrario, gli Allori mietuti, e le Palme, portavansi a rendere il suolo col sudore delle tempie coronate fecondo. Che però saviamente Cicerone fu di parere, che siccome l' arte di coltivare le Campagne, utilità grandissima arreca alle Repubbliche, riputare altresì degna si debba d' un ottimo Cittadino, d' un Uomo libero. Io pertanto, che fino da' teneri anni da certo natural genio sospinto a contemplare in mezzo all' amenità della Campagna, di ricche piante adorna, le belle opere della natura, nella diligente ricerca, ed esatta delle medesime, ho impiegato mai sempre mio studio; dalla stessa Campagna, che a beneficio altrui arricchisce il suo seno, e feconda, ho imparato, come io non dovea nascondere, e quasi tenere per sempre sepolto quanto si era da me osservato finora, (infra l'

altre cose in molti nuovi Giardini , e Coltivazioni , fatte in diversi luoghi della Toscana , particolarmente nello Stato della Serenissima Repubblica di Lucca , dove da moltri anni in qua ho avuto , ed ho l' onore di assistere a numerose , e vaste Coltivazioni di Ulivi , Viti , Gelsi , ed altre piante , nelle belle , e ricche tenute di Beni dell' Illustriss. Seg. Alessandro Bonvisi . sopra d' ogni altra cosa molto abbondanti d' annue rendite di Setta , ch'è quanto dire di foglia di Gelsi , di grani perfettissimi , Vini generosi e stimabili , ed Oli soprafini , e squisiti) , e che dato alla luce , e fatto a tutti comune , poteva loro esser di giovamento . In questo Trattato adunque brevissimo , sebbene in fatti la materia dell' Agricoltura sia vastissima e varia , io toccherò solamente in primo luogo alcuna cosa , onde s' impari a conoscere la natura del suolo , e di quelle Piante , che sono la più spessa occupazione dell' Agricoltura , e dalle quali il maggiore e più necessario frutto ricavasi ; onde si mantengono e si arricchiscono le famiglie . In secondo luogo io mostrerò la maniera , che si deve tenere nel piantarle , e nell' allevarle . In terzo luogo poi accennerò il modo di regolarle , e di renderle maggiormente feconde col taglio : avendomi la pratica di molti anni alcune cose importantissime scoperto , che dalle sole prudenti Osservazioni del rinomato Monsieur della Quintinnè , nel suo celebre , e gran Trattato del Taglio degli Alberi bassi , e fruttiferi , io non avrei già inteso mai bastantemente . Gradisci intanto , amico , e benigno Lettore , questa mia fatica , qualunque ella sia ; e se ti comparisce povera , e nuda di erudizione , compatisci la mia professione , che non ammette esercizio di lettere . Accetta soltanto il buon desiderio , che ho avuto di giovare non solo alla mia ragguardevole , e nobilissima Patria , ma alle persone di Villa , e a tutti coloro , a' quali *Tempus in agrorum cultu consumere dulce est* , per li quali più che per li dotti , ho rozza-
mente questo mio Libro formato . Vivi felice .

I N D I C E

DE' TRATTATI DI AGRICOLTURA,

e di quanto si contiene in quest' Opera.

Discorso in generale sopra l' Agricoltura. pag. 1
Massime generali molto importanti, utili, e necessarie da praticarsi nelle buona agricoltura. 15

T R A T T A T O

delle Viti.

Della qualità del Terreno, e del sito per le Viti. 16
 Del modo di fare le fosse per le Viti. 19
 Del modo di scegliere, e conservare i Magliuoli. 21
 Del modo, e del tempo di piantare le Viti, o fieno Magliuoli. 24
 Del modo di allevare, e coltivare i Magliuoli il primo anno dopo piantati. 28
 Del modo di coltivare i Magliuoli il secondo e terzo anno dopo piantati. 32
 Del tempo e del modo di potare, palare, e legare le Viti. 35
 Del tempo e del modo di zappare, bassardare, e scacchiare le Viti. 39
 Del modo e del tempo di allevare, potare, legare, e piegare le Viti. 41
 Del tempo e del modo di fare le propaggini, o fieno sottomesse delle Viti. 46
 Del tempo e del modo di piantare gli Oppj nelle coltivazioni, e del modo di potare, e legarvi sopra le Viti. 48

T R A T T A T O

Delle Uve. e de' Vini.

Delle qualità di alcune Uve scelte per diversi usi
 Vini rossi, e bianchi. 53
 Dell' Uva Barbarossa, e sue qualità. 54
 Dell' Uva Canajola rossa, e sue qualità. ivi
 Dell' Uve colore Canajolo, e sue qualità. 56
 Dell' Uva rossa, chiamata Claretto di Franc. e sue qualità. ivi

VI I N D I C E .

<i>Dell' Uva bianca, chiamata Claretto di Francia, e sue qualità.</i>	57
<i>Dell' Uva Dolcippolla, e sue qualità.</i>	ivi
<i>Dell' Uva Lacrima di Napoli, e sue qualità.</i>	58
<i>Dell' Uva Lonza, e sue qualità.</i>	59
<i>Dell' Uva Liatico, e sue qualità.</i>	ivi
<i>Dell' Uva Mamola asciutta, e sue qualità.</i>	60
<i>Dell' Uva Mammola tonda, e sue qualità.</i>	ivi
<i>Dell' Uva Moscadella rossa, e sue qualità.</i>	67
<i>Dell' Uva Moscadella bianca, e sue qualità.</i>	ivi
<i>Dell' Uva Malvasia, o sia Grechetto, e sue qualità.</i>	62
<i>Dell' Uva S. Maria, e sue qualità.</i>	63
<i>Dell' Uva Malaga rossa, e sue qualità.</i>	64
<i>Dell' Uva Malaga bianca, e sue qualità.</i>	ivi
<i>Dell' Uva Navarrino, o sia Navarra, e sue qualità.</i>	65
<i>Dell' Occhio di Pernice rossa, e sue qualità.</i>	ivi
<i>Dell' Uva Occhio di Pernice bianca, e sue qualità.</i>	66
<i>Dell' Uva Pignolo rossa, e sue qualità.</i>	67
<i>Dell' Uva Raverusto dolce, e sue qualità.</i>	ivi
<i>Dell' Uva rossa, chiamata Rassaone, e sue qualità.</i>	68
<i>Dell' Uva Rassaoncello rossa, e sue qualità.</i>	69
<i>Dell' Uva bianca, chiamata Tribbiano Fior. e sue qualità.</i>	70
<i>Dell' Uva bianca, chiamata Tribbiano di Spagna, o sia Uva Greca, e sue qualità.</i>	ivi
<i>Dell' Uva rossa, chiamata Vajano, e sue qualità.</i>	71
<i>Dell' Uva Verdea bianca, o sia bergo, e sue qualità.</i>	72
<i>Dell' Uva Volpola bianca, o come altri dicono, Comiciatola, e sue qualità.</i>	ivi
<i>Dell' Uva rossa, chiamata S. Zoveto, e sue qualità.</i>	73
<i>Dell' Uva Tedesca rossa, o come altri dicono, Zeppolino imperiale, e sue qualità.</i>	74
<i>Delle qualità, e quantità dell' Uve da scegliersi, e unirsi insieme per fare varie sorte di Vini.</i>	75

T R A T T A T O

De' Gelsi.

D <i>El modo di fare i Vivaj di Gelsini di seme, che si chiamano Barbate.</i>	89
<i>Del modo di fare i Vivaj di Gelsini di seme, che si cava dalle more de' Gelsi.</i>	90
<i>Del modo di ripiantare nel secondo Vivajo i Gelsini, e del modo e tempo d'innestarli.</i>	91
<i>Del</i>	

- Del sito, modo, e tempo di piantare nella Coltivazione i Gelsi innestati, cavati dal Vivaio.* 95
Del modo di allevare, potare, e pulire i Gelsi, fino che non avranno almeno quattordici, o quindici anni. 99
Del modo di potare i Gelsi, passata che avranno l'età di quattordici, o quindici anni, fino che durano. 100

T R A T T A T O

Degli Ulivi.

- D***El modo e tempo di far Vivai, o Conservatoj di Ulivi; e prima di quelli di Uovoli, o Puppole.* 102
Del modo, e tempo di far Vivai, o Conservatoj di rami di Ulivo. 103
Del modo, e tempo di fare Vivai, o sieno Conservatoj di Ulivastrelli salvatici, che nascono dal seme. 108
Del modo, e delle regole più sicure per mettere all'ordine il terreno per la coltivazione degli Ulivi. 116
Del modo e tempo di svelte gli Ulivi dal Vivaio, e piantarli nelle coltivazioni. 120
Del modo e del tempo di piantare gli Ulivi, detti Piantoni, che si staccano dalle Cep. o barbicaje degli Ulivi grossi. 123
Del modo di coltivare, e allevare gli Ulivi il primo anno dopo piantati. 128
Del modo di coltivare, e allevare gli Ulivi, finchè non saranno d'età di quattro, o cinque anni. 131
Del modo di coltivare gli Ulivi passata, che abbiano l'età di quattro, o cinque anni, fino che durano. 133
Del modo di tagliare gli Ulivi, se mai per il gran freddo seccassero: con la Storia di alcune straordinarie seccagioni di Ulivi accadute in Toscana. 136
Del tempo di raccogliere l'Olive, e del modo di ben conservarle, e stagionarle. 141
Del modo di conservare l'Olio, acciò non prenda di rancido, nè di altri cattivi odori, o sapori; e del modo, e del tempo di travasarlo per mantenerlo perfetto. 143

T R A T T A T O

Delle Pianta de' Fichi.

- D***ella qualità della Terra, e del Clima per li Fichi* 149

VIII I N D I C E.

<i>Della qualità delle piante de' Fichi, e del tempo e modo di piantarli.</i>	147
<i>Del modo di coltivare i Fichi nella prima stagione dopo piantati.</i>	149
<i>Del modo di coltivare i Fichi, e dello stradamento da cominciarli a dare per mezzo del taglio.</i>	152

T R A T T A T O

delle Pera.

<i>Del modo più facile di far la provvisione di semi di Pera; e d' altri Frutti.</i>	154
<i>Del tempo, e modo di seminare i semi delle Pera nel primo Vivajo.</i>	155
<i>Del modo d' allevare, e coltivare il primo e secondo anno le piante nate dal predetto seme.</i>	156
<i>Del modo, del tempo, e della necessità di fare i Vivaj per trapiantarvi i Peri venuti in due anni dal suo seme.</i>	157
<i>Del modo di coltivare, e del tempo d' innestare le piante de' Peri tenute un anno nel sudetto Vivajo.</i>	158
<i>Del tempo, e del modo di sbarbar le piante de' Peri dopo innestate, e piantarle ne' giardini, e nelle coltivazioni.</i>	161
<i>Del tempo, e del modo di coltivare, ed allevare le piante de' Peri passato il primo anno dopo piantate nella coltivazione, sino che non saranno d' età di quattro, o cinque anni.</i>	163
<i>Del tempo, e del modo di coltivare le piante de' Peri, passati che siano quattro o cinque anni dopo piantati nelle coltivazioni, e sino che dureranno.</i>	165
<i>Del modo di coltivare, ed allevare le piante de' Peri che si mettono vicine alle muraglie, per tenerle a Spalliera di nuova invenzione.</i>	172
<i>Del tempo, e del modo di diradare i Fiori de' Peri Buoncrisiani dall' Inverno, e dello sarchiamento, e altre diligenze da praticarsi.</i>	174
<i>Del tempo di cogliere le Pera dal Verno, in particolare le Buoncrisiane, e del modo più proprio di conservarle.</i>	176

T R A T T A T O

De' Castagni.

<i>Delle qualità della Terra più atta e propria per uso de' Vivaj di Castagni, e del tempo, e del modo di prepararla per seminarvi le Castagne.</i>	178
<i>Del</i>	

- Del tempo, e del modo di coltivare, e allevare i Castagni piccoli nel Vivajo il secondo anno dopo piantati.* 181
- Del tempo, e del modo di scegliere, e destinare le mazze domestiche per innestare i Castagni nel Vivajo.* 183
- Del tempo, e del modo d'innestare i Castagni nel Vivajo il terz'anno dopo nati,* 185
- Del tempo, e del modo di piantare Castagni nelle Selve, con altre utili, e necessarie considerazioni da praticarsi.* 187
- Del tempo, e del modo di coltivare, e allevare i Castagni piccoli ne' primi anni dopo piantati; e di pulire, e potare i grossi, con altre cose necessarie da praticarsi per la buona condotta delle Selve.* 192
- Del tempo, e del modo di preparare la terra per seminarvi le Castagne per uso dei Pollonetti, ovvero per piantarvi i Castagni piccoli sbarbati dal Vivajo.* 195

T R A T T A T O

De' Ciriegi.

- D***El tempo, e del modo di fare i Vivaj di Semi, o come altri dicono, di Noccioli di Ciriegi.* 149
- Della qualità del Clima, e della Terra più atta e propria per i Ciriegi che si piantano stabilmente nelle coltivazioni.* 201
- Del tempo, e del modo di piantare i Ciriegi stabilmente nelle coltivazioni.* 202
- Del tempo, e del modo d'innestare i Ciriegi, e della maniera di regolarli col taglio.* 204

T R A T T A T O

Degli Agrumi.

- D***El modo, e del tempo di preparare il terreno, e i vasi per seminarvi i semi degli Aranci forti, e del modo di coltivarli ne' primi due anni.* 207
- Del modo, e del tempo di coltivarli le piante degli Agrumi salvatici, il terzo e quarto anno dopo seminate.* 209
- Del tempo, e del modo di coltivare, e innestare le piante degli Agrumi salvatici.* 211
- Del tempo, e del modo di coltivare le piante degli Agrumi passato il primo anno dopo innestate, fino che avranno dieci, o dodici anni.* 214
- Del tempo, e del modo di coltivare le piante degli Agrumi, passata che avranno l'età di dieci, o dodici anni, fino a che durano.* 216

TRAT.

T R A T T A T O

Degl' Innessi.

- D**elle stagioni più proprie per innessare. 222
 Dell' osservazioni da praticarsi nell' atto di scegliere dalle piante domestiche le mazzette per innessare. 223
 Dell' osservazioni da praticarsi quando si scelgono gli occhj delle mazzette domestiche per fare gl' innessi. 224
 Dell' osservazioni da praticarsi quando si fanno gl' innessi sopra le piante domestiche, per renderle più fruttifere, ovvero per migliorarne il frutto. 225
 Del tempo, e del modo d' innessare la Vite. 226

T R A T T A T O

Di arare, e seminare le Terre.

- D**el tempo, e del modo di arare le terre, dove ha da seminarli il Grano, Vecciatajo, e Segalatto. 227
 Delle qualità, che dee avere il seme del grano, e del modo più proprio di conservarlo. 230
 Del tempo; e del modo di seminare il grano, Vecciato, e Segalato. 233
 Del tempo di mietere, o segare; e del modo di abbicare, o abbarcare il grano ed altre robe. 236

T R A T T A T O

De' Cocomeri.

- D**ella qualità della terra atta, e propria per li Cocomeri. 238
 Del tempo, e del modo di vangare la terra per uso de' Cocomeri, e del modo di seminarli. ivi
 Del tempo di cominciare a preparare i concimi per li Cocomeri, e delle sue necessarie qualità. 240
 Del tempo, e del modo di coltivare le piante de' Cocomeri. 241

T R A T T A T O

Dei lavori, semente, potature, ed altre cose, che accadono mese per mese.

- D**e' lavori, semente, ed altre cose da farsi nel mese di Gennaio. 244
 De' lavori, semente, potature, ed altre cose da farsi nel Febbrajo. 246
 De'

I N D I C E. xi

<i>De' lavori , semente , potature , ed altre cose da farsi nel mese di Marzo .</i>	247
<i>De' lavori , semente , ed altre cose da farsi nel mese di Aprile .</i>	249
<i>De' lavori , semente , ed altre cose da farsi nel mese di Maggio .</i>	251
<i>De' lavori , semente , ed altre cose da farsi nel mese di Giugno .</i>	253
<i>De' lavori , semente , ed altre cose da farsi nel mese di Luglio .</i>	254
<i>De' lavori , semente , ed altre cose da farsi nel mese di Agosto .</i>	256
<i>De' lavori , semente , ed altre cose da farsi nel mese di Settembre .</i>	257
<i>De' lavori , semente , ed altre cose da farsi nel mese di Ottobre .</i>	260
<i>De' lavori , semente , ed altre cose da farsi nel mese di Novembre .</i>	261
<i>De' lavori , semente , ed altre cose da farsi nel mese di Dicembre .</i>	264

T R A T T A T O

Sopra il governo de' Cavalieri.

D <i>El tempo e modo di mestere i Cavalieri .</i>	266
<i>Del modo di allevarli .</i>	267
<i>Del mantenerli , o sia pascerli .</i>	269
<i>Del portli al lavoro , ed ordinare li boschi .</i>	270
<i>Del scoprire i boschi , e far la semenza .</i>	271

T R A T T A T O

Sopra la coltivazione de' Morari.

D <i>El modo di piantar i Morari .</i>	273
<i>Dell' allevare e potare i Morari .</i>	274
<i>Del coltivar la terra intorno a' Morari .</i>	276
<i>Del modo d'ingrassare i Morari .</i>	ivi
<i>Del trapiantarli .</i>	277

T R A T T A T O

Intorno la coltivazione delle Viti.

D <i>ell' impianto delle Viti , e loro sostegni .</i>	276
<i>Dell' allevare le Viti , e i Pontecci .</i>	277
<i>Del coltivare la terra intorno alle Viti .</i>	280

TRAT-

T R A T T A T O

Sopra la coltivazione delle Siepi.

I mpianto delle Siepi.	281
Modo di allevare le Siepi.	282
Del coltivare la terra intorno alle Siepi.	283

T R A T T A T O

Sopra la coltura delle Api.

D ella qualità delle Api, Re, e Peccbioni.	284
Dell'opportuna situazione, e pastura per le Api.	286
Degli alveari, o sieno Cassette per le Api, tempo di provvederle, e modo di trasportarle.	287
Della vera maniera di trattenerle, e prendere le Api.	290
Del tempo, e modo di levare i feli, e di ammazzare le Api.	292
Della maniera di cavare il miele, e la Cera.	295
Delle più necessarie avvertenze per i Custodi, e per la preservazione delle Api.	296

T R A T T A T O D I M. B I D E T.

Sopra la coltivazione della Vite.

P A R T E P R I M A.

P lantation della Vite. Qualità delle Terre.	303
Del Terreno.	304
Pianta della Vite. 305. Il Magliuolo.	vi
La pianta con radice, 306. Il Saepolo.	307
La Propaggine.	ivi
Potatura della Vite, e tempo in cui deve farsi.	308
Lavoro delle Viti. 310. L'Abbassamento.	311
L'Innesto. ivi. Lo rincalzamento.	312
Il Concime.	313
La legatura. ivi. I Pali.	314
Modo di fucidare la Vite.	315
L'Espulsione degl' Insetti.	316
La Ghiocciata, o fuoero Lumaca.	ivi
Il Griburo, 317. L'Arsuro.	318

P A R T E S E C O N D A.

Maniera di fare i Vini.

L a Vendemmia.	319
La scelta de' Vendemmiatori.	ivi

Fal.

<i>Falcetti, e Forbici per raccogliere l'Uva.</i>	320
<i>Al trasporto delle Vendemmie.</i>	ivi
<i>Le Ceste, ovvero Bignoce.</i>	321
<i>Scelta dell'Uve pel Vino bianco.</i>	ivi
<i>La Pigiatura, ivi. Gli Strettoj.</i>	325
<i>Modo d'imbottare i Vini.</i>	329

P A R T E T E R Z A .

Il Governo de' Vini.

M odo di schiarire i Vini, e cerchiare le botti.	332
La scelta delle Cantine per i Vini imbottati.	333
La Colatura.	ivi
Tempo d'infascare i Vini schiumosi, e di altre sorte.	334
La Colla per i Vini.	ivi
Qualità del fiasco.	336
Qualità del Turacciolo.	ivi
Qualità dello Spago.	ivi
Composizione della Cera.	ivi
La scelta delle Cantine per Vino schiumoso.	337
Bacini per i Vini ne' fasci.	338
Rimedj per i difetti del Vino, ovvero segreto per ass- tigliare il Vino.	339
Per lo stesso.	ivi
Per addolcire un Vino aspro e verde.	ivi
Per correggere il Vino bianco rosseggiante, cioè a dire, che macchia.	ivi
Per ischiarire ogni sorta di Vino ancora il più torbido nelle botti.	ivi

A G G I U N T A

Di alcuni Trattati necessarj a sapersi da un buon
Agricoltore, i quali mancavano nella
prima Edizione.

D ell'innestare le Viti in due modi di versi col tron- carle, e non col fenderle.	341
Dell'innestare le Viti a troncarle, o fenderle.	342
Dell'innestare Viti a Zanca.	343
Dell'innestare a temperatura di penna.	344
Dell'innestare Viti ad occhio.	ivi
Del potar le Viti.	345
Del far buon Vino dall'Uva.	347
Quando si debba vendemmiare l'Uva.	348

XIV I N D I C E.

<i>In che maniera si conosce la maturità dell' Uve.</i>	349
<i>Modo di far bullire, e cuocere il Vino.</i>	350
<i>In che modo si conserva li Vini, e si corregge li guasti.</i>	351
<i>Alcuni avvertimenti da correggere i Vini mal gustevoli e guasti.</i>	353

MANUALE DE' GIARDINIERI.

D el Giardiniere, e sue qualit.	357
Del sito del Giardino.	358
Della pianta, e comparimento d' esso.	ivi
Della qualità del terreno.	359
Delli fiori, e loro cognizione.	ivi
Della coltura generale de' Fiori.	ivi
Del tempo d' affettar il Giardino.	360
Dell' ordine da tenersi per piantarlo.	ivi
Del modo da piantar ne' vasi.	361
In che modo si deve raccor i semi.	362
Del tempo, e modo di seminare.	ivi
Del tempo di trapiantare.	363
Dell' ora, e modo d' innaffiar le piante.	364
In che modo si leva l' erbe inutili.	ivi
In che modo s' espurgbi i Giardini dagli animalinocivi, ed in che tempo.	365
Quando devesi cavar, e conservar i bulbi.	366

LIBRO PRIMO.

D ella coltura particolare de' Fiori.	368
Delli Narcisi.	ivi
Delli Narcisi massimi ec.	370
Delli Narcisi Indiani.	371
Delli Narcisi Virgienesse, e Jacobeo.	372
Del Gigliato rosso. 373. Dell' avvinato chiaro.	ivi
Del Gigliato sferico. ivi Del Scaglioso.	373
Delle Tazzette. 375. Delli Jacinti.	ivi
Delli Jacinti del primo ordine.	376
Delli Jacinti del secondo ordine.	377
Delli Jacinti Indiani.	378
Del secondo Jacinto Indiano. 379 Delli Trombeni.	380
Delle Giunchiglie. 381. Del Muschio Greco.	382
Della Corona Imperiale. 383. Del Pennacchio Persiano.	384
Del Collo di Camello. 385. Dell' Ornitogallo.	ivi
De' Tullipani. 386. De' Gigli o Martagoni.	388

Dell'

Dell' Iridi 389. Della Fritellaria.	390
Del Colchico. 391. Del Croco.	ivi
Degli Orchi, e Satirioni.	ivi

LIBRO SECONDO.

D ella cognizione, e coltura de' Fiori.	392
Delle Rose.	ivi
Della Rosa China 394. Del Sambuco Rosco.	395
Della Siringa bianca. 396. Della Siringa azzurra.	ivi
Del Sicomoro. ivi Del Cirtigio dal fior doppio.	ivi
Del Pesco dal fior doppio.	397
Del Balmusto dal fior doppio. ivi. Dell' Alloro Indiano.	ivi
Dell' Olivastro straniero. ivi. Della Mortella.	398
Della Ginefra bianca. ivi. Dell' Acazia Indiana.	ivi
Del Molle Indiano. 399. Del Somaco straniero.	ivi
Della Noce Metella. 400. Del Malvaviscbio.	ivi
Della Pianta Massima. 401. Della Fernesiana.	ivi
Della Viola piramidale. 402. Del fior della Passione.	ivi
Dell' Asfodelo. 403. Della Juca Indiana.	404
Delli Gelsomini, ec. ivi. Della Viola doppia.	408
Della Scabbiosa gentile. 409. Dell' Aquileja.	ivi
Delli Digitali. ivi. Della Scarlatea.	410
Della Sgarza odorata. ivi. Dell' Occimoride doppio.	ivi
Dell' Amaranto. 410. Della Licnide di Costantinopoli.	ivi
Del Tracbello Americano. ivi. Del Dittamo.	412
Dell' Areclisi. 413. Della Speronella.	ivi
Della Peonia. ivi. Del Giglio delle Valli.	414
Delli Garofani. 415. Dell' Americo.	416
Delle Piumette. ivi. Della Margheritina.	ivi
Del Garofano d' India. ivi. Dell' Orecchia d' Orso.	417
Del fior della Trinità. ivi. Della Latuca Agreste.	ivi
Della Paralisi. 418. Del Ciclamino.	ivi
Del Tubero Indiano. 419. Degli Anemoni.	420
Delli Ranuncoli. 423. Della Ninfea.	424
Della Caltà Palustre. 425. Del Trifoglio Palustre.	ivi

LIBRO TERZO.

T rattato degli Agrumi.	426
Del modo di moltiplicarli.	428
Per via di semi. ivi. Per via di rami.	429
Per via d' innesti. ivi. Per via di propaggini.	430
Modo di moltiplicarli col procacciargli le piante di fuori.	431
Modo di trasportar le verghelle.	ivi
Tempo, e modo per portar gl' Agrumi.	432

Tem-

XVI I N D I C E .

<i>Tempo, e modo di tagliar le radici.</i>	433
<i>Tempo, e modo di zappare gli Agrumi.</i>	434
<i>Modo di adacquarli.</i>	ivi
<i>Tempo, e modo di racchiuderli.</i>	435
<i>Del tempo, e modo di racchiuderli quando stanno in terra.</i>	436
<i>Del tempo, e modo di scoprirli.</i>	437

LIBRO QUARTO

Che serve per Aggiunta al Manuale de'
Giardinieri.

Q <i>uanto sia necessario al Giardiniere aver la cognizio-</i>	
<i>ne delle virtù Medicinali de' fiori, ec.</i>	438
<i>Degli effetti Medicinali del Narciso.</i>	439
<i>Delle Giunchiglie, e sue virtù.</i>	ivi
<i>Degli effetti nell' Ornitogalo.</i>	ivi
<i>Effetti Medicinali del Giglio.</i>	ivi
<i>Degli effetti Medicinali dell' Iride.</i>	440
<i>Delle proprietà del Colchico.</i>	441
<i>Delle qualità del Croco.</i>	ivi
<i>Delle proprietà Medicinali delle Rose.</i>	ivi
<i>Delli Pastelli delle Rose.</i>	442
<i>Della proprietà del Malva vischio.</i>	ivi
<i>Di alcune proprietà della pianta Massima, ovvero Mira-</i>	
<i>sole.</i>	443
<i>Effetti della Scabbiosa.</i>	444
<i>Effetti Medicinali del Giglio.</i>	ivi
<i>Delle proprietà saltevoli, degne d'esser sapute da tut-</i>	
<i>ti de' Garofani.</i>	445
<i>Effetti mirabili del Ciclamino.</i>	ivi
<i>Degli effetti degli Anemoni.</i>	446
<i>Effetti Medicinali dei Ranuncoli.</i>	ivi
<i>Degli effetti che produce la Ninfea.</i>	447
<i>Effetti della Colta Palustre.</i>	ivi
<i>Effetti, e virtù operative del Trifoglio, ovvero Loto</i>	
<i>chiamato dal Mattiolo.</i>	448
<i>Effetti maravigliosi della Malva.</i>	ivi

M E M O R I E

<i>Intorno la Roca de' Meli.</i>	446
----------------------------------	-----

R A C C O L T A

<i>D' Opuscoli appartenenti all' Agricoltura.</i>	463
---	-----

A P P E N D I C E

<i>Che contiene un nuovo Ritrovato, ec.</i>	315
---	-----



DISCORSO GENERALE

Sopra l' Agricoltura.



Lorchè si parla della *Coltivazione della Terra*, sembra, che si tratti d'una dell' *Arti* più basse e vili. E può esser' ella altro, da che non miriamo se non poveri e rozzi Villani, applicati ad essa, colle mani callose per le tante fatiche, e talvolta ancora dopo tanti sudori, miseramente pasciuti? Ma non così l'intende-

vano i primi tempi della Romana Repubblica, e di molt' altre della Grecia, che tenevano l' *Agricoltura* e la *Milizia* per li due più importanti studi de' loro Stati; e nell' uno, e nell' altro sappiamo, che si segnalavano i più riguardevoli Cittadini di Roma. Altri poi tal conto ne fecero, che formarono Trattati d' essa per li segnarne i precetti. In una parola, non v'è fra l' *Arti* alcuna tanto raccomandata dai Filosofi, quanto la *Coltura della Terra*. Senofonte in un suo Dialogo fa vedere, qual vantaggio sarebbe per uno Stato, se il Principe premiasse chiunque si mostra eccellente nel Lavoro della terra, nel Commercio, e in altre *Arti*: *Ipsa Agricultura*, dice egli, *magnum incrementum sumeret, si quis vel per agros, vel per vias, optime terram excellentibus premia constitueret*. Parleremo a suo tempo del pericoloso mestier della *Milizia*: miriamo ora l' innocente dell' *Agricoltura*. Sarebbe di dovere, che ogni Città e Popolazione avesse in dote tanta copia di territorio, che regolarmente potesse somministrar grano o altra sorta di alimento a' suoi abitanti. Ma il Mondo non serba qu' alcuna proporzione. Alcune Città sovrabbondano di grani, altre ne scarleggiano, ed altre ne son prive affatto, supplendo poi col

A

Traf.

Traffico, coll' Arti, e con altre industrie al loro difetto, e bisogno. Ora ognun vede, che sopra ogn' altra cosa è necessario il sostentamento della Vita; e questo non può venire se non dalla Terra, che dia grani, legumi, vino, olio, frutti, erbaggi, e simili produzioni di cose, destinate al cibo degli Uomini; siccome Lino, Canape, Seta, e Lana pel loro vestire; nè essa tali ajuti somministrerà, se non è ben coltivata. Questo è appunto l'oggetto ed uffizio dell' Agricoltura, o sia della Coltivazione de' campi, siccome anche l'abbondanza e mantenimento de' bestiami. O molto dunque, o scarso che sia il territorio di un Popolo, Massima essenziale di un buon Governo è il fare, che questo renda quel frutto, che mai può. Il di più, che occorra al bisogno interno del Paese, venduto ad altri si cangia in oro ed argento. O non fanno, o non possono molti Popoli colla Mercatura, coll' Arti, colla Pesca, e con altre invenzioni dell' umana industria far guadagni ed arricchire; ma ordinariamente loro non manca terra, onde possano ricavare i principali ingredienti, per vivere agiatamente quaggiù. Meritano ben d'esser Poveri, se non si prevalgono di questo dono, fatto loro da Dio, e se non faticano per insegnare alla terra d'essere feconda di Beni per loro lervigio.

Ora non si può negare, che come son varj gl' ingegni, le inclinazioni, le forze, e le fattezze degli Uomini, così diverse sieno le qualità delle Terre. Alcune grasse, e feconde; altre magre, o sterili; quelle fatte per certi grani, ed alberi, e questo per altri. Noi incontriamo fin delle terre nel piano, più assai nelle montagne, che appena producono un filo d'erba. Contuttociò i Saggi hanno da piantare questa Massima. *Che niuna terra v'ha sì meschina ed avara, la quale render non possa più, o meno di rendita e frutto all' Uomo, il quale s'intenda della Coltivazione, e non tema la fatica.* Secondariamente: *Cura ed attenzione ha da essere non solo de' saggi Cittadini, ma dei Principi stessi, che si accresca la coltura delle Campagne per quanto mai si può.* Certo è, che v'ha de' Paesi, ne quali se si attendesse con applicazione maggiore a questo traffico, che non esige lunghi viaggi, che non mette a pericolo la vita nelle tempeste de' mari, renderebbero le terre un terzo più di rendita di quel che ora si cava.

cava. Tutto dipende dall'intelligenza, dall'industria, e dall'attività de' Villani. Ove costoro sieno gente pigra, disattenta, e che non voglia a dovere ajutar la Natura alle sue produzioni; un podere, che in mano dei diligenti frutterebbe mille, appena in man loro renderà secento. Si trova in ciò gran differenza tra paese e paese. Alcuni son cotanto industriosi, che fino nei monti, non che nelle pianure, fanno far maraviglie alle lor terre; non ne lasciano particella oziosa; sempre in moto, per correggere quel ch'è difetto ne' loro campi; e sempre pensosi, come ne possano accrescere la fecondità. Pajono anche giardini le loro terre: tanto son ben tenute le file dei loro alberi, sì vaghe e forti le siepi, sì ben compartite con i loro fossi. Non è già così d'altri Rustici, che non istimano un gran male la dappocaggine, che non fanno a' dovuti tempi tanti lavori e diligenze, delle quali abbisogna ogni campagna; e par loro aver fatto delle prodezze, se hanno arato le terre una volta sola, e seminato, lasciando poi con tutta pace, che la Natura faccia il resto, senza guardare i campi dall'acque stagnanti; senza mondare dall'erba e grani cattivi i cresciuti frumenti; senza agevolar colla zappa il progresso delle Fave, e del gran-turco, o sia Frumentone.

Sarebbe dunque da desiderare, che si potesse animar la gente rustica a far meglio il suo mestiere; anzi sarebbe desiderabile, ch'essi imparassero meglio questo mestiere. Non si può fare (e volesse pur Dio che far si potesse) con loro ciò, che si pratica nella Milizia, dovè tanti Maestri, e sì sovente, danno lezioni a i lor novelli Soldati. Avrebbero parimente bisogno i Rustici di chi facesse loro scuola d'Agricoltura. Resterebbe anche tempo per addottrinarli, cioè nelle Feste, nelle quali dopo i Divini Uffizj si perdono in vani cicalecci, in giuochi, se non anche in applicazioni peggiori. Ma se questo non è sperabile, almeno gioverebbe, che i lor Padroni passando alla villeggiatura, studiassero i migliori Libri, che trattano di quest'Arte, per poi far conoscere ai lavoratori ciò, ch'è difettoso, utile, e più utile nella Coltivazione. Ci son questi Libri, benchè pochi, e capaci anche di miglioramento e perfezione; e perciò gioverebbe farne de' nuovi, raccogliendo quel che di meglio hanno intorno all'Agricoltura scritto an-

che saggi ed esperti Oltramontani. Chi fa e mette in opera tutti i documenti e segreti di tal professione, può ben prometterfi ricompense maggiori dai suoi terreni. Ne s'avrebbero a vergognare di sì fatta applicazione i Nobili stessi e gran Signori. Perciocchè se noi tanto lodiamo e stimiamo, com'è di dovere, que' valent' uomini Filosofi, che tutto di vanno studiando il Libro della Natura colla Fisica Sperimentale, per conoscere il peso e le forze dell'Aria, il costitutivo e il moto della Luce, l'origine de' Colori, la bizzarria dell'Elettricità, la diversità degl'Interti, dell'Erbe, de' Fosfori ec. e così discorrendo; benchè tanti Sperimenti e scoperte, sempre meritevoli al certo di lode, riescano talvolta di poca utilità al Pubblico; perchè non sarà, ed anche più, da preggiare ugualmente, chi studia i segreti dell'Agricoltura, Arte così utile e necessaria al genere umano? Anzi sarebbe da desiderare (mi si perdoni, se lo ripeto) che le acute teste dei Filosofi s'innamorassero di spendere quì le loro applicazioni, con fare degli Sperimenti, come usano sopra tante altre parti della Fisica. Gran plauso, e con ragione, si è fatto a chi con tante fatiche ha scoperta l'interna tessitura degli Alberi, la maniera d'alimentarli e di farli crescere, con farci vedere le lor vene, per così dire, e qual parte in essi abbia l'Aria, con altre belle notizie. Pure maggior obbligazione avremmo a chi prevalendosi di questi lumi, c'insegnasse la pratica, per moltiplicarli con più facilità. Di più non fa un Contadino, che quanto ha veduto fare da' suoi Maggiori, o vede fare dagli altri suoi pari. Che di grazia non si potrebbe sperare da un Filosofo, diligente osservatore dell'Economia della Natura? Ho veduto montagne e colline spelate; appena in esse nasce un po di Ginepro, o razze, o spine. Tengo io per fermo, che quella terra in mano di chi facesse varie prove, e sapesse ben intendere la qualità dei terreni, e onde venga la loro sterilità, non lascierebbe di ricavarne qualche frutto. Se non può servire quel terreno per seminarvi, servirà per fare del bosco. Molte volte miriamo terra, che nè pure ha uno sterpo, non ha un filo d'erba. Ma ciò avviene, perchè appena di là esce qualche cosa di verde, che tosto le Pecore (e peggio poi le Capre) radono e rodono tutto. Chi vi piantasse del bosco, e questo si custodisse, probabilmente se ne vedrebbe buon' effetto. Nelle falde più alte del

nostro Appennino abbiamo Selve di Faggi : questi non verrebbero nel piano e nelle colline . Vi son parimente degli Abeti o Piale . Mi vien detto , che queste piantate anche nelle colline vi si allignano molto bene . Perchè non isperimentare , se fossero capaci di esse tante parti della montagna , che vanno incolte , nè rendono verun frutto ? Il punto sia a conoscere , quali Alberi amino più il Settentrione , che il Mezzodì , più il Monte che il Piano , per dare ad essi il più convenevole soggiorno .

Anche nel piano trovasi gran varietà di terreni , parte naturalmente grassi , quali per lo più sogliono essere i vicini ai gran Fiumi , parte di mezzana bontà , e parte sterili . Il Filosofo sa raziocinar su tali terre , e con l'osservazione arriva a scorgere le cagioni intrinseche di tal differenza . Quelle , perchè sono tenaci e difficilmente si spolverizzano ; altre perchè abbondanti di calcinelli , di gesso , di sabbia grossa ; altre perchè già state letto di Mare ; altre perchè prive di parti oleose , infestate dall'acque sotterranee , o che non ritengono il nitro portato dalle Tramontane si scuoprono di cattiva qualità . Perciò pensa egli qual rimedio si potesse apprestare , qual mezzo potrebbe giovare per superar la mala indole di que' terreni , e forse ne troverà . Altro Recipe non fanno i nostri Contadini , per secondar le terre , che il Letame , il quale col suo zolfo o nitro dà vigore alle piante , e promuove l'Erbe e i semi de' Grani , ancorchè talvolta si trovino terreni sì disgraziati , che mangiano , per così dire , esso Letame , o almeno per poco ne ritengono le vantaggiose influenze . Può essere che il Filosofo colle osservazioni sue somministri qualche altro mezzo , per rendere meno infeconde , o più feconde le terre . Contasi d'un paese in Francia , dove sotterra si trova un prodigioso strato di Nicchi o sia Conchiglie , che cavate o stitolate ingrassano i campi . Tutte le orine , le acque saponate dei bucati , le spazzature delle case (in Venezia se ne tiene buon conto) le foglie degli alberi , che cadono sull'avvicinarsi del verno , i bachi morti , che restano dopo esserne estratta la Seta , ed altre cose , o noi non le curiamo , o le gittiamo ne' canali . Per nostra incuria bene spesso si perde nelle Città e Terre gran copia di materie e umori , che gioverebbero ai prati , agli orti , ai seminati . V'ha sia de' paesi sì trascurati (e dovrei dire

di più) che vendono ai confinanti le lor colombine , pecorine , ed altre simili , da noi chiamate grassine . Una delle doglianze di molti Contadini ne' Paesi , che sono per sè poco feconde le terre , si è di non essere sovvenuti con letame dai Padroni . E sovente avviene , che gli stessi Padroni veramente poveri non possono far di più ; oltre di che non v'ha maniera di Concime ; che possa soddisfare ad ognuno . Ma se conoscessero i Villani tutto quello , che può aumentar l' Erba ne' loro Prati , e dar loro comodo di tener più bestiami ; se facessero conto di tutto quello , che può marciare e formare stabbio , può essere , che in parte almeno provvedessero al proprio bisogno . Converrebbe far conto di tutto quello , che la terra produce , e di tutto quel ch'è corpo o esce dal Corpo di qualsivoglia Animale , cominciando dall' Uomo . Capelli , Unghie , Penne , Peli , Pelli , Corna , Stracci di panni di lana , ed altre produzioni della Natura , atti sono ad ingrassare i campi , ed a promuovere la vegetazion della Canape , perchè contengono o Zolfo , o Olio , o Nitro . Fin la terra sminzata , e la polve delle strade , e molto più la fuligine dei cammini , può giovare ai prati ; e gl' industriosi Bolognesi vengono a comperare dai buoni Modenesi le penne grosse de' polli , e d' altri uccelli per le loro Canape : laddove altri ne fanno talò .

Sommamente è da desiderare d' aver Contadini industriosi , che non perdano oncia di tempo , e non temano la fatica . A farli divenir tali occorre in parte la forza , e in parte il premio . Gioverebbe ancora assaissimo il far venire dei forestieri , che insegnassero coll' esercizio ai pigri il faticare , e una miglior maniera di far fruttare le terre . V' ha molti Statuti in Italia composti da gente , che s' intendeva d' Agricoltura , ne' quali son prescritte e comandate molte Regole buone , che s' avrebbero da osservare nella coltivazion delle campagne , e proposte pene a i trasgressori , e destinati premi per chi fa ravalieri , pianta alberi , tira le viti , o altre simili azioni rurali . Bisognerebbe scegliere da ogni paese quel , che v' ha di meglio , e poi farlo osservare . E quì convien dire , che anche i Principi per mezzo dei loro Magistrati dovrebbero tener l' occhio aperto , per togliere gl' impedimenti alla felice Agricoltura ,

tura, e per promuoverne l'accrefcimento. Può ben, per efempio, un attento Padrone d'un fondo, o il fuo Fattore, muovere i fuoi Ruffici a far sì, che con la facilità fi fcolino i fuoi campi dall' acque, che ftagnanti uccidono erbe e grani, ordinando i foffi e fcoli convenevoli. Ma quefto fovente non gioverà, fe non v' ha un Magiftrato, il quale ordini, e faccia efeguire lo fcevamento de' foffi e fcoli maestri, che di tanta importanza fono in ogni paeſe; in guiſa che ſe quei di ſopra cavano, molto più queſto ſi faccia dagl' inferiori; che vogli al rifarcimento o mantenimento degli Argini de' Fiumi, e Torrenti; che faciliti l' uſo dell' acque, per irrigar le Campagne. V' ha de' Paefi, dove ſon paludi, che ſi potrebbero ſeccare, o pur farle più ſcareccie; ma niuno vi penſa. Altri ve ne ha, dove ſi laſcia perdere gran copia d' acque per traſcuraggine degli abitanti, o di chi comanda. Dio dà loro dei teſori, e non li conoſcono; o non ſe ne fanno ſervire. Chi ha letto le Relazioni della Cina, e del Perù, fa con che mirabile induſtria e pazienza que' Popoli tirino l' Acque da lontano in prò de' loro campi. Un' oncia di eſſe atti all' irrigazione e perduta; accuſa di poco ſono gli abitanti.

Non ha molti anni, che i Modeneſi hanno appreſo a cavar Olio, e ne cavano non poco, da i vinacciuoli. Non caveran già olio nè eſſi, nè gli abitanti della Lombardia di qua dal Pò, per valerſene ne' cibi, perchè non penſano, o poco penſano ad avere degli Ulivi. Certo è, che Alberi tali amano le colline, han biſogno di paeſe caldo, temono le Tramontane, e deſiderano l' aria Marina. Pure mi ſia lecito il dire: vien dall' ineuria noſtra, che non ſi ricavi anche da queſti paeſi una competente porzione d' olio d' Ulivo, come ſi fa nella Riviera di Salò, e in altri ſiti. Abbiamo le baſſe colline, che ſon capaci di que' nobili arboſcelli; e quand' anche non rendeffero quell' abbondante frutto, che rendono gli Ulivi in tutta la coſta del Mare Toſcano e Liguriſco: pure non poco ſe ne ricaverebbe. Evidente coſa è, che alcuni in eſſe colline tengono Ulivi di due ſorte, cioè producenti Ulive ordinarie, ed Ulivoni. Taluno ne fa Olio, il reſto va a conciar le Ulive per mangiarle alla tavola: cibo gittato, e di niuna ſoſtanza. Meglio farebbe il trarne quell' Olio.

che si può. Queste poche Ulive ancora vengono dalla liberalità, per così dire, della Natura; perchè i nostri Contadini poco o nulla fanno della coltura di quelle piante, e le trascurano, e non le rinforzano col dovuto concime. Ora che sarebbe, se un saggio Principe amante del suo Popolo, oppure una Città, facesse venir di là dall' Appennino due ben pratiche persone della coltivazione degli Ulivi, le quali visitassero tutte le basse colline, riconoscendo i siti più propri per piantarli, e massimamente le colle, che guardano il Mezzodì, con insegnar poscia ai Rustici nostri la maniera di governar quelle piante? Utilmente impiegato sarebbe quel denaro, e col tempo ne risulterebbe gran bene: bene, che non priva degli altri consueti, perchè gli Uliveri non impediscono il seminarvi anche il grano. Ma il non essere noi avvezzi a certe benchè utili cose, fa che non ne conosciamo il preggio, nè desideriamo di metterle a uso; e lo stolto ed infingardo grida: *Non l'han fatto i nostri vecchi, perchè lo debbo far io?* Olio ancora si può cavare dal Lino, e dai Ravizzi, siccome ognun sa. Ma pochi fanno, che in maggior copia se ne può anche cavare dall' Erba *Sesamo*. Scrive il Mattioli, che nella Morea o Grecia molto si semina di tal' Erba, con raccoglierne Olio, il quale serve eziandio al cibo. Avvedutisi di questa prerogativa e guadagno tre saggi Nobili, uno Ravennano e gli altri due Bolognesi, ne hanno poco fa introdotta la seminazione ne' loro poderi, con impetrat' anche dal Pubblico di Bologna il Gius privativo per quest' Arte nuova. Meritano ben lode. Vien' alto il fusto di quell' Erba un piede e mezzo, più grosso e ramofo di quello del Miglio. Produce baccelli lunghi un oncia e mezza in circa, pieni di semi bislungi, alquanto più grossi del Miglio, i quali contengono tanto d' esso Olio, che una Libbra d' essi darà ott' oncie d' Olio, limpidissimo e giallo. Non ha questo alcun' odore, solamente bruciandolo fa del puzzo. Ricerca tal' Erba o pianta, terreno grasso ed irrigidibile, confessando gl' intendenti, ch' esso immagrisce la terra. Ma non fa di meno il frumentone; e pure se ne va sempre più dilatando la coltura. Filosofi e Medici dovrebbero ben' esaminare la qualità del Sesamo, e informarsi meglio dell' uso, che ne fanno i Greci. Quand' anche non paresse a proposito per li cibi, mancano forse tant' al-

tant' altri usi, a' quali potrebbe servire? Ogni dì si può imparare qualche cosa, ma senza studiare non s' impara.

Era i costumi pregiudiziali all' Agricoltura si dee notare il trovarsi in qualche paese troppo trinciati i campi, di maniera che Poderi vi saranno, che avranno più e più pezze di terreno separate, e anche talvolta assai lontane dal centro. Altri terreni ancora si troveranno in mezzo ai campi altrui, e per la loro tenuità senza casa, e senza proprio coltivatore. La regola è, che questi s' scomodi, segregati, e lontani campi son trattati alla peggio, vendicandosi poi anch' essi del poco amor de' Contadini, con rendere loro neppure la metà di quel frutto, che renderebbero sotto i lor' occhi, oltre al non poterli ivi mettere nè frutti, nè viti, nè fave, nè altre biade, che muovono l' appetito de' ladri, altrimenti la minor parte sarebbe quella, che toccherebbe ai Padroni. Circa cinquecent' anni sono, i Modenesi rimediarono colla forza sì fatto disordine, ch' era troppo cresciuto, con obbligare i possidenti a vendere, a livellare, a permutare coi confinanti questi ritagli di terre, con varj ben pensati ordini, e con deputar pubblici Estimatori ad acconciar tante ossa slogate, non già per formar' ampie possessioni, ma bensì delle mediocri e discrete, le quali regolarmente rendono più frutto che le troppo vaste.

Laudato ingentia rura, Exiguum colito: ce ne avvertì Virgilio. Stendete anche l' occhio ad un' altra lieve sorta di terreni per osservare la loro trista figura, e com' è quivi costretta la Natura ad essere non quella buona Madre, ch' è, ma bensì Matrigna. Parlo de' Maggioraschi, Fideicommissi vicini a passare in altre mani, Comende, Prebende, Benefizj semplici, ed altri beni, de' quali non si può testare, e de' quali dopo la morte di chi ne gode l' usufrutto, i suoi discendenti o Parenti non potran più godere. Non mancano al certo Ecclesiastici timorati di Dio, e Secolari persone d' onore, i quali non minor cura ed amore hanno di tali Beni, che de' proprj. Ma altri pur troppo abbondano, che dimentichi del lor' dovere, e sordi alle voci della coscienza, unicamente pensano a spremere quel sugo, che possono da quelle terre non sue, senza rifarcire e mantener le fabbriche, senza rimettere gli alberi tagliati, e senza voler impiegare un
soldo

soldo in bene di quelle disgraziate terre, le quali basta il mirarle per conoscere, chi n'è il Padrone. Ognun vede, quanto di più esse renderebbono in mano di chi le potesse tramandare ai suoi posteri, e in quanto danno della Repubblica torni la condizione di sì fatti Beni. Sarebbe ben da desiderare, che si livellassero terreni di questa fatta con discreta e stabil pensione a chi li trattasse con amore: al che miriamo condiscendere anche la benignità de' Sommi Pontefici per quel che riguarda gli Ecclesiastici, in bene de' quali torna l'aver da li innanzi sicura la pensione, perchè non sottoposta a gagliuole o ad altri casi fortuiti; siccome torna in profitto del Livellario e del Pubblico il frutto maggiore, che l'industria sua può far risultare da quelle terre. Fassi anche a notare la negligenza degli Agricoltori. Potrebbero aver frutti migliori, ove migliori; poca fatica costerebbe il procacciarne da chi ne ha: e pure mai non vi pensano, o poco sene curano. *A che tanti pensieri? dicono essi, non basta forse quello, che s'ha?*

Sarebbe anche bene, che persone intendenti esaminassero, qual maggiore vantaggio risulti ad un paese del seminar Lino o Canape. Negli antichi secoli, per quanto ho io osservato nelle pergamene di que' tempi, non usava il nostro Contado se non la coltura del Lino, che certo è da anteporre alla Canape per le tele, oltre all'Olio, che se ne può ricavare, il cui uso serve anche alla Medicina e a i Pittori. Oggidì quel non si mette che Canape. Probabilmente costa men fatica, e ne vien maggior bene, perchè più abbondanza di tela può farsi, e questa serve anche alla bassa gente, la quale di gran lunga supera in numero l'altra. Ma è da osservare, farsi in Germania e nel Piemonte delle belle tele fine e bianche, e queste di sola Canape; perciocchè maniera c'è di ridurre essa canape alla sottigliezza del Lino, con qualche spesa: spesa nondimeno, che vien bene ricompensata. Mi è anche stato insegnato il come; ma più sicuro farò, che un attento Principe o Magistrato ne faccia prendere le più esatte informazioni per introdurre, se tornasse il conto, nel proprio paese questa profittevole usanza. A noi avvezzi a far venire altronde le tele fine, comperate con tant'oro, non cade mai in mente, che potremmo far

noi

noi quello che tanti altri più industriosi fanno per venderlo appresso alla nostra pigrizia. Quando poi riuscisse all' industria di migliorar la Canape, e di farne belle Tele, a questa converrà mutar nome, altrimenti pericolo ci farebbe, che non potesse prendere sonno in quelle chi non si crede distinto dal Volgo, se non usa robe straniere. Ma per buona sorte ho trovato dappoi in Modena ciò, ch' io cercava altrove, cioè un' altro men dispendioso Segreto per ridurre la Canape alla sottigliezza del Lino. Me lo ha comunicato il Signor Marchese Alfonso Fontanelli, Cavaliere per varj suoi pregi distinto, e massimamente per la soda ed anche amena Letteratura sua, talchè ne posso anch' io far parte al Pubblico, e la so ben volentieri. Forse per la Canape troppo grossa non produrrà sì buon effetto.

Modo per ridurre la Canape somigliante al Lino.

Si fa prima la Lisciva con senere buona, e vi si mette un poco di Calce viva a giudizio, secondo la quantità della Canape, che si vuol' acconsiare. Si leva dal fuoco lasciandola chiarificare. Si prenda poi la Canape, e si pesa, e per ogni dieci Libbre d' essa vi si pone una Libbra e mezza di Sapone grattato: e si mette a molle, facendola stare per 24. ore nella suddetta Lisciva ben chiara. Indi si fa bollire per due ore continue, e poi si leva, ponendola ad asciugare all' ombra; ed asciugata ch' è, si fa gramolare con ridurla in mancellette, e poi si fa consiare ad uso di Lino.

Mostrommi la Signora Marchesa Fontanelli, Dama di costumi antichi, una manella di Canape acconsiata nella forma suddetta, e talmente spinata, che ognuno la prenderà per Lino: tanta è la sua sottigliezza, e col colore stesso del Lino. Fors' anche merita d'esser stimata più del Lino, perchè la sua fibra è più forte dell' altra. Hassi in oltre da osservare, che i nostri Contadini, perchè Fuggi-fatica, tagliando le gambe della Canape, ve ne lasciano tre, o quattro dita sopra la terza. I Bolognesi siccome più industriosi, la tagliano con ferro apposta sotterra di modo che guadagnano anche due o tre altre dita della medesima gamba. Ma in Francia per nulla perdere cavano intera la bacchetta colle radici: macerata poi ch' è, e seccata la Canape, da
noi

noi si usa di romperla con bastoni . Cagione son queste percosse , che si rompano moltissimi filamenti d'essa Canape , dal che poi viene una buona perdita , cioè la stoppa , che si ricava in gramolarla . Questa perdita la risparmiano i Francesi , perchè colle dita cominciando dal fondo , frangono le bacchette , e fanno tirare intera la falda fino alla cima , con gramolarla poi soavemente . Altre maniere ancora più utili converrebbe apprendere da' Paesi stranieri , dove si fabbrica gran copia di tele o ordinarie , o sottili , sì per filar la Canape alla rocca , o al molinello ; come anche per tessere e imbiancar le tele . Usano , per esempio , le nostre Donne d' avvolgere alla rocca il garzuolo della Canape : laddove in Francia si lasciano pendenti dalla rocca le falde , come si fa in filare la Lana : vien meglio il filo . Se il telaio non è ben fermo , sovente si trova non essere uguale in tutti i lati la tela . Per la bozzina le tessitrici nostre usano la crusca . Altro effetto fa il fior di farina , come si pratica in qualche paese d'oltramonti . In somma tutte le Arti converrebbe perfezionarle per quanto si può , osservando ne' varj paesi il meglio delle Manifatture . Tali ricerche sono ben più da stimare , che le vane speculazioni di certi Filosofi , ed anche Teologi , imparate le quali nulla s' impara . Sapone occorre per sottilizzare la Canape . Ne può facilmente fare ogni Città per uso e comodo proprio . Che goffaggine è mai quella d' un paese , che tutto se lo procacci d' altri paesi , e ne pur sappia far Saponate per le barbe ! In quelle contrade ancora , dove il medesimo Sapone si fabbrica , ma di cattiva qualità , merita d' essere derisa tanta negligenza : giacchè Città vi sono , che ne fabbricano dell' ottimo e del più sodo , dalle quali si può con tanta felicità imparare la vera dose . Diciamo ancora questa . Niuna fatica durano i Contadini a far nascere Urtighe ne' Campi loro . La natura senz' esser pregata , fa loro spontaneamente questo brutto regalo ; quanto più grasse son le terre , tanto più volentieri questa mal' erba ivi s' alligna , e non molestata , a poco a poco si dilata , e forma de' piccoli boschi . In vece di schiantarla dalle radici , sogliono per lo più i Villani tagliarla sopra terra : ed ecco la medesima risorgere come prima . Ma almeno sapesse questa gente convertir sì fatto male in bene .

Non

Non mancano Popoli industriosi, che a guisa della Canape e del Lino, fanno macerar le Urtighe colla rugiada o in altra guisa, e formarne poi Tela, appellata *Urtigina*, fors' anche più forte di quella di Canape. Se i nostri lavoratori han paura di pungerli le mani, troveranno ben presto chi loro insegnerà la maniera di difendersi da quelle punture.

Bene sarebbe, che si facessero correre stampati per le mani del Popolo certi utili e sicuri segreti, per aumentare l'Agricoltura, ed altre invenzioni di Macchine vantaggiose al pubblico. Ha bisogno la gente rozza ed ignorante d'esser ajutata e commossa. Istruita che sia in cose, delle quali riconosca l'utilità, allora talun mette mano a quel profittevole impiego, e l'esempio eccita all'emulazione. Nel Veronese, Vicentino e Trivigiano, fatto ch'è il raccolto de' grani, tosto si semina il *Sorgo*; sorta di legume, onde si fa farina migliore e più salubre, che quella del frumentone o sia Maiz; e se le piogge favoriscono, se ne ricava buon frutto. Non converrà questo legume ad ogni paese: ma certo non si dovrebbe trascurare di farne la prova in quei, che hanno del terreno sassofo, perchè solamente in questo riesce bene. In Francia usano molto il *Grano Saraceno*, che ha la corteccia nera, laonde s'ha da vedere, se sia lo stesso, che il *Sorgo*. Finalmente se alcuno merita d'esser trattato con soavità e peso discreto, principalmente degna è d'ogni riguardo l'università de' Contadini, dalle fatiche de' quali dipende uno de' primari tesori della Repubblica; che tale appunto si dee chiamare l'*Agricoltura*. Qualora quel povero Popolo venga indiscretamente caricato di gravezze, e patisce varie angherie, che con facilità vanno sempre inventando i Ministri del Principe, o del Pubblico, e senza distinzione alcuna di tasse, fra chi coltiva buoni terreni, e chi è condannato a coltivarne de' cattivi, e sterili: troppo si scoraggisce con incredibile danno della Campagna, e del Pubblico. Chi non vede la necessità di rimediare a questo disordine, e di animare i poveri Lavoratori al troppo necessario loro mestiere, in vece di disanimarli? Sarebbe anche da desiderare, che ogni Città imitasse l'istituto dell'antico e prudentissimo Re Numa, il quale per attestato di Dionisio

nifio Alicarnasseo, deputò per ogni Villa un Sopraintendente all' Agricoltura. Visitava questi le campagne, osservando quali fossero benè, e quali male coltivate, e tutto metteva in iscritto, per informarne il Re, il qual poscia faceva lodare, e premiare gl' Industriosi, e ammonire e correggere i pigri. Dov' è la Congregazione del buon Governo, potrebbonsi ad essa portare somiglianti Relazioni, acciocchè provvedesse. In altri Paesi basterebbe un Ministro deputato a questa faccenda. Di troppa importanza è l' Agricoltura, nè si dovrebbe trascurar diligenza alcuna per emendarne i difetti, e migliorarne lo stato. Da essa (convien ripeterlo) dipende l'alimento, e il vestito del Popolo; da essa la materia per le manifatture, e il tirar danaro col più delle Sete, Lane, Grani, Vino, Olio, Bestiami ec. Ma noi per poca avvertenza stimiamo assai, ed onoriamo certe Arti utili, o solamente destinate al lusso; poco conto facciam di quella, ch'è la più importante dell'altre.





MASSIME GENERALI

*Molto importanti, utili e necessarie, da praticarsi
nella buona Agricoltura.*

Prima, mettere il suolo della Terra in positura tale, che non possa così facilmente essere portato via dalle acque piovane, e superficiali; e renderlo sano dalle sotterranee, quando di sua natura non fosse; e nelle pianure, che restano troppo basse e soggette alle inondazioni, è necessario necessarissimo cercare, e trovare il modo d'alzarle, o come altri dicono colmarle; pigliando le torbe dall'escrescenza de' fiumi o torrenti più vicini, dalle quali se ne ricavano utili di grosse conseguenze.

Seconda, si scelga, e si metta la terra più attiva e migliore intorno alle barbe delle piante, in maniera che possa facilmente subito darle tutto l'incremento; e queste si scelgano altresì capaci, e si piantino in modo che possano immediatamente pigliarlo colle loro barbe nella maggior quantità possibile.

Terza, si tenga la Terra con la lavorazione in continua attività, affinchè il nutrimento e lo spirito resti più anticipatamente che sia possibile impiegato a beneficio delle piante, e delle sementi; nè se ne perda mai neppure una minima parte inutilmente.

Quarta, che la Terra non resti mai oziosa; ma sempre piena di quelle piante, e di quelle sementi più proprie, più sicure, e più utili, e vantaggiose, e che portino seco meno spesa, e meno rischio.

TRATTATO DELLE VITI.

*Della qualità del Terreno, e del sito
per le Viti.*

CAPITOLO PRIMO.

Prima di venire alla risoluzione di piantare non solo le Viti, ma qualsivoglia altra sorta di piante, è necessario riconoscere la qualità e positura del Terreno.

Ogni sorta di Terreno, dove nascono spine, roghi, ginestre, mortelle e simili, è buono per vigne; eccettuato quello, che nella State s'apre eccessivamente: questo è cattivo, non solo per vigne, ma per altre piante ancora, per essere in primo luogo di sua natura troppo forte e bizzarro, e perchè in quelle grandi aperture vi penetra il Sole; e il gran caldo fino alle radici delle piante; e in oltre serrandosi e costringendosi eccessivamente insieme per il troppo asciuttore, quella sorta di Terra così bizzarra, viene ad allontanarsi dalle barbe delle piante, e perdere, per così dire, la sua attività: onde addormentandosi queste non possono attrarre dalla Terra il dovuto nutrimento, perchè restano come distaccate, e abbandonate. Se poi questa sorta di Terra fosse in Paesi, dove si potesse adacquare, farebbe molto buona, per essere di sua natura forte, e sostanziosa, e farebbe molto vino, ma non di grande spirito, nè di delicato sapore e odore. Al contrario il Terreno leggiero, e sottile, e asciutto, e sassoso, purchè sia in paese caldo, produce le Viti più deboli, che fanno meno vino, ma molto più saporito, odorifero, delicato, e durevole.

Il sito per le Vigne è di due sorte, cioè in colline, e in pianure. Nelle colline, che sono esposte a Tramontana, le viti fanno molta più uva di quelle, che a mezzo giorno; perchè non sono tanto soggette a pati-

re, l'asciuttore della State, e possono più facilmente fecondare le fortite, che devono servire per il frutto dell'anno venturo, eccettuati quei luoghi ove i freddi fossero molto eccessivi. Quelle poi, che restano a mezzogiorno fanno meno vino, ma assai migliore, mentre l'uve si maturano più perfettamente. Verso Oriente è bene piantare vitami d'uve, che patiscano danno dalla nebbia e dalla rugiada, come sarebbero Moscadelle, Dolcippole, Claretti rossi di Francia, Trebbiani di Spagna, uve Greche e simili, che fanno le pigne ferrate, e di guscio gentile, osservandosi però sempre la qualità e proprietà del suolo. E' superfluo dire ciò che dice Virgilio, che non è buono per le viti il sito verso Occidente; ma non pare, che questa possa esser regola generale, attesocchè per alcuni vitami può benissimo esser profittevole, e vantaggioso, cioè per quelle asciutte, e di guscio duro, alle quali le ruggiade e le nebbie possono esserle di giovamento; avuto però sempre il dovuto riguardo alla qualità del Suolo. Al contrario per quelle di guscio tenero e troppo gentile sarebbe assolutamente di pregiudizio. Osservando sempre di non piantare una vigna tutta di un medesimo vitame, ma di più e diverse qualità, perchè si adattino, e siano proprie per la qualità del suolo; poichè dandosi il caso, come bene spesso accade, che un anno un vitame frutti poco, nell'altro può fruttar molto, e perciò si piantino di più sorte, ma sempre con la dovuta necessaria avvertenza, che una qualità faccia lega con l'altra; perchè la mescolanza dell'uve di sorte molto differenti piantate a caso, è accidente che qualche volta facciano vini di sapor delicato; e che si conservino senza qualche imperfezione. Ond'è, che per fare i vini buoni e delicati, e che si conservino tali, si ricerca l'appropriare i vitami alle qualità dei terreni, e accozzare insieme la dose dell'uve; e però quando una vigna nuova comincia a fruttare, io stimo necessario, che si faccia la prova, scegliendo sempre l'uve mature e perfette, e pigliandone una porzione per sorta, metterle insieme per vederne con la sperienza poi l'esito; e trovando, che facciano il vino a seconda del genio, e del gusto di chi deve berlo, convien pigliarne il ricordo per darle l'ordine ogn'anno. Se poi non faces-

sero bene, si muti la dose dell'uve, ch'è quanto dire, di una sorta crescerla, e dall'altra scemarla, e così andar seguitando fino a tanto che non sarà ridotto il vino alla perfezione, ed al genio e gusto di quelle persone, che dovranno berlo; poichè molte volte fidandosi delle vigne, cogliendo l'uve a caso e alla rinfusa, senza osservare se i vitami abbiano fruttato ugualmente, si vede poi, che i vini fanno della variazione da un'anno all'altro, oltre a quella, che possono fare dall'essere un'anno l'uve poco, e l'altro molto mature; derivando ciò dal non fruttare i vitami ogni anno ugualmente; onde ritorno a dire, che si collegano gli assortimenti dell'uve dappertutto, e non a caso e alla rinfusa.

In ultimo di questo Capitolo dico, che quando si vogliono fare vigne di nuovo, ovvero rifarne di quelle, che già sono andate male, o disfatte, si osservi, e si riconosca prima esattamente la qualità della terra, la situazione e positura del luogo; scegliendo poi i migliori di vitami di sorta, che si confaccia alla qualità della terra; poichè essendo quella di sua natura molto grassa, umida, e sostanziosa, vi si metteranno vitami che facciano l'uve asciutte, sode, di guscio duro, e le pigne non molto ferrate, perchè questa sorta d'uve ha sussistenza capace di resistere anche nelle terre umide e grasse, ove non crepano nè marciscono i granelli con quella facilità, che farebbero, se fossero uve di guscio gentile, delicate, molto umide, e con le pigne ferrate, alle quali ogni piccola pioggia, nebbia, o altra umidità fa, che crepino e marciscano i granelli molto prima della vendemmia. Al contrario nelle terre leggiere, asciutte, non molto grasse e di poco corpo, siccome in altre, che nella state s'asciugano facilmente, si costringono, s'uniscono, e si ferrano insieme, facendo dell'apertura, si piantino vitami d'uve di guscio gentile, umide, e delicate, come farebbero Dolcippola, Moscadella Bianca, Claretto rosso di Francia, Tribbiano di Spagna, o sia uva greca, Verdea, Barbarossa e simili; perchè in queste sorte di terre resistono molto più, facendo il vino di miglior sapore, più spiritoso, odorifero, delicato, e durevole. Nè si lasci d'osservare alla qualità dell'aria, e del clima, ch'essendo caldo vi si piantino vitami d'uve dure, e sode, che maturano più
diffi-

difficilmente, come farebbero, Lacrima di Napoli, Ra-
faone, Malaga bianca e rossa, Claretto di Francia, Va-
gano, Zeppolino imperiale, o sia uva tedesca, e simili
altre uve, che maturano perfettamente con difficoltà.
Laddove nell'arie più fredda, che restano esposte a Po-
nente, e Tramontana vi si piantino vitami d'uve, che
maturano presto, come il Raverusto dolce, Colore ca-
nino, Canaiola, Moscadella bianca, Tribbiano Fioren-
tino, Pignolo, e simili. Assicurando ognuno, che con
questo modo di piantare si viene molto a emendare, e
correggere i difetti, che per loro stesse hanno le mede-
sime uve, per non dire quelli delle Terre.

CAPITOLO II.

Del modo di far le fosse per le viti.

Riconosciuto ch' avremo minutamente il terreno, se
sarà in paese montuoso e scosceso, dove l'acque
delle grosse piogge portano sempre via della terra, si
facciano le fosse profonde e larghe più di due braccia:
se poi fosse in Valli, o in altri luoghi, che vi potesse
scendere della terra portatavi dall'acque piovane, si
facciano le fosse meno profonde, ma sempre con l'
istessa larghezza di più di due braccia, e colla dovuta
necessaria avvertenza, mentre si scavano le fosse, di
scegliere, e mettere separatamente tutta da una parte
la Terra superficiale e migliore, e dall'altra la cattiva,
e non addomesticata, nè mai confonderla, per non a-
verla a cercare e mendicare, quando si piantano i ma-
gliuoli, ed altre piante; essendo questa per verità una
cosa di gran rilievo, e di somma importanza, benchè
sia pochissimo praticata. Fatto adunque le fosse, come
sopra si è detto, si pulisca, e si sbarazzi tutto il fondo,
levando i sassi, le cioeche, e radiche di legnami, o
altro che vi fosse, acciò si possa vedere, se l'acque sot-
terranee possono avere felicemente il loro dovuto e ne-
cessario esito: e trovando che siano a dovere, si fac-
cia per tutto il mezzo del fondo delle fosse una fogna
andante, composta di tre sassi grossi, cioè uno in mezzo
messo per diritto, e li due altri, uno per parte, appog-
giati in modo, che fra quelli è il sasso di mezzo vi

resti sempre tanto di vuoto per dove possano scorrere non solo tutte l'acque de' gemitivi, e travenate per la terra; ma le piovan ancora, che necessariamente per molto tempo vi penetrano dalla superficie; affinchè le viti, ed altre piante non sieno mai soggette a patire la soverchia umidità, e si renda sano tutto il suolo dalla coltrivazione e campareccia adiacente, quando di sua natura non fosse. In oltre si rifianchi benissimo d' ambe le parti la detta fognà con sassi piccioli e minuti, acciò restino ben serrate alcune buche e aperture, che sogliono restare tra un fallo e l'altro delli due appoggiati a questo di mezzo.

La maniera di fognare nel modo quì sopra descritto, secondo me, è assai migliore, e più facile di quella, che molti usano, pigliando anche essitre sassi, mettendone due dritti per tutto il fondo delle fosse, lontani circa un palmo l'uno dall' altro, e mettendo il terzo sopra i detti due, in modo che le fogne vengano a guisa di cassette, quali sono più pericolose, ed è più facile che restino serrate, e accecate, mentre può rompersi qualche sasso, in particolare di quelli, che sono al di sopra, ovvero possono entrarvi, e morirvi degl' animali, siccome in lungo andare possono essere rovinate e serrate affatto da qualche barba di pianta grossa, come di fico, pero, melo, ec. oltre al maggior perdimento di tempo, perchè non tutti i sassi sono al calo; attesochè per questa sorta di fogne è necessario, che siano almeno mezzi addattati e avverfati: laddove per farle nella maniera da me proposta, tutti i sassi un poco grossi sono a proposito, e riescono le fogne più stabili e sicure, non essendo così soggette al pericolo di restar serrate e accecate, perchè con tre soli sassi, messi nella maniera sopra descritta, si vengono a fare due fogne; che quando mai per accidente in lungo andare si accecasse da una parte, resta aperta dall' altra. Fatte adunque che saranno le fogne, come sopra si è detto, si coprano subito copiosamente con fasci di stipa, o altro legname verde e grossolano; onde così fatte, fognate e stipate le fosse si lascino per qualche tempo così aperte al caldo, ed al ghiaccio senza piantarvi i magliuoli, ed altre piante, massime nelle terre forti, umide, e grasse, affinchè riacorte, e dal caldo della State, e dal ghiaccio del ver-

no,

no, venghino a renderli quelle terre più trattabili, ed atte ad abbracciare le piante con maggiore attività e facilità: laddove nelle terre leggiere, deboli, asciutte, di poco corpo, non è tanto necessario lasciarle così aperte senza piantarvi, perchè sieno ricotte, e dal caldo, e dal freddo; ma praticandosi non farebbe altro, che bene, mentre acquisterebbero maggiore attività.

Io non dico quì niente per quello che riguarda il modo di cavare, e portar via dalle coltivazioni tutte l'acque piovane superficiali, e sotterranee; nemmeno l'ordine, che deve praticarsi per le distanze delle fosse, e delle piante, mentre penso di dir qualche cosa in appresso nella coltivazione degli Ulivi, che possa servir di regola anche per quelle delle Viti, ed altre piante.

CAPITOLO III.

Del modo di scegliere, e conservare i Magliuoli.

Volendosi fare una nuova coltivazione di viti, si faccia prima un'esattissima riflessione per venire in cognizione delle qualità dell'uve, che possono esser proprie per il terreno, e per il clima; pensando poi per tempo al modo più sicuro di fare la scelta, e provvisione de' magliuoli, mentre non si abbiano vigne, che sieno già piantate con gli assortimenti dell'uve separate. In questo caso s'imo necessario pensare preventivamente a farne la provvisione in tempo che le Viti abbiano le loro uve, andando a contrassegnare tutte quelle, dalle quali si vogliono staccare i magliuoli, che si stimano proprij per la nostra coltivazione, facendo ad ogni Vite una legatura con falcio, come per esempio a quelle d'uva bianca con falcio giallo, a quelle d'una rossa con falcio rosso; e secondo le diverse qualità dell'uve che bisognano, si praticano diverse sorte di legature, come di ginestre, o altro che si stimi proprio; ovvero si tingono le Viti con tinture di diversi colori, pigliandone esattamente i dovuti ricordi, per poter fare gli assortimenti sicuri; poichè venendo il tempo di staccare i magliuoli dalle loro Viti, si possono più facilmente assortire le qualità dell'uve senza confondere e mescolare una sorta coll'altra; ed occorrendo, come bene spesso accade, di dovere stac-

care i magliuoli qualche tempo prima di piantarli , s' avverta di non legarli in fasci grossi , ma piccoli di venticinque , o trenta per fasceto , stringendoli poco colle legature ; perchè legandoli in fasci grossi , per metterli sotto alla terra per conservarli , quelli che restano al di dentro , e in mezzo de' fasci non la toccano , e patiscono così fortemente l'asciuttore , che in breve tempo perdono la loro attività , e diventano languidi , e vizzi , per non dir mezzi secchi : onde nè nasce che molti se ne perdono affatto , ed altri s' attaccano così debolmente , che non possono mai ritolvere per farli viti robuste e grosse .

Per conservarli adunque nella miglior forma , si scelga un luogo di terra sottile , leggiera , ed asciutta , che sia esposta all'aria di mezzogiorno più che sia possibile ; ed ivi si scavi una fossa capace per tutti i magliuoli , che si vogliono conservare , fondandola benissimo con sassi , mettendovi sopra stipa , o altro legname minuto , facendovi poi un suolo di terra gentile , per mettervi tutti quei magliuoli , che si vogliono conservare , distesi e legati in piccioli fascetti poco serrati ; mettendo ad ogni fascetto il suo ricordo scritto , riposto in una canna , ovvero se ne pigli nota in qualche altra maniera per ritrovare le qualità dell'uve , ch'è cosa di somma importanza ; coprendoli poi con terra leggera e sottile , acciò non possano mai fermarvisi , nè stagnarvi l'acque piovane ; ma possano scorrere , e andarsene subito sotterraneamente per la fogna per non essere di pregiudizio a' magliuoli ; ovvero si mettano in una cantina , o in altro luogo caldo , legati come sopra , e distesi in terra , e coperti benissimo con rena molle ; o pure si mettano distesi nell'acqua tanto al fondo , dove non possono sentire nè il ghiaccio , nè così facilmente il caldo .

Le suddette tre maniere , secondo me , sono le migliori , e più sicure per conservare i magliuoli . Alcuni usano di legarli serrati a grossi fasci , mettendoli nell'acqua per dritto forse meno della metà , o in terreni grossi e umidi , ove il ghiaccio li danneggia ; perlocchè molti non s' attaccano , ed altri s' attaccano così debolmente , che fanno sempre piccole e minute gettate con poco segno di perfetta salute , restando sempre viti picciole , languide , miserabili , e poco fruttifere .

Do-

Dovendosi poi trasportare da un Paese all' altro, ancor che non fosse molto lontano, s' avverta di non farlo in giornate molto rigide e ventose, che lor sarebbe di pregiudizio asciugandoli. Avvertasi ancora, tanto nel trasportarli, come nel sotterrarli, che non se li guastino gli occhj, nè si sbuccino, nè si faccia loro altra lacerazione; e perciò si fascino bene con fieno, ovvero si usino delle stoje o pani lani; e caso che l' accidente portasse, che dovessero stare più d' un giorno per viaggio, si facciano bagnare almeno una volta il giorno, gettando l' acqua sopra a' fasci senza scioglierli, in maniera che tutti i magliuoli restino bagnati, giacchè per molti capi è quasi impossibile di potere staccare tutti i magliuoli dalle loro viti, e piantarli subito nelle coltivazioni, quali fanno allora prove molto migliori di quelli ancora, che sono stati conservati nelle due maniere più sicure; essendo cosa certa, che ogni piccolo asciugatore, o superflua umidità che patiscano, fa che quei piccoli fermenti s' illanguidiscano, e perdano la loro vivezza, e pronta attività; avendo io ciò veduto più volte coll' esperienza, maestra infallibile di tutte le cose. Ma perchè si riducono a pochi quei magliuoli, che si possano piantare subito staccati dalle loro viti, anche quando si abbia la comodità di tagliarli vicini alle coltivazioni, ove debbon piantarsi; attesocchè queste potrebbero essere di sua natura in terre forti, umide e grasse, dov' è necessario piantare d' Aprile, e Maggio, in tempo che le viti sono entrate in azione, e hanno già melo; onde ognun sa che si debbono staccare i magliuoli dalle viti prima che mettano, per conservarli fino al tempo che debbon piantarsi; ed è vero che alcuni di quelli da piantarsi ne' Mesi d' Aprile, e Maggio, si possono staccare dalle viti, e metterli subito nell' acqua, per lasciarveli fino che non cominciano a mettere; ma quando si vedesse, che cominciassero a entrare in azione, il che si conosce dall' ingrossare e gonfiare che fanno i loro occhj, e non si potessero per allora piantare, si cavino immediatamente dall' acqua, sotterrandoli, come sopra si è detto, in maniera che non possano sentire il caldo, acciò non mettino, nè asciugino.

Quando si fanno le scelte de' magliuoli, mentre si staccano dalle viti, si stia bene attenti in non pigliarne alcuni

cuni molto grossi, che hanno gli occhj piccoli, e lontani l'uno dall'altro, e quasi ad ogni occhio n'è sortito un fermento: nemmeno altri che sono molto sottili e minuti, non essendo buoni nè gli uni, nè gli altri, essendo i primi difficili a mettere le barbe, perchè essendo stati toccati con troppa violenza da tutto il vigore e forza della vegetazione, non hanno potuto fare a meno di non gonfiarsi, ingrossarsi, e allungarsi estremamente, e così restar flosci, e come vuoti, e poco o niente assodati, e con pochissima attività. Al contrario gli altri che per mancanza di nutrimento, e di forza restano sempre troppo sottili, e minuti, non possono fare buona riuscita; ond'è che nè gli uni nè gli altri, possono essere neppure di mediocre bontà, essendomi ciò stato più volte confermato dall'esperienza.

I magliuoli perfetti sono quelli di una mediocre grossezza, che hanno gli occhj grossi, rilevati, e vicini l'uno all'altro, essendo questi totalmente pieni, fissi, consolidati, e con molta attività; quali nell'atto di staccarli dalle loro Viti, s'osservi, se vi si potesse lasciare, oltre al capo che deve servire per il magliuolo, (sempre colla dovuta avvertenza di non pregiudicare al frutto dell'anno venturo) qualche altro capo, o fermento assodato e buono, spuntandosi questo alla lunghezza di due, o tre occhj, lasciandoli attaccati alla croce, o, come altri dicono, crocetta del magliuolo, purchè non vi sia niente di secco e imperfetto; poichè prestano questi maggiore attività, e servono di non ordinario vantaggio per l'attaccamento e assicuramento de' magliuoli.

CAPITOLO IV.

Del modo e del tempo di piantar le Viti, o feno Magliuoli.

Lasciate ch'avremo per qualche tempo le fosse scavate, fognate, slipate, e senza piantare, si prendano quei magliuoli già scelti, e destinati propri per la qualità della Terra, e del Clima, imbrattandoli per due palmi almeno con sterco Vaccino, o Pecorino sfatto benissimo con acqua, in modo che mettendovi i magliuoli ne restino bene coperti, affinchè più facilmente

te

te s'abbraccino, e s'uniscano colla terra. Si piantino adunque così imbrattati nel mezzo delle fosse, lontani circa un braccio l'un dall'altro, ben dritti e affilati, tirandovi prima un suolo di terra della scelta e migliore per l'altezza di un palmo almeno sopra la stipa, dove si piantino i magliuoli dritti perpendicolari, senza sforcerli nè piegarli nulla affatto; poichè la piegatura e torcitura, che quasi da tutti vien praticata, non serve ad altro, che a farli della lacerazione, e delle sfigliature; ond'è, che da questi luoghi così lacerati e sfigliati non possono mai sortirne le barbe; e s'avverta di piantarli in modo, che nelle terre leggiere, sottili, asciutte, e soggette ad essere sbassate e portate via dall'acque piovane, restino al fondo poco meno di quattro palmi; e nelle terre forti, umide e grasse, e che risiedono in valli, o in altri luoghi, dove non ne possa scendere per l'acque delle piogge, si piantino al fondo tre palmi, e forse meno, mettendoli intorno per l'altezza di due palmi in circa tutta la terra scelta e migliore, e si governino comodamente bene nell'atto di piantarli con qualche sorta di concime spiritoso, e bene smaltito, mettendolo vicino a magliuoli, mescolato con la terra scelta senza pigliarla nè calpestarla co' piedi, per non diminuirle la sua attività, acciò possa facilmente attrarne le barbe, e queste possino agire con tutta vivezza e facilità. E per assicurarsi, che stiano perpendicolarmente dritti, si metta, mentre si piantano, a ciascheduno un piccolo paletto, o canna, dove si fermano tirati su dritti con semplice legatura, per tanto che sieno ripiene le fosse a quell'altezza, che richiede il bisogno, levandosi poi i paletti e canne per servirsene ad altri magliuoli. E caso che ne restassero alcuni senza attaccarsi, si ripiantino dell'istesso vitame subito l'anno susseguente, scavando con la vanga la buca più larga che sia possibile, purchè non si guastino le barbe, nè si smuova la terra intorno agl'altri, che gli stanno appresso, già piantati nell'anno passato; e si vada tanto al fondo, che si ritrovi la stipa; piantandoli poi colla medesima avvedutezza di governarli, e ricalzarli colla terra migliore senza pigliarla, nè calpestarla, lasciandola così sciolta e sollevata.

Io dico, che si piantino, e si ripiantino i magliuoli con la vanga; perchè non lodo, anzi condanno, il
modo

modo che da molti vien praticato di piantarli, e ripiantarli colla croccia; poichè non si possono in modo alcuno piantare con tutto quel legname, e quella croce che loro si lascia, quando la buca è fatta colla vanga oltre al non poterli mai ferrarli, e accostarli bene la terra all'incontro, e allo sfigliarsi e guastarsi loro gli occhj, mentre si spingono abbasso con forza, per l'angusto e piccolo foro fatto colla croccia.

Piantati adunque, e addirizzati che saranno i magliuoli, come sopra si è detto, si vada avanti con la riempitura delle fosse, mettendo sopra sempre la terra più cattiva, e non addomesticata, coll'avvertenza di non riempirle affatto, lasciandole a erte, che vale a dire più alte un palmo in circa della Campareccia adiacente, nel mezzo appunto, dove sono i magliuoli, per terminarle di riempiere, e metterle in piana positura nell'anno susseguente, mentre si dovranno scalzare, governare, e ricalzare i magliuoli, ed altre piante.

Dopo piantati i magliuoli, e ripiene le fosse, come sopra, si lascino senza spuntare fino a tanto che non sia venuta una pioggia, che abbia un poco riunita, e abbassata la terra delle fosse, indi si spuntino in modo che resti solamente un occhio fuori della terra, coll'avvertenza di tagliarli più lontano che sia possibile dall'occhio che si lascia sopra la terra, ch'è quanto dire vicino all'altro che deve levarsi; poichè la tagliatura fatta troppo vicina all'occhio, che si lascia per la nuova sortita, potrebbe indebolirli, e pregiudicarli: e caso che andassimo incontro alla Primavera, e che i magliuoli cominciassero a entrare in azione, e non fossero venute piogge, si spuntino non ostante; il simile a quelli che si piantano ne' Mesi di Marzo, Aprile, e Maggio; poichè è sempre bene spuntarli prima che comincino a muovere.

Si piantino sempre diverse qualità di vitami in una medesima coltivazione, purchè sieno proprj e confacenti alla qualità del suolo, e al Clima, ma non mescolati, nè alla rinfusa; piantandone una, due, tre e più fosse unite insieme di un medesimo vitame, e così si vada seguitando per tutta la coltivazione, senza confondere le qualità dell'uve; poichè volendocene fare scelte, tanto per serbare, che per farne vini, riescono fatte facilmente con poco perdimento di tempo, il simile

mile quando si vogliono fare scelte di magliuoli, e assortimenti di vitami, riescono fatte giustissime, e con poca fatica; e di quì è ch'io consiglio ogn'uno a non lasciar mai questo bell'ordine di piantare in una medesima coltivazione diverse qualità di vitami, ma sempre dapper loro separati gl'assortimenti, e non a caso, nè alla rinfusa, per non averli a trovare in un continuo imbarazzo, quando si volessero fare scelte d'uve, e di magliuoli; poichè oltre alla fatica, e perdimento di tempo, sarebbe cosa molto difficile, che riuscissero fatte sicure e giuste.

Riconosciuto che avremo il terreno, e trovato di qualità leggiero, fertile, ed asciutto, e non esposto totalmente alla Tramontana, nè in Paese molto freddo, si possono sicuramente cominciare a piantare i magliuoli, passata che sia la metà del mese di Novembre, e seguitare continuamente per tutto l'Inverno, sempre più anticipatamente che sia possibile: al contrario nel terreno molto forte, e soggetto all'umidità si piantino ne' mesi di Marzo, d'Aprile, e talvolta di Maggio; e ne' Paesi molto soggetti alla Tramontana, e al freddo, sieno di che natura esser si vogliono, si piantino nella stagione di Primavera, sempre in tempo, che la terra non sia troppo bagnata, e in giornate belle temperate, che sono sempre utili: avendo anche riguardo al tempo di staccare i magliuoli dalle loro viti, ch'essendo questi in terre pronte, leggere, fertili, e asciutte, esposte al caldo, si possono cominciare a staccare circa alla metà del mese di Novembre. Laddove nelle terre poco attive, forti, umide, e grasse, esposte alla Tramontana, e al freddo, non si comincino a staccare prima della metà di Dicembre; acciò sieno fissi, consolidati, e atti alla vegetazione.

Coll'occasione di far coltivazioni di viti, se ci dilettaffimo di piantar frutti, mentre lo richiedesse il terreno, ed il clima, si piantino nelle medesime fosse de' magliuoli in distanza di dodici, o quattordici braccia lontani l'uno dall'altro; e caso che le fosse fossero molto vicine l'una all'altra, si piantino i frutti in una fossa sì, e due nò, e più e meno secondo le distanze; mentre si deve osservare, che i frutti facciano sempre fra di loro dirittura per tutti i versi, e tornino per ogni parte in giusta e debita lontananza di dodici, o quattordici braccia.

In

In ultimo di questo Capitolo avverto una cosa di molta importanza, ed è che per tre anni almeno non si pianti, nè semini mai nelle fosse, nè vicino a magliuoli e altre piante nessuna sorta di robe, che sono molto pregiudiziali colle loro benchè piccole ombre, e impediscono, che nell'estate non si possino più volte zappare, e smuoverli la terra all'intorno, che sono cose di non ordinario vantaggio.

Nè si lasci in oltre ne' mesi d'Agosto e Settembre di riconoscere esattamente tutti i magliuoli piantati del medesimo anno, zappando, e smuovendo loro andantemente per tutta la fossa la terra all'intorno, levandoli tutte l'erbe; e trovandosi magliuoli attaccati con molta forza, e che avessero fatte più sortite dal medesimo occhio, come suole facilmente accadere, si levino tutte, a riserva della più bella e migliore, per non perdere nulla di nutrimento, inviandolo addirittura per la detta sortita; dandole tosto un avviamento capace di cominciare in certa maniera il fusto della vite. E resti ognun persuaso, che avendo fatte io, come sopra, moltissime coltivazioni in diversi luoghi della Toscana, nel primo anno i magliuoli mi hanno sempre fatte sortite di quattro, cinque, sei e fino in sette e otto braccia di lunghezza universalmente tutti, con ammirazione di molti Signori, ed altre persone capaci, e pratiche.

CAPITOLO V.

Del modo d'allevare, e coltivare i Magliuoli il primo anno dopo piantati.

PAssata che farà la metà del primo mese di Novembre, ovvero all'incirca, dopo piantati i magliuoli, si scalzino mezzo braccio in circa col dovuto riguardo di scalzarli un poco più al fondo nelle terre sottili ed asciutte, dove vi entra più facilmente il caldo, che nelle grosse, e atte a ritenere in se stesse della soverchia umidità: vangando, o zappando andantemente la terra per tutta la fossa senza staccare, o fare, come molti praticano, solamente le buche intorno a' magliuoli, tagliandosi tutte le radici, o barbe che si trovano in quel mezzo braccio di fusto scalzato, a riserva di

di alcune grosse e maestre che fossero al fondo circa a un palmo e bene internate nella terra con le cime all'ingiu, e si spuntino le sortite, o siano capi, (ciò che si chiama potare) alla lunghezza di due, tre, quattro, o cinque occhj, sempre col dovuto riguardo, che resti addattata la lunghezza delle sortite, e la quantità degl' occhj, che loro si lasciano, alla forza e robustezza de' magliuoli; purchè il numero degl' occhj non passi mai quattro, o cinque al più, trattandosi di magliuoli estremamente gagliardi; facendosi quest' operazione con ferri taglienti, che facilitano e diligentano molto il lavoro; indi si governino i magliuoli con due grosse giumelle di concime per ciascheduno, più spiritoso, smaltito e trito, che sia possibile, mescolando un poco colla terra; e si metta dappertutto con diligenza vicino alle barbe, in maniera che possano subito approfittarsene, e cominciarne a sentire il beneficio. Mettali immediatamente subito a ciaschedun magliuolo un piccolo paletto, o canna, dove si fermino, tirati sù dritti, con legatura fatta appunto sotto all' occhietto, che resta all' estremità del magliuolo, e nel medesimo tempo si ricalzino colla terra senza pigliarla, e si seguiti con quest' ordine, a vangare, o zappare andantemente le fosse, terminandole di riempiere, mettendo il suolo in piana positura, e in maniera che s'unisca coll' altra superficie della Campareccia adiacente.

Giunti poi a' mesi di Maggio e Giugno si tornino a rivedere, osservando esattamente la quantità de' capi, che ne saranno sortiti; e si taglino, o si strappino tutti, a riserva del più bello, grosso, e robusto, che naturalmente dovrà esser sortito dall' occhio più alto, e vicino all' estremità; questo solo si lasci, allacciandolo, e fermandolo sù dritto al palo, con semplice legatura poco ferrata, fatta con ginestra, o fila d'erba, lasciandolo crescere fino all' altezza di due braccia e mezzo in circa sempre dritto obbligato al palo, e tosto si spunti, tagliando in maniera che resti alto braccia uno e mezzo, e forse meno; avuto riguardo alla sua robustezza, ch'essendo mediocre, o che partecipi del debole, si lasci un poco più corto; e nel medesimo tempo si osservi, che se già abbasso vi fossero di nuovo venute delle sortite, si levino tutte intieramente, affinchè il nutrimento resti

resti tutto obbligato a beneficio del capo spuntato , e faccia con maggior forza tutta la sua azione nel piede , e nelle barbe , acciò s'ingrossino , e si stabiliscano più anticipatamente che sia possibile . Tornisi adunque a rivederli , passati che siano venti , venticinque , o trenta giorni , e più o meno , secondo il clima e l'attività del terreno , dopo spuntati i capi come sopra ; e trovandoli , come verisimilmente accade , che alla maggior parte degli occhj , massime a quelli più alti e vicini all'estremità , ne sieno venuti nuovi piccoli capi , chiamati comunemente femminelle , si taglino addirittura , in maniera che vi resti a tutti un occhio sano , libero , e lontano dalla tagliatura , che si fa per levare i detti nuovi piccoli capi ; perchè levandosi affatto , cioè rasente all'occhio del capo maestro , questo resta debilitato , e mezzo abbandonato dalla natura , deviandosi la sua virtù ; e tagliandosi lunghi , lasciandovi un occhio , per dove possa passare , ma più adagio e in minor quantità per mezzo di nuova piccola lortita , servono queste per fecondare gli occhj del capo maestro , chiamandovi e impegnandovi maggiormente il nutrimento ; e fanno che i capi , che ne fortiscono l'anno susseguente , portino seco una copiosa e abbondante raccolta d'uve . Questa operazione , e questa maniera di coltivare le nuove viti è così necessaria , utile e vantaggiosa , che non saprei spiegarlo : e pure è così poco praticata , perch'è pochissimo conosciuta , e quasi niente intesa ; e tuttavolta voglio fare animo a me medesimo , e consigliare quanto mai fo e posso tutti quelli che fanno nuove coltivazioni di viti , che non tralascino neppure una delle suddette operazioni e diligenze , assicurandoli che ne risultano utili molto considerabili , mentre si hanno le viti anticipatamente , tutte di grossezza uguale , e cominciano a fruttare per lo meno due anni più presto , di quello che farebbero , praticandosi diversamente , ed a seconda di quelli , che le lasciano per tre anni senza scalzare , e tagliare le loro barbe , nè governarle , e con tutti i fermenti , che ne fortiscono ogni anno ; lasciando che la virtù , e il nutrimento abbia la libertà di scorrere , e diffondersi inutilmente per tutti quei capi e barbe superficiali , che debbono poi in qualsivoglia modo , come inutili , levarsi ; e intanto il piede resta molto fertile , e diminor

nor robustezza; e quel ch'è di peggior conseguenza, si è che si vanno ingrossando le dette barbe inutili, che sono a galla, ed a fior della terra, con pregiudizio notabile dell'altre, che sono al disotto giù al fondo, e che necessariamente debbono esser le principali e buone, per far crescere e mantenere le piante; atteso che queste internate bene nel terreno agiscono con tutta facilità; poichè restano sempre più lontane, e dall'ingiurie del caldo della State, ch'è quanto dire dall'asciuttore, ch'è il maggior nemico che abbiano le piante nelle loro barbe, e dal ghiaccio dell'Inverno, ch'è un altro grosso nemico, ma più per i fusti, e per le rame, che per le barbe; avendolo mostrato chiaramente più volte l'esperienza nell'annate d'estremi freddi, che si sono seccati affatto i fusti, e le rame, nè mai le barbe; e dagli strumenti rurali de' Contadini, che mentre s'appano, vangano, o fanno altri lavori intorno alle piante, trovando le barbe troppo a galla, non possono far di meno di non istrapparle, o tagliarle, perchè lavorano alla peggio, senza riflettere, e considerare, che le barbe sono la vera base, e il vero sostegno delle piante. Passati poi che sono tre anni dopo piantate, allora le scalzano, e tagliano loro tutte le barbe che sono su alte, e vicine alla superficie della terra con tutto il tronco della vite, quattro dita in circa più basso del suolo, ciò che chiamano foccidere; poscia le governano, mettendo ad ogni vite un paletto, o canna. Pigliano poi l'anno venturo il fermento maestro, e principiano a poco a poco ad alzarlo, e formarne il tronco, e fusto della vite, di maniera che sono passati sempre cinque anni prima ch'arrivino a conseguirne un piccolo utile. Laddove se fino il prim'anno dopo piantate fossero state subito coltivate, e custodite diversamente, come sopra ho detto, avrebbero il secondo, e terz'anno principiato a coglierne il frutto; e quel che fors'è di maggior importanza, le viti, il piede, e le vere barbe maestre, sarebbero molto più grosse, più assicurate, e di maggiore e miglior robustezza, e complessione, nè vi resterebbe ombra di dubbio che potessero essere illanguidite e addormentate.

CAPITOLO VI.

Del modo di coltivare i Magliuoli il secondo , e terzo anno dopo piantati .

IL secondo anno, dopo piantati i Magliuoli , si tor-
ni di nuovo a potarli ne' mesi di Novembre e De-
cembre; lasciando il suo capo maestro alla lunghe-
zza di braccia uno all' incirca, pulendosi benissimo con
ferro tagliente da tutti i nodetti , ed altre scabrosità
che fossero, tanto in detto capo che nel basso piede;
e giunti a' mesi di febbrajo e Marzo, si metta a cia-
chedun magliuolo un piccolo paletto, ovvero una gros-
sa canna, fermandovi con una, o più legature il det-
to capo, lasciato, come sopra si è detto, alla lun-
ghezza di braccio uno, o poco più o meno, secondo
la sua robustezza, tirato, e obbligato su dritto al pa-
lo, per cominciare tutta in una volta l' altezza del fu-
sto che si vuol dare alla vite, coll' avvertenza di
fmoverli bene la terra all' intorno, e di tagliarli tut-
te le barbe superficiali nell' atto di farli ogni anno la
solita, dovuta, necessaria zappatura, o vangatura.
Passati poi agli ultimi di Maggio, ovvero al principio
di Giugno, o più presto, o più tardi, secondo la cal-
dezza del Clima, prontezza e attività del suolo, e
qualità de' Vitami, si vadano a riconoscere, levan-
dosi tutti affatto i nuovi capi senz' uve, (ciò che si
chiama scacchiare, e bastardare) a riserva di quello
venuto dall' occhio, lasciato su alto vicino all' estre-
mità, che secondo l' ordine più comune della natura,
deve questo esser sempre il migliore, più bello,
più robusto, e fruttifero, quale si allacci su dritto
al palo con una, o più legature, fatteli gentilmen-
te poco ferrate, tanto che da se stesso cominci ad av-
viticchiarsi al palo; e gli altri, che hanno prodotte l'
uve, si spuntino due occhj almeno sopra alle loro
pigne, allacciandoli bisognando: lasciando solamente
crescere il suddetto capo destinato per il frutto dell' an-
no avvenire, sino alla lunghezza di braccia due e mez-
zo, e forse tre, o tosto si spunti, tagliandolo alla lun-
ghezza di braccia uno e mezzo, e si lasci sempre su
dritto obbligato al palo, in modo che stia perpendico-
lare,

lare, tornandosi poi a rivedere venticinque, o trenta giorni dopo, se spuntino tutt' i capi piccoli, chiamati femminelle, colla medesima regola accennata nel capitolo antecedente.

Io dico che si faccia tutto il possibile perchè i capi, che debbono servire per il frutto dell' anno susseguente, venghino su dritti perpendicolarmente abbracciati al palo; poichè allevati, e custoditi in questa maniera sono sempre di miglior robustezza e complessione, e molto più fruttiferi, e atti alla vegetazione, quando anche volessimo allevarne sopra alle Viti gagliarde più di quelli che bisognano per il frutto, da servirsene per uso di magliuoli; perchè in questa maniera il nutrimento ha tutta la facilità, e comodità d' introdursi, e circolare, ricircolare, e deponersi per maggiormente consolidarli, e fecondare gli occhj; laddove lasciandoli crescere la maggior parte stortamente a capriccio della natura, senza abbrincarsi, e senza esser guidati, storti e sbattuti da venti, caduti colle cime abbasso, o avviticchiati, o caduti alla rinfusa per più versi, e a seconda dell' Orizzonte; questi non possono mai esser nè robusti, nè fruttiferi; perchè il nutrimento, e la facilità vegetativa se ne scorre via addirittura inutilmente per i loro occhj in false sortite, e abbandona quasi affatto i detti capi maestri; mentre non ha nè facilità d' introdursi, e scorrervi andantemente, nè il comodo di circolarvi, e deponervi per consolidarli, e renderli robusti, e fruttiferi. Nè si lasci per tanto di tenerle sempre pulite e nette da tutt' i capi inutili e baldardi, che accidentalmente sortiscono sopra i fusti delle Viti, massime quando sono gagliarde, e che i fusti sono storti, e male allevati. Si levino adunque prima che ingrossino, e allunghino, cioè ne' mesi di Maggio, Giugno e Luglio, e sempre che se ne vedono nascere,

Passando poi all' anno susseguente, si potino più anticipatamente che sia possibile, come sarebbe al principio, e verso la metà del mese di Novembre, lasciandoli il capo già allevato per il frutto con tutta la sua lunghezza, a riserva d' uno, due, e forse tre occhj, i più vicini all' estremità, quali non son fruttiferi, perchè nel precedente anno ne sortirono con troppa violenza quei capi piccoli, che sopra si è detto, chiamati

mati femminelle, portando seco il frutto a causa della spuntatura fatta al capo maestro, onde presero subito l'ordine della natura, con tutto l'avviamento già cominciato ne' medesimi occhj, a favore de' capi, e del frutto che ne dovea venire nell'anno appresso; e s'abbia anche il dovuto riguardo nella lunghezza de' capi alla robustezza, e forza delle Viti. Giunti poi a' mesi di febbrajo e di Marzo, si mettano due paletti, ovvero due grosse canne, o pure un paletto e una canna per vite, legando il capo da frutto, uno o due occhj sopra la tondatura, o sia razzatura del fusto, piegandolo con avvedutezza, per quanto sia possibile, sempre sopra alla medesima tondatura, tirandolo coll'estremità tanto abbasso, e in maniera che resti forzato a guisa di un arco teso, e si fermi con legatura all'altra canna, o paletto, chiamato rincontro; affinchè dal primo o second'occhio, che restano fra la prima legatura e la tondatura, ne possa più facilmente, e con maggior prontezza, e attività, sortire un capo così forte e robusto, da potervi stabilire sicuramente tutta la speranza per il frutto dell'anno imminente; e perchè i fusti delle Viti non iscorrano, e s'alzino troppo. E passati che saremo a' mesi di Maggio, Giugno, e Luglio, si pratichino esattamente tutte le diligenze accennate in questo medesimo capitolo per il capo che si piega presentemente; e saremo certi d'avere ogn'anno sicure e copiose raccolte di vini, tollene le disgrazie di freddi, brinate, grandini, e simili, che Dio non voglia; ed avremo sempre Viti gagliarde, e con i pedali; e fusti quasi tutti d'una medesima grossezza, e altezza, dritti, puliti, e belli. Laddove tenute, e coltivate diversamente, alzandole il fusto a un poco l'anno resta sempre pieno di tagliature, di tortuosità, secco e morto da qualche parte, sottile, miserabile, e di legname cattivo e imperfetto, e affatto incapace di farsi mai bello, grosso, e forte; perchè essendo già allevate male, e assuefatte a sfogare inutilmente in false sortite sopra alle tortuosità, la maggior parte della loro raccolta vegetativa, allora servirà a poco o nulla il cominciarle a tenere pulite da' ballardi, ed altri capi inutili, perchè essendo già avanzate col fusto così storto, cattivo e imperfetto, non si potrà mai esigere, anche con tutte le diligenze, che loro si usassero, di farle

le divenire Viti molto grosse, durevoli, belle, e fruttifere; essendo a mio giudizio difficile, per non dire impossibile, di suscitare un naturale di fusti, e di pedali, abituato di questa sorta, e per necessità impigrito.

CAPITOLO VII.

Del tempo, o del modo di potare, palare, e legare le Viti.

LE Viti per loro stesse deboli e vecchie, siccome quelle che sono in terre leggiere, arenose, ed asciutte; ed altre in terre molto forti, e bizzarre, che facilmente s'aprono, per esser molto soggette all'asciuttore, e al caldo della State, ove per mancanza di nutrimento, restano quasi sempre minute, miserabili, e poco fruttifere, mentre non sieno ajutate a tempo; colle continue zappature, e abbondanza di concimi buoni, e sostanziosi; lo stimo che sia d'un gran vantaggio, ancorchè sieno in Paesi freddissimi, il potarle subito colte le loro uve, e più anticipatamente che sia possibile, non lasciando a' capi di frutto nè pure un occhio più del bisogno, e della lunghezza, che si vuol darli, per non averle a raccorciare e ritagliare, mentre si legano, e si piegano, affinchè il nutrimento, e la virtù (che nell'Inverno ancora circolano, e fanno la sua azione) non si diffonda inutilmente, come farebbe nella troppa lunghezza, e nel soverchio numero de' capi, ma stia ristretto, e obbligato a nutrire, e perfezionare solamente quelli lasciati per il frutto; e in tanto prima che s'entri negl'estremi freddi le tagliature cominciano a poco a poco a serrarsi nelle loro porosità, facendosi internamente vicino; e talvolta sopra alla superficie delle medesime, una conglutinazione d'umori, che in breve s'unisce e consolida, assuefacendosi all'aria fredda, in maniera che restano a tutto il Verno benchè freddo e rigido, senza crepare; e senza nessuno altro male; e nella primavera non possono lacrimare, nè debilitarsi spargendo la loro virtù, come farebbero, se le tagliature fossero fatte di fresco, e non avessero avuto tempo di poterli serrare; onde non è questo un poco vantaggio nè un piccolo aiuto, massime per le Viti deboli. E trattandosi delle gagliarde, le

considero un grosso utile per queste ancora , il poterle presto per le medesime ragioni ; perchè non è altrimenti vero , quello che molti asseriscono , che la forza , e la gagliardia possano esser dannose , e pregiudicare alla bontà , e quantità del frutto , quando non potesser lacrimare , e debilitarsi per mezzo dello spargimento della loro virtù ; ma è altresì verissimo , che alle Viti robuste e gagliarde potate presto si possono lasciare in maggior numero , e molto più lunghi i capi da frutto , che quando si potano tardi , e intempo che cominciano a entrare in maggiore azione , e muovere ; onde ne segue , che ne abbiamo di certo più copiose e abbondanti le raccolte dell' uve , e del vino : per il qual fine (secondo me) si piantano , e si coltivano unicamente tutte le Viti .

E se accade , che qualche volta si vedano alcune tagliature un poco crepate , e aperte , resti ognun persuaso , che sono state guastate da' Contadini nell' atto di poterle : perchè la maggior parte di questa gente tagliano quasi sempre con ferri cattivi , poco taglienti , e operano per consuetudine , e per usanza , senza sapere che cosa facciano , attribuendolo poi alle brinate , alle Tramontane , al ghiaccio , al freddo , che per lo più ne sono affatto innocenti .

Dovrebbe si anche avvertire mentre si potano le Viti , specialmente quelle vecchie e deboli , se l'anno precedente fruttarono molto , o poco ; che se fruttarono molto si lascino i capi in minor numero , e più corti ; e se fruttarono poco , si può in certa maniera arbitrarne , lasciandoli più lunghi . Si rifletta ancora alla State passata , ch' essendo stato troppo calda e asciutta , in maniera che le Viti possano essersi soffermate per il troppo asciuttore , si lascino i capi più corti , e se calda , temperata , e non troppo piovosa , si lascino più lunghi . Quelle poi che si potano nella Primavera , si deve considerare l' invernata già scorsa , ch' essendo stata molto fredda , rigida , e troppo umida e piovosa , si lascino con i capi più corti ; e se dolce , asciutta , e temperata , si lascino più lunghi . Queste riflessioni , e questi riguardi , se ho da dirla com' io la credo , non vagliono molto ; ma dall' altro canto vado considerando , che qualche utile vi può essere , nè vi è nulla da perdere , e su questo riflesso ho creduto di non doverli tralasciare .

Ve-

Venendo adesso al modo di potarle, è da sapersi, che si deve sempre principiare questa faccenda dal piè della vite, tagliando tutt' i fermenti accidentali e bastardi, che fossero per il fusto; ma prima s'offer- vi la qualità delle Viti, ch'essendo troppo scorfa, e alta, vi si lasci un bastardo di sufficiente grossezza, tagliato alla lunghezza di due, o tre occhj, e non più, nomato razzuolo, e segoncello, purchè sia in luogo proprio, ben situato, e capace di produrre un fermento buono, e gagliardo da servirsene, per stabilir- vi la Vite nell'anno venturo, quando si taglierà tutta la parte superiore, che resta al di sopra di detto fermento; quale in pochi anni, colle fue gettate ci renda rifatta, e per così dire, rinnovata la Vite, e si riducono con questo mezzo ad un'altezza ragionevole, senza perdere il frutto. E proseguendo la potatura si lascino i capi da frutto in minor numero, e più corti, che se non vi fosse il razzuolo, affinchè vi possa essere nutrimento, e virtù sufficiente da far sortire un capo ragionevolmente buono, e forte, dal medesimo razzuolo lasciato a tal effetto. Sono moltissimi quelli, che lasciano quantità di razzuoli, o siano curfoncelli alle loro Viti troppo scorfe e alte, ma quasi tutti senza frutto, e a calo così corti, e tagliati appunto rasente all'occhio, e intanto lasciano alle medesime Viti i capi da frutto apposti in maggior numero, e molto più lunghi, che se non vi fossero i razzuoli, sul riflesso, che l'anno dopo si deve tagliare tutta quella parte, che resta superiore al razzuolo; e non s'avvedono i miserabili Contadini, che mettono le loro speranze in una positura d'esser molto fallaci, e vane; purchè il nutrimento, e la virtù vegetativa della vite se ne scorre, e s'incanala tutta addirittura per i capi da frutto, lasciati colla speranza ed ingordigia di conseguirne più utile del dovere. Onde ne segue, che i razzuoli restano quasi affatto abbandonati dalla natura, e non ne fortiscono che sottili, minuti, e cattivi fermenti, e forse nessuno affatto; perchè il nutrimento, e la virtù della Vite consiste in un'acqua molto attiva, e così fortile e sciolta, che fugge e scappa facilmente per tutti i luoghi, massimamente alle cime de' capi, quando non sono piegati a tempo, e in false fortite, nelle tortuosità e scabrosità de' fusti, che

hanno le Viti malamente allevate. In somma non è così facile, senza l'assistenza di persona intelligente e pratica, disporre le Viti e guidarle in maniera da non perdere inutilmente, ma ricavarne tutto il frutto possibile.

Quelle poi che non sono nè troppo corte, nè troppo alte, che non hanno bisogno d'esser ridotte, nè abbassate per mezzo di razzuoli, si potino addirittura, lasciandoli per il frutto i capi più robusti e migliori, coll'avvertenza, tanto riguardo al numero, che alla lunghezza, d'adattarli alla forza ed al vigore delle Viti; e per quanto sia possibile (purchè non si perda nè si diminuisca il frutto) s'abbia riguardo di pigliare i capi più vicini alla vecchia tondatura, affinchè le Viti non iscorrano molto; ma s'iano sempre d'una giusta e ragionevole altezza di tre o quattro palmi all'incirca: poichè la bellezza e bontà delle viti, consiste molto nell'esser grosse, basse, e dritte di tronco, liscio; pulito, sano, e non mezzo secco, e pieno di cicatrici, come sono la maggior parte delle Viti allevate a capo, e alzate un poco l'anno.

Potete ch'avremo le Viti con tutt'i riguardi, e con tutte le regole sopra descritte, giunti che saremo al mese di Gennajo, e al principio di febbrajo, si tolgano i pali, e le canne, e si comincino a mettere alle Viti in modo che restino dominate dal Sole, e un poco lontani da' loro pedali, e da quella parte, ove si devono piegare i capi, perchè vi cadano, e vi s'adattino con più facilità, e naturalezza, e non sieno tanto sottoposti a romperli e storcersi, e restino piegati, e forzati in luogo proprio; che vale a dire, uno, o due occhj vicino alla tondatura; legandoli ferrati al palo in maniera che possano facilmente allontanarsi un poco, e molleggiare avanti e indietro, secondo che porta il bisogno (ciò che riesce quando si fanno trapassare alquanto di là dal palo colla legatura bassa, che loro si fa giù nel vecchio pedale) di modo che i capi, che devono piegarli, abbiano campo di fare dolcemente il loro giusto giro per addietro, e sopra la tondatura, senza che s'iano in necessità di romperli, o alzarli troppo; facendo la legatura al capo da frutto, non più di due occhj lontana dalla tondatura. Prendasi in oltre l'estremità di detto capo, e si dirompa, si pale-
peg-

peggi, e s'addolcisca colle mani, tirandolo abbasso, tanto che resti forzato appunto vicino alla prima legatura; e si fermi con altra legatura l'estremità ad una canna, o paletto, chiamati rincontri. E sappiasi che molte Viti tornano malissimo piegate, e non forzati i capi giustamente, e alzate in poco tempo molto più del dovere, per cagione d'essere stati messi malamente i pali dalla parte contraria, e troppo vicini a' pedali delle Viti.

Questa maniera di potare, palare, legare, e piegare è da praticarsi solamente per le Viti, che sono in colline, e in altri luoghi montuosi, e dove si vogliono tenere basse, e dritte di fusto, e con qualche avvedutezza; ma nelle pianure, e in Paesi dove son quantità di viti sopra gl'alberi molto alti, non ho animo di descrivere certe regole per altro utili e sicure, ma difficili a insegnarsi, e farle mettere in pratica, per esser le Viti troppo alte, e incomode; e per la poca cognizione di quei contadini, che credono di sapere assai più di quello che possa il bisogno, e le considerano poco o nulla, mentre hanno tutta l'attenzione per il suolo, e per le sementi. Finalmente avverto, che non si debbono mai potare, nè legar le Viti in giornate troppo asciutte, ventose, aspre, nè molto fredde; ma temperate, dolci, e che non regni Tramontana, acciò i capi da frutto non sieno tanto soggetti a rompersi, e si possino piegare, e forzare più giusti; e si faccia il possibile, perchè ogn'anno circa alla metà del mese di Marzo, sieno terminate di potare, piegare, e legare.

CAPITOLO VIII.

Del tempo, e del modo di zappare, bastardare, e scacchiare le Viti.

IL più vero tempo di zappare, o vangare le Viti egli è ne' mesi di Maggio e Giugno, e più in questo, che in altri tempi, perchè di questi mesi sono nate quasi tutte l'erbacce, spine, ec. che imboschiscono; e sfruttano molto la terra. Nell'atto adunque di zapparla, o vangarla si sterpino e si levino tutte intieramente sino alle loro barbe, scuotendole benissimo, acciò restino

affatto disaccate, e secchino più facilmente; zappando minutamente il suolo, pigliandolo largo almeno un braccio per parte vicino al filare delle viti, non solo per ben pulirlo e purgarlo dalle spine, roghi, erbe, ec. ma molto più per renderlo sollevato, sciolto, soffice, e capace d'abbracciare con più facilità l'acque delle pioggie, che cadono nella State, che sono di non ordinario giovamento alle viti; ed il suolo medesimo essendo così smosso, sciolto e sollevato, non è tanto soggetto al caldo, e all'asciuttore, oltre all'essere più attivo e pronto ad abbracciare, e approfittarsi più facilmente degli influssi celesti. Nel medesimo tempo si osservino esattamente, e si riconoscano tutt' i pedali delle viti se avessero gettati fermenti più bassi, vicino alla superficie, ovvero barbe fra le due terre, e si taglino interamente tanto l' une, che gli altri con istrumenti ben taglienti, che facilitano, e fanno meglio il lavoro.

Quanto noi al tempo di bastardare, e scacchiare le viti, egli è verso gli ultimi del mese di Maggio, seguitandosi per tutto Giugno, e Luglio, e sempre che si vede il bisogno, levando tutt' i fermenti accidentali e bastardi, ed altri inutili, e senz' uve, a riserva di qualche bastardo, che fosse sopra il pedale di qualche vite troppo scorsa e alta, in luogo proprio, e ben situato, da poterse ne servire per un razzuolo, o curfioncello, per rinnovare e stabilirvi la vite, abbassandola a quell' altezza; e d' altri capi senz' uve, che fossero sopra alle viti gagliarde, da servirse ne per uso di Magliuoli. Spuntandosi inoltre quelli dell' uve, due o tre occhj sopra alle pigne; eccettuati alcuni, che si stimano buoni per magliuoli, e per il frutto dell' anno susseguente, quali si spuntano più tardi alla lunghezza di un braccio e mezzo all' incirca. Replicandosi questa operazione di quando in quando, tenendole sempre pulite e nette da tutt' i bastardi, ed altri capi inutili, per obbligare tutto il nutrimento, ed il vigore a beneficio dell' uve e de' capi destinati per il frutto, ed in miglioramento de' pedali, e delle barbe. Cosa che ridonda anche in maggior vantaggio del vino, essendo spiritoso, gagliardo e durevole. Siccome i pedali delle viti saranno sempre più lisci, e meno pieni di tagliature, e la potatura sarà molto più facile e sbrigata, riducendosi quasi a impossibile, che si possa
no

CAPITOLO VIII.

41

no pigliare errori. Essendo queste operazioni, a mio giudizio, molto utili e vantaggiose per tutte le viti, ma in particolare per quelle vecchie e deboli, ed altre, che sono in terreni leggieri, e poco sostanziosi. Nè si lasci pertanto di fare un'altra operazione, cioè alzare quei capi dell'uve, che sono più bassi e vicini alla terra, quali si tirino colle cime all'insù, legandoli a' pali delle viti, ciò che si chiama allacciare; tornandole poi a rivedere per tempo, allacciando di nuovo tutt' i capi, che ne hanno bisogno; affinchè l'uve restino più discoste dalla terra, e più sicure e difese da' venti, e dominate dall'aria e dal Sole, ec.

CAPITOLO IX.

Del modo, e del tempo d' allevare, potare, legare, e piegare le viti sopra le bronche.

LE viti, che si vogliono allevare per tirarle sopra le bronche, non vogliono essere meno di due per bronca, piantate lontane quattro palmi in circa l'una dall'altra, e richiedono per li primi due anni la medesima coltivazione, e il medesimo modo d'allevarle e potarle, che si è detto per tutte le altre; ed il terzo anno dopo piantate, si metta la bronca fornita di quattro cornicelli piantata in terra due palmi al fondo per dritta linea in mezzo alle due viti, pigliandosi poi dalle medesime il capo di quell'anno, tirandolo tutto in una volta su all'altezza de' cornicelli, accompagnato e guidato da un paletto, piantato in terra vicino al piè della vite, pure per dritta linea dalla parte della bronca. Di poi si pieghino le cime di questi pali serrandoli quasi addosso alla medesima bronca; e così piegati si fermino con legatura a' cornicelli, uno da una parte, e l'altro dall'altra, fermandovi con due o tre legature li piedi, e capo della Vite, e tirato e obbligato su dritto, accostato al palo, acciò non venga storto, gobbo e villano, come se ne vedono molti; ma dritto, pulito, e liscio come si è detto dell'altre Viti.

Giunti poi a' mesi di Maggio, Giugno e Luglio, si riconoscano esattamente, levando tutt' i capi accidentali, inutili, e senz'uve; e si spuntino quelli dall'uve.

due

due o tre occhj sopra le pigne, a riserva del capo maestro venuto dall' ultim' occhio su vicino all' estremità, da serbarsi per il frutto dell' anno avvenire. Questo si lasci crescere fino all' altezza di due braccia e mezzo, e forse tre, e tosto si spunti alla lunghezza di un braccio, e mezzo all' incirca; avuto riguardo anche in questo alla robustezza della Vite; e intanto si faccia il possibile per allevarlo su dritto a perpendicolo; mettendosi perciò due piccole punte di paletti, o frasche fermate con legatura a' cornicelli, e alla cima della bronca; ovvero si fori la cima di questa, e vi si metta un cornicello, dove si possano allacciare e guidare i capi destinati per il frutto; acciocchè il nutrimento abbia maggior facilità d' introdursi, e maggior comodo di circolarvi, e trattenervisi a irrigare e fecondare maggiormente i loro occhj; tornandole poi di tempo in tempo a rivedere, per pulirle e nettarle da tutti i fermenti inutili, accidentali e bastardi, e si spuntino al solito alla lunghezza d' uno, o due occhj, tutti quei piccoli capi venuti dagli ultimi occhj su vicini all' estremità del capo che s' alleva per il frutto, chiamati comunemente femminelle; affinchè i detti capi si faciano più grossi, robusti, e fruttiferi.

Passando poi al prossimo e futuro mese di Novembre, ch' è quanto dire al quart' anno dopo piantate; si potino più anticipatamente che sia possibile, lasciandole il capo da frutto a quella lunghezza che brava-mente può sostenere la forza della vite; fermandolo subito con semplice legatura provvisoriale a' cornicelli della bronca, acciò non possano essere nè rotti, nè tanto agitati e sbattuti da' venti, fino al tempo della loro stabile legatura e piegatura. E passati a' Mesi di febbrajo e Marzo, si fermino quei giovani pedali con più legatura a' pali, che lor servono di sostegno e d' appoggio; affinchè vengano dritti; fermandosi in oltre i capi da frutto colla prima legatura al fusto della bronca, ovvero si facciano salire a cavalcare sopra a' cornicelli, secondo che porta il caso; purchè fra questa prima legatura, e la tondatura delle Vite non vi resti mai più che la distanza di due soli occhj; e tosto si pigli l' estremità del capo, tirandolo con avvedutezza all' ingiù tanto abbasso, che resti forzato appunto vicino a' due

occhj, restati fra la prima legatura e la tondatura, di dove ne deve venire il capo per il frutto dell'anno appresso; fermandosi la medesima estremità giù bassa al paletto; che serve di sostegno alla vite, ovvero al fusto della bronca, in maniera che il capo sia tirante e forzato, perchè altrimenti non possono mai darci un capo buono per il frutto da' due occhj, destinati a tale effetto fra la legatura e la tondatura; e in tanto mettono più avanti i capi gagliardi e fruttiferi, e ci troviamo subito in necessità d'allungare e fare scorrere le Viti più del dovere, quando non si voglia inebbrare nell'altro maggior disordine, di perdere per quell'anno la maggior parte della raccolta dell'uva. Ne si lasci di mettere ogni anno le solite due frasche fermate su dritte, ovvero il cornicello, come si è detto, nel foro della cima della bronca, per dove possono salire, abbrancarsi, e avviticchiarsi i nuovi capi, che devono venire per il frutto, ajutati a tempo della solita allacciatura.

Passando poi agli anni susseguenti, e diventando le Viti sempre più grosse, robuste e gagliarde, si smetta l'uso de' pali, praticati per sostegno de' loro pedali, e si cresca il numero, e la lunghezza de' capi da frutto a misura del vigore, e della forza; poichè a una sola Vite gagliarda, ben coltivata e allevata col fusto diritto, liscio e pulito (dove non si perde niente di nutrimento nelle sortite di capi accidentali e bastardi, che vengono ogni anno in grosso numero nelle tortuosità e scabrezza de' fusti nodosi, storti, male allevati, e pieni di grosse tagliature, come accade nelle Viti alzate a un poco l'anno) si possono lasciare tre, quattro, cinque, e talvolta sei, e più capi fruttiferi, non potendosi in questo fare una ricetta, e prescrivere appunto il numero, e la lunghezza, mentre ci dobbiamo regolare col vigore, e colla forza della Vite; e bisogna altresì che questo numero, e questa lunghezza di capi, dipenda anche dalle diligenze praticate a tempo nello scacchiarle, spuntare i capi, e levare affatto tutti quelli senza uve.

Sappiali ancora, che come dalle osservazioni da me fatte più volte vengo assicurato, non solo per il meglio della Vite, ma anche per aver più copiose le raccolte dell'uva, si devono lasciare i capi da frutto in minor nume-

numero, e più lunghi, purchè sian grossi e gagliardi, piuttosto che lasciarli più corti, e in maggior quantità; e perciò s'abbia questo riguardo, e questa considerazione, quando si scacchiano le viti, e si spuntano i capi da frutto.

Quando poi sieno diventate grosse, robuste e capaci di più capi da frutto, si potino al solito ogni anno più presto che sia possibile, e si leghino, e si pieghino di febbrajo, e di marzo, facendo cavalcare i capi da frutto sopra a' cornicelli delle bronche, facendoli la prima legatura soli due occhj lontana dalla tondatura, e si pieghino, e si tirino con avvedutezza le loro estremità abbasso, in maniera che i capi restino forzati appunto vicino alli suddetti due occhj, e si fermino con legature le medesime estremità, alcune a' cornicelli, altre a' fusti delle medesime viti, ed altre alla bronca, che in questo pure non si può fare una ricetta, perchè è necessario adattarsi al caso, e alla positura delle viti, e de' capi; purchè questi restino forzati rasente a due occhj vicini alla tondatura; affinchè le viti scorrano, e si dilunghino meno che sia possibile. Ma giacchè non si può impedire, che non scorranno, e si dilunghino ogni anno qualche poco; giunte adunque a un certo segno d'esser troppo allungate, e avanzate sopra a' cornicelli, in maniera da non potervisi più saviamente legare, e piegare, si pensi preventivamente in tempo della scacchiatura a destinare e lasciare un fermento bastardo di buona grossezza, scelto in luogo proprio, e ben situato, da potersene servire nell'anno appresso per un razzuolo, o sia cunfioncello da tagliarsi in tempo di potatura alla lunghezza di due o tre occhj, affinchè nell'anno venturo ne possa sortire un capo robusto e gagliardo da rinnovare la vite, abbassandola col taglio, senza perdere che poco o niente di frutto. E si rifletta che a queste pure, in quell'anno che si lasciano i razzuoli, è necessario, che i capi da frutto sian in minor numero, e più corti del solito; perchè altrimenti non ne fortiscono dal razzuolo che capi così sottili e miserabili, da non farne quel capitale, che si voleva, e alcune volte non gettano nulla affatto; perchè avendo il nutrimento e la virtù delle viti la solita libertà di scorrere e dilatarsi per quei lunghi capi da frutto, nemmen s'accorge del lasciato razzuolo, lasciandolo qua-

quasi affatto in abbandono, non che irrigare i suoi occhj, e darli forza per una durevole vegetazione.

Venuto poi, secondo le nostre idee, un capo grosso e gagliardo dal predetto razzuolo da potervi sicuramente stabilire la vite, si lasci il medesimo capo lungo a misura della forza, e si tagli immediatamente tutta la parte superiore già troppo scorsa, e avanzata sopra a' cornicelli; con questa precauzione, che se la vite fosse gagliarda, e in terreno sostanzioso si può andare avanti un anno o due prima di tagliarla, e intanto pigliare il frutto, finchè dal capo del razzuolo non ne siano sortiti per lo meno due buoni capi fruttiferi, purchè alla parte superiore, che deve tagliarsi, si lascino i capi sempre in minor numero, e più corti. Cosa che non si deve praticare sopra le viti deboli, e che sono in terreno poco sostanzioso, neppure a quelle che si conosce, o si dubita che non possi esserle stata fatta buona e sicura coltivazione. E se a sorte dal curfioncello ne fossero venuti subito due capi da frutto di sufficiente grossezza, in questo caso si tagli immediatamente tutta la parte superiore. La differenza, ch'è dal razzuolo o sia segoncello, a quella del curfioncello, è questa: razzuolo si chiama quello lasciato corto alla lunghezza d'uno o due soli occhj, tagliato appunto rasente all'occhio, essendo questi i meno sicuri, e più difficili a gettare un capo gagliardo per stabilirvi la vite, e il più delle volte gettano pochissimo, o nulla. Curfioncelli son quelli, che si lasciano alla lunghezza di due, tre, e forse quattro occhj, tagliati più che sia possibile lontani dall'occhio; e sono questi talmente sicuri, che fanno tosto il primo anno gettare bellissime.

Rinnovate adunque, stabilite, e abbassate le viti, e tagliata la parte superiore, si potino, e si pieghino ogn'anno, praticandosi tutte le diligenze sopra narrate, coll'avvertenza di tenerle ancora allacciate più che sia possibile, benchè alte, e lontane dalla terra; affinchè l'uve siano dominate e stagionate, e dal Sole e dall'aria; perchè, siccome abbiamo di sicuro che l'uve pigliano dalla terra tutt'i sapori e odori, così abbiamo di certo, che pigliano dal Sole, e non d'altronde tutta quella vivezza, quel fuoco, e quello spirito, che sentiamo ne' vini.

Parlandosi poi delle bronche, è da sapersi, che que-

ste

ste si fanno di Legname di Quercia, e di Cerro, segnandosi grosse come i travicelli, che servono per li solaj delle case, lunghe quattro braccia, o al più quattro, e mezzo, sempre un poco più grosse dalla parte che deve stare in terra, che dalla cima. Si mettono subito dopo segate per qualche tempo nell'acqua a purgarli, e poi si cavano; e asciutte che siano, si possono mettere alle Viti; ma prima sarà bene abbruciarle, e come altri dicono abbrosolarle in quella parte che debbono restare in terra, perchè resistano più all'umidità.

Si facciano in oltre ad ogni bronco quattro fori, cioè uno per facciata, in circa a un braccio vicini alla cima, e in modo, che messi in detti fori i cornicelli guardino arditamente colle cime all'insù, e non l'orizzonte; quali si facciano di legname di castagno, di quercia, d'albare, o d'altra sorta, purchè sia forte, lunghi braccia uno, e mezzo per lo meno, e se ne mettano uno per facciata, ch'è quanto dire quattro per bronca. Si possono mettere le bronche anche ne' filari andanti delle viti, lontane sette in otto braccia una dall'altra; e se vi fossero frutti lontani, come si sogliono mettere, dodici o quattordici braccia uno dall'altro; si metta una bronca in mezzo, tirandovi sopra due Viti nel modo e forma sopra descritta, e si faccia il simile nelle fosse dove si piantano ulivi, e viti a filari, mettendovi una bronca tra un ulivo, e l'altro per tirarvi e allevarvi sopra due Viti.

CAPITOLO X.

Del tempo, e del modo di fare le propagini, o sieno sottomesse di Viti.

IL vero tempo di far le propagini, o sieno sottomesse delle Viti, nelle terre leggiere, asciutte e galistrose, egl'è dalla metà di Novembre fino alla metà di Dicembre. Laddove nelle terre forti, umide, grasse e cretose, dalla metà di Febbraio fino a tutto Marzo, purchè non sieno troppo bagnate: e sarebbe cosa molto utile e vantaggiosa, se si cavassero le fosse qualche tempo avanti, massime nelle terre forti e cretose.

Adunque in tutti quei luoghi dove sono radori, e
man-

mancanze di pedali di Viti, o dove queste sieno di cattiva razza, o tanto vecchie, indebolite e languide da non potersi innestare, si faccia una fossa profonda e larga braccia uno e mezzo per lo meno; ma in quanto alla lunghezza non si può limitare, mentre deve esser capace di tutte quelle viti, che si vogliono propagginare, per cavarne fuori i capi, lontani circa un braccio uno dall'altro; e calo che la fossa tornasse in luogo, che non vi fosse sotterraneamente la sua necessaria fogna, per lo scolo dell'acque interne, si veda per quanto sia possibile di farvela; secondo le regole descritte per le fosse, dove si piantano i magliuoli; perchè altrimenti l'opera non solamente sarebbe affatto inutile, ma dannosa, perchè in vece d'acquistare, e moltiplicare le Viti, si perdono affatto quelle che si propagginano. E dandosi l'accidente, che queste fosse si dovessero fare in luoghi, dove non fosse possibile dargli lo scolo, si facciano molto più profonde, e vi si metta maggior quantità di sassi, e stipa; o altro legname: e dovendosi fare in luogo, dove vi sia la sua fogna, e chela coltivazione fosse fatta di più di cinque o sei anni, si scavi la fossa finchè non si trovino i sassi della fogna, rimettendovi la solita stipa, o altro legname verde, sopra un buon suolo di terra scelta, mescolata con qualche porzione di concime sostanzioso; e tolto vi si stendano sopra i capi delle viti, in maniera che restino per lo meno un braccio al fondo. Si indirizzino poi con bella maniera le cime de' capi all'insù, acciò non si storciano, nè si faccia loro lacerazione, o altro male, e si riempia la fossa, mettendo sempre in fondo la terra migliore, con qualche poco di concime vicino a' capi; e terminata di riempire, si taglino in maniera che restino con un solo occhio fuor della terra.

Il primo mese di Novembre, dopo fatte le propaggini, si scalzino largamente per più di mezzo braccio al fondo, tagliandosi loro tutte le barbe, che si trovano per il fusto scalzato; e si governino, si ricalzino; e si coltivino successivamente con tutte le regole già descritte per li magliuoli.

CAPITOLO XI.

Del tempo, e del modo di piantare gli Oppj nelle coltivazioni; e del modo di potare, e legarvi sopra le Viti.

Bench'io sappia esserci restato da dir moltissimo sopra le Viti, penso non ostante di terminare il Trattato, con dir solamente qualche cosa del modo di piantare gli Oppj nelle coltivazioni, e della maniera e regola più sicura da praticarsi nel potare, e legarvi sopra le viti. Essendo adunque questa sorta d'alberi molto difficile ad attaccarsi subito colla dovuta vivezza e celerità, non sarà se non bene, utile e necessario cercare e trovare anticipatamente il modo d'averli all'ordine e pronti il medesimo giorno, che si vogliono piantare, sbarbari di fresco da' Boschi, Ragnaje, o da Vivaio fatto apposta, come consiglio.

Spiantati poi che saranno, prima di ripiantarli nella Coltivazione, si riconoscano loro esattamente le barbe; e tutti quelli, che si trovassero non averle veramente sane e buone, si rigettino senza farne nessun capitale; quelli poi, che si trovano averle buone e d'intiera perfezione, prima di piantarli, si spuntino con forbicette, o altro ferro tagliente tutte le lacerazioni, che sogliono esser nelle cime delle barbe grosse, e maestre; e l'altre minute e capillari si taglino intieramente tutte, con questa precauzione di tagliare solamente quelle barbe minute e capillari, che nate fossero sopra il dosso d'altre barbe grosse e maestre. S' inbrattino poi tutte le barbe fino a un palmo di fusto, con isterco Vaccino, o pecorino, statto con acqua, affinchè più facilmente s'abbraccino, e s'uniscano colla terra; dipoi si piantino nella Coltivazione già preparata, lontani dieci o dodici braccia l'uno dall'altro, avuto riguardo alla qualità della terra, ch'essendo leggiera; e di poco corpo, si piantino un poco più spessi; ed essendo sostanziosa e grassa, si piantino un poco più lontani, mettendoli sotto ed all'interno delle barbe qualche giusta porzione di concime trito e sostanzioso, mescolato con terra scielta, attiva, domestica e grassa. Si finiscano
in

in oltre di ricalzare in modo, che le barbe restino allargate nella loro naturale positura, e tornino al fondo meno di due palmi, nè si pigi, nè si calpesti loro niente affatto la terra all'intorno. Mettasi poi vicino a ciaschedun' Oppio un palo, il quale si fermi con una, o al più due legature; mettendovi i suoi fardellini di fieno, acciocchè non possano essere sbattuti, nè troppo agitati da' venti, nè tampoco sbucciati da' pali, nè dalle legature; e così si continui a custodirli ben palati fino a tanto che non faranno passati almeno tre o quattro anni, acciò abbiano campo di attaccarsi e assicurarsi stabilmente, e crescere con tutto il comodo, senza essere infastiditi, nè agitati da' venti: ch' adoperate tutte queste diligenze, e custoditi attentamente, verranno in soli quattro o cinque anni alla loro perfezione.

Questa sorta d'alberi, piantati affine di guidarvi sopra le Viti, allorchè si vedono essere passabilmente grossi, come il collo della mano d'un Uomo; locchè ordinariamente suol seguire in tempo di quattro o cinque anni dopo piantati nella coltivazione; subito si tagli la loro cima, nel mese di Novembre, all'altezza di tre braccia e mezzo, o di quattro al più, acciò non vadano molto in alto, ma ingrossino più facilmente e presto il loro fusto, e comincino intanto a mettere, e disporre i rami allargati ed aperti, come fanno i Gelsi.

Le Viti, che debbono servire per allervarsi, e guidarsi sopra gli Oppj, non vorrebbero mai essere meno di quattro per ciascheduno, piantate due da una parte, e due dall'altra in maniera che l'Oppio torni in mezzo, lontano braccia uno e mezzo in circa da' pedali delle medesime Viti. Non si lasci pertanto di tenerle guidate e accompagnate da' pali, nel medesimo modo che si è detto per quelle delle bronche, finchè non saranno cresciute, e alzate in maniera che siano capaci di cominciare a salire, e cavalcare sopra i rami degli Oppj: allora si lascino i loro capi da frutto alla lunghezza di dieci, o dodici occhi, o più, o meno, secondo richiede e comporta la loro gagliardezza, o debolezza. Dipoi si comincino a distendere e guidare le dette Viti sopra i rami degli Oppj, in modo che ogni ramo sia sempre accompagnato da una, o due Viti, cioè rami chiamati branchemadri. Io dico branchemadri di Viti, perchè quando gli Oppj comin-

cino ad esser cresciuti, ed alzati, non v'è dubbio, che non sieno divisi in dieci, o dodici rami; onde non è possibile che un Oppio possa essere accompagnato da tanti pedali di Viti quanti siano i suoi rami; e però dico che si comincino a potare e disporre le Viti in maniera, che queste altresì si dividano e vadano facendo a poco a poco altrettanti rami, che sieno di numero corrispondente a quelli degli Oppj; di sorte che non vi resti mai ramo, che non sia accompagnato e guarnito dalla Vite. Si prendano poi i capi da frutto delle medesime Viti, legandoli, dopo potate, due unitamente al ramo dell' Oppio, in tal forma, che fra la tondatura delle Viti, e la legatura, che si fa a detti loro capi, non vi restino mai più di due occhj. Facendosi la detta legatura in modo, che obblighi l'estremità de' capi a piegare, e guardare abbasso più che sia possibile. Si prendano poi le medesime estremità, e s'attortiglino, e s'avvolgano i capi insieme, tenendoli nell'istesso tempo tirati abbasso; fermandoli insieme con legatura di falcio nella loro estremità, acciò non si svolgano, e comincino ben bene la piegatura, fino a tanto che l'uve non comincino a crescere e ingrossare, ch'allora il peso nelle medesime obbliga e necessita i detti capi a starsene piegati all'ingiu, restando forzati appunto vicini a' due occhj, che restano fra la legatura, e la tondatura. Dalla cui piegatura ne segue, che i medesimi capi non possono far di meno di non mettere in luogo proprio i nuovi lor capi, che debbono servire per il frutto dell'anno venturo; altrimenti metterebbero molto avanti, e si dilungherebbero troppo i loro fusti; onde faremmo in un'estrema necessità d'allungarle e alzarle ogni anno più del dovere; e intanto i loro fusti, e madrebranca s'anderebbero facendo storti, poco robusti, sottili, miserabili, poco fruttiferi, e meno durevoli; quando, per non dilungarle troppo, non si volesse incorrere nell'altro disordine, di perdere la maggior parte della raccolta. Avvertasi ancora di tener sempre guarniti tutt'i rami grossi degli Oppj d'una ragionevole, ed aggiustata quantità di pali, de' quali ogn'anno se ne tagliano, e se ne allivino, affinchè non restino mai nè troppo pieni, nè troppo sguarniti, ma sempre colla loro quantità ragionevole, e adattata alla forza della pianta. Poichè oltre all'essere i detti pali, dopo ta-

glia-

gliati; affai proprj e buoni per l'altre Viti, servono ancora, prima di tagliarli; per difendere le proprie uve dalle grandini; dalle brinate, e da' venti. E per verità non ho mai vedute Viti meglio difese, che quelle degli Oppj, nè più fruttifere; perchè i Ladri, e i Quadrupedi non l'arrivano; i Venti l'ondeggiando tutte per un medesimo verso, non si percuotono; nè si arruotano insieme nè pure le pigne mature; e conseguentemente si conducono sane e salde ne' Tini, col copioso e prezioso frutto del vino, che finalmente riesce perfettissimo. Vi è poi il vantaggio nel poterle; perchè i pali ve li donano stabilissimi; anche per venderne agli altri, i medesimi Oppj; onde poco tempo si perde a legarvele sopra; poco o niente sfruttando il terreno con le loro barbe, e quasi niente affatto coll'ombra delle sfondate sue rami; ombra che non sta fissa, perchè sempre fugge la luce del Sole, che sempr'è in moto; ond'è che si stagionano continuamente, e l'uve, e i capi venturi da frutto, che (algoni abbrincandosi facilmente su dritti a' pali, e godono ben anche a quella Calderna l'altre fòbe seminategli intorno. In somma, a parlar con chiarezza, e vero dire, questi Oppj sono tanto proprj, che pare, che il Signore Iddio gli abbia messi apposta nel mondo col solo fine d'accompagnarli, e maritarli senza dote alle Viti, per non far danno veruno alle semenze del suolo adjacente.

Questa sorta d'alberi, e di coltivazione, a mio giudizio è più propria d'addattarsi nelle pianure, che nelle colline; attesochè gli Oppj richiedono paese di terra gratta, e sostanziosa, e non composta di terrucola magra, sottile, e troppo asciutta; ove le Viti ancora vengono sempre sottili e miserabili, non di quella grossezza, gagliardia, e complessione, che ricercasi, ed è necessaria per metterle sopra gli Oppj.

In ultimo dico, che la propria stagione di piantare i suddetti alberi nelle terre asciutte, e poco sostanziose, è subito passata la metà di Novembre, fino alla metà di Dicembre; laddove nelle Terre forti, umide e grasse, il tempo proprio è dalla metà di febbrajo fino a tutto Marzo, purchè le terre non sieno troppo bagnate, e le giornate non sieno molto ventose, e rigide. Avvertasi ancora ad un'altro particolare, che dovevo forse accennarlo al principio di questo Capitolo;

ed è, che si facciano tutte le diligenze possibili per piantare Vitami di razza feconda, saporita, e della migliore, ch' alligni in quel paese, e s' addatti e sia propria al Terreno e al Clima. Nè laseio per tanto di nominare qualche sorta di Vitami in generale, lasciando poi la considerazione d' addattarle e appropriarle, come sopra ho detto, a quelle persone, che vorranno saviamente piantare Vitami d' Uva mammola tonda, e asciutta, Mammolone, Canin forte, Morgiano, Raverrusto dolce, S. Zoveto, Tribbiano Fiorentino, Canajola, Colore canajolo, Zeppolino imperiale, o sia Uva Tedesca, Tribbiano di Spagna, o sia Uva Greca, Rassaone, Gorgettesco, Abrozzine, Vajano, Malaga bianca, e rossa, Pignolo, ed altre Uve simili, che ce ne sono moltissime; purchè si addattino, e sieno proprie alla qualità del suolo, e al Clima, e facciano buona lega di Vini, mescolandosi insieme: che in questo pure, non meno che nell' altre cose, ci vuol pratica, esperienza, e buona cognizione.



T R A T T A T O ⁵³

DELLE UVE , E DE' VINI.

CAPITOLO PRIMO.

*Delle qualità di alcune Uve scelte per diversi
ottimi Vini rossi, e bianchi.*

TRA le molte qualità dell' Uve , che sono a mia notizia , ne ho fatta una scelta delle migliori , e capaci per diversi ottimi Vini rossi , e bianchi , purchè siano fatte in Paesi di colline calde , esposte all' aria di Levante , e mezzogiorno , e bene appropriate le qualità de' Vitami al clima , e al suolo ; e non potendosi talvolta tutto ciò ottenere , non dobbiamo subito avvilarci , e desistere di piantar Viti , poichè sarebbe peggio il rimedio del male , di cui si dubita , perchè volendo stare totalmente attaccati alla perfezione (che , secondo me , è cosa da valutarli , e desiderarli moltissimo) si correrebbe rischio di restar senza vini , ovvero con pochissimi ; e però si prenda animo , si faccia coraggio , e si piantino molte viti , facendo il possibile per scegliere e appropriare i vitami al clima e al suolo ; nè mai abbandonarsi per timore di poca cognizione delle qualità , e diversità delle terre , che sono , per non dire infinite , moltissime , e altrettanto dissimili . Essendo verissimo , che il Signor Iddio con la sua immensa , altissima , ed ammirabile onnipotenza , ha creata , e composta la terra d' innumerabili diverse specie di parti menomissime di produzioni infinite , semi e principj , ed ha create altresì moltissime e diverse qualità di viti , frutti , alberi , erbe , ec. che vi si adattino con tutta la dovuta proprietà , ond' è , che non essendo le viti bene appropriate , nè tampoco si avranno perfette l' Uve , e in qualche parte difettosi riusciranno i vini , e non corrisponderanno alla bontà del suolo , e del clima , nè alla qualità delle Uve , che descriverò quì appresso nominatamente ; ma , secondo me , è sempre meglio avere molti vini un poco difettosi , che ridursi con pochissimi per la soverchia premura di averli

li perfetti; quando sappiamo di sicuro, che in questo mondo l'uomo non è, nè può esser capace di far nulla ch' arrivi alla perfezione. Facciamo adunque dal canto nostro quanto possiamo e sappiamo, per avere molti vini, migliori che sia possibile, e venghiamo alla denominazione dell' Uve, seguendo l' ordine non dell' eccellenza e rarità, ma dell' alfabetto.

Barba rossa.

Canajola rossa.

Claretto rosso di Francia.

Claretto bianco di Francia.

Colore Canajolo rosso, ovvero Canino.

Dolcispappola bianca.

Lacrime di Napoli rossa.

Lonza bianca.

Liatico rosso.

Mammola rossa asciutta.

Mammola tonda rossa.

Molcadella rossa.

Molcadella bianca.

Malvasia bianca, o sia grecchetto.

S. Maria bianca.

Malaga rossa.

Malaga bianca.

Navarrino, o sia Navarra rossa.

Occhio di Pernice rossa.

Occhio di Pernice bianca.

Pignolo rosso.

Raverusto dolce rosso.

Raffione rosso.

Raffaoncello rosso.

Tribbiano Fiorentino bianco.

Tribbiano di Spagna, o sia uva greca bianca.

Vajano rosso.

Verdea bianca, o sia Bergo.

Volpola, o sia Cimiciattola bianca.

S. Zoveto, uva rossa.

Zeppolino Imperiale, o sia uva Tedesca rossa.

Dell' Uva Barbarossa, e sue qualità.

CAPITOLO II.

L'Uva chiamata Barbarossa, maturata che sia, è di color di rosa, ne fa molta di pigne belle, spargole, granella grosse, tonde, delicate, e di guscio gentile. Fa i capi, o sieno fermenti di mediocre grossezza, di colore rossiccio, o bigio chiaro, con gl'occhi spessi, grossi, e rilevati. Fa i pampini, o sieno foglie non molto grandi, lustri al di sopra, e un poco vellutati dalla parte di sotto, rabescati gentilmente, col gambo sottile, colorito di vermiglio. Vuole il Clima caldo, il suolo grossolano, asciutto, e che nella State faccia dell'apertura, ma non eccessive, ovvero altra qualità di terre più sottili, atte a pigliare il caldo, com'è il Calastrino coll'uve secche, o il Galestro. Fa il vino scielto, sottile, odoroso, ma di poco sapore, di poco spirito, e di poco colore, matura presto per le prime beve, e per la sua delicatezza è piacevole, e gustoso a beverli solo; e mescolata questa in giusta quantità con altre uve proprie, fa buonissima lega, come si dirà in appresso.

CAPITOLO III.

Dell' Uva Canajola, e sue qualità.

L'Uva, chiamata Canajola rossa, comincia a maturare la prima settimana del mese d'Agosto, e maturata che sia perfettamente, diventa d'un colore così pieno, che partecipa del violetto; ne fa molta di pigne grosse, alcune ferrate, e altre spargole, di granella grosse, di figura un poco bislunga, di guscio gentile, e nelle code delle pigne, restano quasi sempre vigze, e imperfette. Fa i capi di mediocre grossezza, benissimo consolidati, di colore di mattone scuro, con gli occhi spessi, grossi, e rilevati. Fa i pampini grandi, sodi, molto vellutati dalla parte di sotto, rabescati gentilmente colle punte acute, di gambo e di costole di mediocre grossezza, colorite di vermiglio pieno, o rosseggiante. Vuole il clima, ed il suolo, come sopra si è detto per l'uva Barbarossa. Fa il vino piuttosto grosso,

56 DELL' UVE, E DE' VINI

molto colorito; di poco spirito, di poco sapore, e mediocrementemente odoroso; matura presto per le prime beve, non dispiace a beverli solo; e mescolata con altre Uve proprie in giusta quantità, fa buonissima lega.

CAPITOLO IV.

Dell' Uva colore Canajola, e sue qualità.

L' Uva, chiamata colore Canajolo, è di qualità rossa, e maturata perfettamente partecipa quasi del nero; comincia a maturare alla metà d'Agosto, e si perfeziona prima che termini il mese di Settembre; ne fa ragionevolmente in molte pigne, ma tutte piccole, spargole, e di poche granella, e queste di mediocre grossezza, di figura un poco bislunga, e di guscio gentile. Fa i capi grossi di colore di marrone pieno con gli occhj lontani, e poco rilevati. Fa i pampani grandi, lustri, chiari e belli, pochissimo vellutati dalla parte di sotto, e molto rabescati colle punte acute. Vuole il Clima caldo, e il suolo sano, esposto all'aria di mezzogiorno, e composto di una qualità di terra grassa, grossa, sostanziosa e di buonissimo fondo; essendo questa sorta d'uva adattabile anche all'aria di Ponente. Fa il vino molto colorito, odoroso, ma non di grande spirito, nè di grande sapore; matura presto per le prime beve, è poco gradibile, e poco gustoso a beverli solo, ma mescolata questa con altre uve proprie fa buonissima lega, essendo anche buona per farne uva secca.

CAPITOLO V.

Dell' Uva rossa, chiamata Claretto di Francia, e sue qualità.

L' Uva rossa, chiamata Claretto di Francia, comincia a maturare alla metà d'Agosto, e maturata che sia perfettamente, diventa molto colorita: ne fa molta, di pigne poco serrate, di figura lunga, di granella un poco bislunga. di mediocre grossezza, e di guscio gentile. Fa i capi grossi di colore rosseggiante, ovvero bigio chiaro, con gli occhj lontani uno dall'altro grossi e rilevati. Fa i pampani di mediocre grandezza, pochissimo velutati, e molto rabescati colle pun-

punte acute, col gambo colorito di vermiglio pieno. Vuole il Clima caldo, il suolo asciutto, leggiere, e sottile. Fa il vino di mediocre colore, sottile, sciolto, e spiritoso, ma di poco odore; matura tardi e adagio, ed è poco gradevole a beverfi solo; mescolato poi con altre uve proprie in giusta quantità, fa buonissima lega.

CAPITOLO VI.

Dell' Uva bianca, chiamata Claretto di Francia, e sue qualità.

L'Uva bianca, chiamata Claretto di Francia, comincia a maturare subito passata la metà d'Agosto; ne fa moltissima; di pigne un poco serrate, di figura lunga, di granella mediocrementemente grosse, bislunghe, e di guscio duro. Fa i capi grossi, di colore scuro; con gli occhj in giusta lontananza l'uno dall' altro, grossi, e rilevati. Fa i pampani non molto grandi, assai vellutati dalla parte di sotto, e rabescati, colle punte rotonde; col gambo, e ossatura delle costole colorite di vermiglio pieno, che partecipa di scuro. Vuole il Clima caldo, il suolo leggiere, sottile, e asciutto. Fa il vino di colore di paglia, sottile, sciolto, e spiritoso, ma di pochissimo odore, matura più presto del nero; è buonissimo a beverfi solo, e mescolata questa con altre uve proprie in giusta quantità, fa buonissima lega.

CAPITOLO VII.

Dell' Uva Dolcippola, e sue qualità.

L'Uva, chiamata Dolcippola, è di qualità bianca, comincia a maturare i primi giorni d'Agosto, ne fa molta di pigne raccolte, e talmente serrate, che sovente crepano i granelli, quali sono d'una mediocre grossezza, di figura rotonda, e di guscio molto gentile, tenero, e delicato. Fa i capi piuttosto grossi, coloriti di scuro pieno con gli occhj molto spessi, e rilevati. Fa i pampani piccoli, sodi, grossi, vellutati un poco al disopra; molto dalla parte di sotto, e pochissimo rabescati, col gambo corto, colorito di scuro pieno, che partecipa del vinato. Vuole il Clima caldo, esposto all' aria di mezzogiorno, il suolo asciutissimo, leggiere, e sottile.

sottile, e atto a pigliare il caldo, come quello che si è già descritto per l' Uva Barbarossa. Fa il Vino di color bianco, dolce, odoroso, sottile, ma di poco spirito; matura prestissimo per le prime beve, non dispiace a beverfi solo, anzi è molto gustoso, massime per le Dame, ed altri stomachi delicati: e mescolata questa con altre Uve proprie in giusta quantità, fa buonissima lega.

C A P I T O L O V I I I.

Dell' Uva Lacrima di Napoli, e sue qualità.

L' Uva, chiamata Lacrima di Napoli, è di qualità rossa, che maturata perfettamente partecipa quasi del nero; non comincia a maturare prima del principio di Settembre, benchè cominci a mutare un poco il colore alla metà d' Agosto; matura così adagio, e a stento, che difficilmente si perfeziona; ed è certo che vorrebbe esser vendemmiata per il meno dieci, o dodici giorni dopo l' altre uve, che maturano più presto; altrimenti non fa il vino col suo dovuto spirito, sapore, colore, e odore. Ne fa ragionevolmente in molte pigne, ma piccole, spargole, di granella di mediocre grossezza, un poco bislunghe, di guscio molto sodo e duro. Fa i capi piccoli, sottili, di colore di marrone pieno, con gl' occhj spessi, e rilevati. Fa i pampini piccoli, sottili, lustri pochissimo, o nulla vellutati, e molto rabescati ed intagliati, colle punte acute, con gambo sottile, colorito di vermiglio, che partecipa quasi di rosso. Vuole il Clima caldissimo, esposto totalmente all' aria di mezzogiorno, il suolo sano, asciutto, e di buonissimo fondo, ch' abbia corpo, e non composto di terra leggiera, sottile, e renosa. Questa sorta d' Uva si potrebbe addattare anche all' Aria di Ponente, perchè resiste moltissimo alla soverchia umidità; ma per la sua troppa durezza difficilmente maturerebbe a dovere. Fa il vino molto colorito, grosso, e con molto corpo, odoroso e spiritoso, matura tardi, ed è buonissimo a beverfi solo fatto di quest' uva; e mescolato con altre proprie in giusta quantità, fa ottima composizione.

Dell'

Dell' Uva Lanza, e sue qualità.

CAPITOLO IX.

L'Uva Lanza è di qualità bianca; e maturata, che sia perfettamente, diventa un poco picchettata di un colore simile alla ruggine, ma forse un poco più chiaro; comincia a maturare subito passata la metà d' Agosto; ne fa quasi sempre poca, di pigne spargole, di granella belle, grosse, tonde, e di guscio gentile. Fa i capi grossi di color di marrone chiaro con gli occhj lontani uno dall' altro, e poco rilevati. Fa i pampani molto grandi, un poco vellutati dalla parte di sotto, rabescati, e intagliati profondamente, con le punte acute, col gambo lungo, e grosso, e colorito gentilmente di vermiglio. Vuole il Clima caldo, esposto all' Aria di mezzogiorno, il suolo asciutissimo, leggiero, sottile, e atto a pigliare il caldo, come quello che si è già descritto per l' Uva Barbarossa. Fa il vino bianco di color di paglia, poco spiritoso, ma molto delicato, e odoroso; matura presto per le prime beve, è molto gradibile e gustoso a beverli solo; e mescolata con altre Uve proprie in giusta quantità, fa buonissima composizione, particolarmente ne' Vini bianchi.

CAPITOLO X.

Dell' Uva Liatico, e sue qualità.

DELL' Uva chiamata Liatico, per quanto si dice comunemente, sono venuti i vitami di Grecia, e comincia a maturare alla metà d' Agosto; e perfezionata che sia, diventa di colore di rosa, un poco picchettata, d' un colore più chiaro della ruggine; ne fa quasi sempre poca, di pigne piccole, spargole, di granella piccole, tonde, e di guscio gentile. Fa i capi piccoli, sottili, coloriti di scuro chiaro, con gli occhj pintosto spessi, e poco rilevati. Fa i pampani piccoli, sottili, vellutati dalla parte di sotto, e molto rabescati, colle punte acute, di gambo, e di costole sottili, colorite di scuro pieno, che partecipa quasi del rosso. Vuole il Clima caldo, il suolo sano, asciutto, di buonissimo fondo, composto di terreno grosso e forte, che nella State faccia dell'

dell' aperture, o siepo crepature, ma non eccessive. Fa il vino pochissimo colorito, sciolto, sottile, molto spiritoso, con un odore così delicato, grato, e gustoso forse più del moscadello: matura presto per le prime beve, è buonissimo a beverli solo, e fa ottimamente bene mescolata questa con altre uve proprie in giusta quantità.

CAPITOLO XI.

Dell' Uva Mammola asciutta, e sue qualità.

L' Uva Mammola asciutta è di qualità rossa; comincia a maturare qualche giorno prima della metà d' Agosto; e perfezionata che sia, diventa d' un colore così pieno che partecipa del violetto; ne fa ragionevolmente in pigne di mediocre grossezza, serrate, e raccolte, di granella tonda, e sode. Fa i capi grossi col fondo di color chiaro, razzato di rossiccio, con gli occhj lontani, e poco rilevati. Fa i pampani molto grandi, sodi, grossi, un poco vellutati dalla parte di sotto. moltissimo rabescati, e intagliati, colle punte acutissime, di gambo lungo, e di costole grosse, colorite di rossiccio. Vuole il Clima caldo, il suolo di buonissimo fondo, composto di terra di mediocre grossezza, nè troppo leggiera, nè troppo forte, essendo questa sorta d' uva adattabile anche all' Aria di ponente. Fa il vino assai colorito, sottile, spiritoso, e molto odoroso; matura presto per le prime beve, non dispiace a beverli solo; e fa ottima composizione, mescolata questa con altre uve proprie in giusta quantità.

CAPITOLO XII.

Dell' Uva Mammola tonda, e sue qualità.

L' Uva Mammola tonda è di qualità rossa; e giunta alla sua dovuta maturità, partecipa molto del paonazzo pieno; comincia a maturare alla metà d' Agosto; e ne fa ragionevolmente in pigne spargole di mediocre grossezza, di granella grosse, tonde, bellissime, e di guscio duro. Fa i capi grossi di color di marrone pieno, razzati di rosso chiuso, che partecipa del vinato. con gli occhj lontani uno dall' altro, grossi e rilevati. Fa i pampini grandi, chiari, lustri, pochissimo vellutati, e mol-

CAPITOLO XIII. 61

e molto intagliati e rabescati, colle punte acute, di gambo, e di costole grosse colorite di rossiccio. Vuole il Clima caldo, il suolo sano, composto di Terra grassa, pastosa, e profonda; facendo molto bene in una certa qualità di terra rossa, ovvero di color d'aria, purchè sia facile a sgranarsi, sciogliersi, e stritolarsi bene. Fa il vino rosso di colore bellissimo, vivo, e simile al rubino, molto odoroso, grato, spiritoso, sottile, e durevole, non ostante che maturi presto: è buonissimo, e gustoso a beverssi solo fatto di quest' uva, siccome fa ottimamente bene, mescolata con altre uve proprie in giusta quantità.

CAPITOLO XIII.

Dell' Uva Moscadella rossa, e sue qualità.

L'Uva Moscadella rossa comincia a maturare la prima settimana del mese d'Agosto; e giunta alla sua perfetta maturità, diventa così colorita, che partecipa quasi del violetto; ne fa piuttosto poca, di pigne grosse, mezzane, e piccole, alcune ferrate, e altre spargole, di granella bellissime, tonde, parte grosse, e parte piccole, e queste senza seme; è buonissima, e molto gustosa per mangiarsi. Fa i capi grossi di colore di marrone, razzati di rosso, con gli occhj in giusta lontananza grossi e rilevati. Fa i pampani grandi, grossi, poco o nulla vellutati, lustri al di sopra di color pieno. molto rabescati e intagliati, colle punte acute, di gambo e di costole grosse, colorite di scuro pieno, che partecipa quasi del rosso. Vuole il clima caldo, il suolo sano, asciutto, di buonissimo fondo, composto di terra grassa, forte, e totalmente esposto all'aria di mezzogiorno. Fa il vino di colore bellissimo, rosso, spiritoso, saporito, molto odoroso, e stimabile; matura ragionevolmente presto, ed è buonissimo a beverssi solo fatto di quest' uva quale fa ottima composizione mescolata con altre proprie in aggiustata quantità; dando odore molto particolare agli altri vini rossi.

CAPITOLO XIV.

Dell' Uva Moscadella bianca, e sue qualità.

L'Uva Moscadella bianca comincia a maturare al principio d'Agosto; e mentre s'avanza con la
ma-

maturità, diventa vizza; e perfezionandosi, sempre più avvizzisce, diventando così giala e bruciacciata, che partecipa del colore di ruggine, massime dalla parte del Sole; ne fa molta di pigne raccolte non molto grosse, parte ferrate, ed altre spargole, di granella tonda, di mediocre grossezza, e di guscio gentile. Fa i capi passabilmente grossi, coloriti ugualmente di scuro chiaro, con gli occhi spessi, grossi, e rilevati. Fa i pampani non molto grandi, sottili; chiari, lustri, e rabescati gentilmente, di gambo e di costole sottili; colorite pochissimo di scuro chiaro. Vuole il Clima caldo, il suolo sano, asciutto, e composto d'una qualità di terra sciolta, pastosa, mediocrementegrassa, ma che partecipi del sottile; purchè sia attiva, ed abbia in se stessa il suo dovuto necessario incremento; nè sia atta a pigliare, e rettere in se stessa della soverchia umidità: essendo molto propria una certa qualità di terra ferrata, che facilmente si sgrata, e si scioglie; ed è di un colore molto simile alla cenere di vite, ma un poco più vivo, e più chiaro, chiamata comunemente terra calcinosa, ovvero una qualità di terra sciolta, sottile, dove v'è mescolata, e incorporata della sabbia, o sia rena, qual'è molto più fresca, e non è impropria per questa sorta d'Uva, perchè vi si difende meglio dal calore del Sole; ma il Vino non riesce così odoroso, spiritoso, saporito e stimabile, e riserva del colore, che riesce più scarico bianco, e simile alla paglia. Fa il vino odoroso, molto sottile, sciolto, e spiritoso; matura prestissimo per le prime beve, è ottimamente buono e grato a beverssi solo fatto di quest'Uva; e mescolata con altre proptie, fa buonissima lega, particolarmente per i vini bianchi, dandoli odore e sapore.

CAPITOLO XV.

Dell' Uva Malvasia, o sia Grechetto, e sue qualità.

L'Uva Malvasia, o sia Grechetto, è di qualità bianca; comincia a maturare circa alla metà d'Agosto; e giunta alla sua perfezione, partecipa quasi del giallo; ne fa ragionevolmente, di pigne piccole, raccolte, ferrate, e di granella piccole, un poco bislunghe;

ghe, e di guscio piuttosto duro. Fa i capi di mediocre grossezza; coloriti ugualmente di scuro chiaro, con gli occhi grossi, molto spessi, e rilevati. Fa i pampani piccoli, un poco vellutati dalla parte di sotto, e rabescati, colle punte acute, di gambo e di costole piccole, colorite gentilmente di scuro chiaro. Vuole il Clima molto caldo, il suolo sano, asciutto, esposto all'aria di mezzogiorno, composto di terra grassa, pastosa, e di buonissimo fondo, purchè sia facile, e atta al passaggio dell'acque. Fa il vino di colore bellissimo, che partecipa un poco di giallo chiaro, dolce, odoroso, e spiritoso, ma non molto sciolto, e sottile; matura presto per le prime beve, è molto grato, buono, e pectorale a beverssi solo, e fa ottima composizione, mescolata questa con altre Uve proprie.

CAPITOLO XVI.

Dell' Uva S. Maria, e sue qualità.

L'Uva S. Maria è di qualità bianca, comincia a maturare al principio d'Agosto: e maturata perfettamente, diventa picchettata di scuro chiaro; ne fa ragionevolmente di pigne spargole di figura lunga, di granella piccole bislunghe, flosce, e di guscio gentile. Fa i capi grossi, coloriti di scuro chiaro, con gli occhi lontani uno dall'altro, piccoli e poco rilevati. Fa i pampani di mediocre grandezza, velutati dalla parte di sotto, molto intagliati e rabescati, colle punte acute, e di gambo lungo, e di costole sottili colorite gentilmente di vermiglio. Vuole il Clima caldo, il suolo esposto all'aria di mezzogiorno; asciutissimo, leggiero, sottile, e atto a pigliare il caldo, come quello già descritto per l'Uva Barbarossa, Dolcicapola, ec. Fa il vino di color bianco, dolce, delicato, odoroso, e sottile, ma di pochissimo spirito; matura presto per le prime beve, e non dispiace a beverssi solo, anzi è gustoso particolarmente per le Dame, ec. e mescolata questa con altre uve per li vini bianchi, fa buonissima lega, dandoli della dolcezza, e dell'odore.

CAPITOLO XVII.

Dell' Uva Malaga rossa, e sue qualità.

DELL' Uva Malaga rossa, con molte altre Uve particolari buonissime, e molto stimabili per diversi ottimi vini, furon fatti venire i vitami nello Stato Fiorentino dalla gloriosa memoria di Cosimo terzo, Gran Duca di Toscana. Non comincia a maturare prima che verso gli ultimi giorni del mese d' Agosto; e maturata in perfetto grado, diventa di colore pienissimo; ne fa ragionevolmente, di pigne raccolte, ferrate, di granello di mediocre grossezza, tonde, sode, e di guscio duro. Fa i capi passabilmente grossi, di colore di marrone con gli occhj grossi, spessi, e rilevati. Fa i pampani non molto grandi, grossi, sodi, poco vellutati, e rabescati gentilmente, colle punte rotonde, di gambo, e di costole grosse, colorite di scuro. Vuole il Clima caldissimo, il suolo, come si è detto per l' Uva Mammola, asciutto; potendo questa ancora adattarsi all'aria di ponente con buonissimo esito. Fa il vino molto colorito, grosso, spiritoso, odoroso, e durevole; matura tardi, non dispiace a beverli solo; e mescolata questa con altre uve proprie, fa ottimamente bene.

CAPITOLO XVIII.

Dell' Uva Malaga bianca, e sue qualità.

L' Uva Malaga bianca non comincia a maturare prima che alla fine del mese d' Agosto; e maturata perfettamente, diventa di colore giallo chiaro: ne fa molta in pigne di mediocre grossezza, raccolte, ferrate, di granella tonde, grosse, belle, e di guscio piuttosto gentile. Fa i capi grossi di colore scuro, che partecipa del chiaro, con gli occhj spessi, e rilevati. Fa i pampani di mediocre grandezza, grossi, sodi, assai vellutati dalla parte di sotto, rabescati gentilmente, colle punte rotonde, e di gambo corto colorito di scuro pieno. Vuole il Clima caldo, il suolo sano, asciutto, leggero, sottile e sassofo, chiamato comunemente galestro; ovvero un' altra qualità di terra più grossa, già descritta per l' uva Barbarossa. Fa il vino dolce, di
colo-

CAPITOLO XX.

65

colore di paglia, odoroso, spiritoso, e non molto sottile; matura ragionevolmente presto, e buonissimo fatto solamente di quest' Uva; e mescolata con altre Uve proprie in giusta quantità, fa ottimamente bene.

CAPITOLO XIX.

Dell' Uva Navarrino o sia Navarra, e sue qualità.

L' Uva Navarrino, o sia Navarra, è di qualità rossa, molto bella, comincia a maturare passata la metà d' Agosto; e maturata in perfetto grado, diventa di un colore così pieno, che si accosta quasi al nero; ne fa piuttosto poca, di pigne di mediocre grossezza, raccolte ferrate, di granella piccole, sode, e di guscio duro. Fa i capi piccoli, di colore di marrone pieno, con gli occhi spessi, grossi e rilevati. Fa i pampani di mediocre grandezza, sottili, chiari, e lustri al di sopra, pochissimo, o nulla vellutati dalla parte di sotto, e rabescati gentilmente, di costole piccole, e di gambo sottile; colorito di vermiglio pieno, che partecipa quasi di rosso. Vuole il clima caldo, il suolo sano, di buonissimo fondo, di Terra tonda e pastosa: potendo adattarsi anche all' aria di Ponente. Fa il vino grosso, molto colorito, spiritoso, saporito, e con l'odore d'aromati, che piace infinitamente; ma per la sua grossezza non è molto praticabile a beverli solo, benchè maturi ragionevolmente presto; mescolata poi questa con altre Uve proprie in giusta quantità, fa maravigliosamente bene, non solo per il colore, ma per il sapore, e odore.

CAPITOLO XX.

Dell' Uva Occhio di Pernice rossa, e sue qualità.

L' Uva Occhio di Pernice rossa, è di una qualità molto bella, comincia a maturare verso la fine del mese d' Agosto; e maturata perfettamente, diventa d' un colore quasi simile al rubino. Ne fa ragionevolmente, di pigne belle, spargole, di figura lunga, di granella mediocrementemente grosse, rotonde, chiare, lucide, e trasparenti, e di guscio gentile. Fa i capi piuttosto grossi, coloriti di scuro chiaro, con gli occhi lontani uno dall' altro, piccoli, e poco vellutati. Fa i pampani grandi, grossi, poco rilevati, o rabescati acutamente; di gambo grosso, e di co-

E

sto-

fiore colorite gentilmente di vermiglio. Vuole il Clima caldo, il suolo sano, e composto di terra di mediocre grossezza, asciutta, pronta, attiva, e facile a sgranarsi, e passare la superfluità dell'umido; e sopra tutto, che non vi sia mescolata della sabbia, o sia rena; potendosi questa sorta d'Uva addattare con buon esito anche all'aria di Ponente. Fa il vino di colore rubicondo, odoroso, sciolto, sottile, spiritoso, e molto stimabile; matura ragionevolmente presto. Si conserva molto tempo, senza che prenda vizj; piace moltissimo a beverli solo, siccome fa ottimamente bene mescolata questa con altre Uve proprie in giusta quantità.

CAPITOLO XXI.

Dell' Uva Occhio di Pernice bianca, e sue qualità.

L'Uva Occhio di Pernice bianca, è di una qualità molto bella, comincia a maturare verso la fine del Mese d'Agosto; e maturata perfettamente, diventa di un colore, che partecipa un poco del giallo; ne fa ragionevolmente, di pigne piuttosto grosse, la maggior parte ferrate, di figura lunga; di granello di mediocre grossezza, tonde, e di guscio gentile molto più dell'Occhio di Pernice rossa. Fa i capi passabilmente grossi; coloriti ugualmente di scuro chiaro, con gli occhj in giusta lontananza, grossi, e rilevati. Fa i pampani grandi, grossi, vellutati dalla parte di sotto, rabelcati acutamente, di gambo, e di costole grosse, colorite di scuro pieno. Vuole il Clima caldo, il suolo sano, esposto all'aria di mezzogiorno, composto di Terra sottile, leggiera, asciutta, e facile e atta a pigliare il caldo; facendo benissimo anche in una certa qualità di Terra grossa, che piglia facilmente il caldo, e fa dell'apertura, purchè queste non siano eccessive. Fa il vino di colore di paglia, di sapore che inclina al dolce, sottile, e spiritoso; matura ragionevolmente presto, si conserva assai senza che prenda vizj; è molto buono a beverli solo; e fa benissimo mescolata questa con altre Uve come sopra.

Dell'Uva Pignolo rossa, e sue qualità.

CAPITOLO XXII.

L'Uva Pignolo rossa comincia a maturare la seconda settimana del mese d'Agosto; e maturata perfettamente, diventa d'un colore così pieno, che s'accolla quasi al nero; ne fa molta di pigne la maggior parte piccole, raccolte, serrate, di granella piccole, tonde, e di guscio duro. Fa i capi di mediocre grossezza, di colore di marrone molto pieno, con gli occhi spessi, grossi, e rilevati. Fa i pampani piccoli, sottili, chiari, e lustri dalla parte di sopra, e poco vellutati al di sotto, di gambo, e di costole sottili, colorite di vermiglio; e rabelcate colle punte acute. Vuole il Clima caldo, il suolo sano, asciutto, e composto di Terra di mediocre grossezza, purchè sia facile a granarsi, e passare la superfluità dell'acque; facendo benissimo nella terra rossa, e in altra che inclina al giallo, chiamate comunemente Galestro, Sanseggiole, e Calastrino coll'Uve secche, purchè non sieno terreglie, che serransi molto insieme, e ritengono in se stesse molta umidità; facendo benissimo anche nella terra Alberese, dove vi è mescolato il sasso Colombino, o come altri dicono Coltellino; e si può addattare con buon esito anche all'aria di Ponente, per essere di granella sode, e di guscio duro. Fa il vino molto colorito, odoroso, sottile, e spiritoso; piace infinitamente a beverlo solo, ma non prima che abbia sentito il caldo; e mescolata questa con altre Uve proprie, fa maravigliosamente bene, non solo per il colore, ma per il sapore, e odore, che sono cose molto stimabili.

CAPITOLO XXIII.

Dell'Uva Raverusio dolce, e sue qualità.

L'Uva Raverusio dolce comincia a maturare al principio del mese d'Agosto, facendosi subito di colore vinato; e maturata in perfetto grado, diventa di un colore così pieno, che partecipa totalmente del nero; ne fa moltissima, ma per ordinario non rasserma che è quanto dire, che alcuni anni ne fa pochissima. Fa

moltissime pigne, parte ferrate, e parte spargole, alcune raccolte, ed altre di figura lunga, ma tutte piccole, di granella tonde, sode, piccole, e di guscio duro. Vi sono alcuni vitami di questo Raverusio, che fanno le pigne tutte ferrate, raccolte, piccole, e di graspo, e di gambo grosso, corto, e colorito di rosso, ch'è molto migliore, e più odoroso dell'altro, che fa le pigne spargole, lunghe, e di graspo, e di gambo bianco, lungo, sottile, e facile a strapparli per la sua tenerezza. Fa i capi piccoli, sodi, di colore di marrone pieno, con gli occhi molto spessi, grossi, e rilevati, massime quei vitami, che fanno le pigne ferrate, e di gambo grosso, e colorito di rosso. Fa i pampani piccoli, poco vellutati, chiari, e lustri dalla parte di sopra, e moltissimo rintagliati e rabelcati, colle punte acute, di gambo, e di costole piccole, colorite di rosso, e molte se ne vedono colorite vivissimamente tutte affatto, anche li pampani di color paonazzo, e vinato, che fanno un bellissimo vedere; e secondo ch'ho osservato, ho veduto ciò accadere più facilmente in quei vitami, che fanno le pigne ferrate, raccolte, e di gambo sodo. Vuole il Clima caldo, il suolo sano di buonissimo fondo, grasso, e forte, che faccia dell'apertura, purchè non siano eccessive; facendo benissimo anche all'aria di Ponente, e Tramontana. Fa il vino di colore pienissimo, cupo molto grosso, odoroso, spiritoso, e durevole; non è buono, nè praticabile a beverli solo; ma è buonissimo, molto singolare, e stimabile per dare odore, colore, corpo, spirito, e sapore a tutt'gl'altri vini rossi; e accozzata questa con altre Uve proprie in giusta quantità, fa così bene, che non si può desiderare di vantaggio.

CAPITOLO XXIV.

Dell' Uva rossa, chiamata Raffaone, e sue qualità.

L'Uva, chiamata Raffaone, è di qualità rossa, bellissima, comincia a maturare verso la fine del mese d'Agosto; e maturata in perfetto grado, diventa di colore paonazzo; ne fa molta di pigne grosse, lunghe, piene, ferrate, di granella molto grosse, lunghe, e di guscio gentile. Fa i capi molto grossi di colore di marrone

rone chiaro, razzati di rossiccio, con gli occhj lontani uno dall' altro, e poco rilevati. Fa i pampani molto grandi, grossi, vellutati, e profondamente intagliati, e rabescati colle punte acutissime, di gambo, e di costole grosse, colorite di vermiglio. Vuole il Clima caldo, e il suolo totalmente esposto all' aria di mezzogiorno, sano, e composto di terra leggiera, sottile, asciutta, e sassosa, chiamata comunemente galestro; ovvero un'altra qualità di terra, chiamata Calastrino coll' Uve secche; siccome fa benissimo nella terra forte, atta alle crepature, e a pigliare il caldo: essendo molto improprie per questa sorta d' Uva le terre fresche, reple, e molto peggio le troppo grasse, amide e paffose. Fa il vino di colore trasparente, e rubicondo, di grande spirito, odoroso, saporito, molto durevole e grato a beverli solo; matura tardi, e si conserva molto senza che prenda vizj; siccome fa sottilmente bene mescolata questa con altre Uve proprie in giusta quantità, dando agli altri vini rossi odore, spirito, vivezza, e sapore.

CAPITOLO XXV.

Dell' Uva Rassaoncello rossa, e sue qualità.

L' Uva rossa, chiamata Rassaoncello, comincia a maturare circa alla metà del mese d' Agosto; e maturata perfettamente, diventa d' un colore così pieno, che partecipa del violetto; ne fa molta di pigne lunghe, e spargole, di granella grosse un poco bislunghe, sode, e di guscio duro. Fa i capi sottili di colore di marrone pieno, con gli occhj lontani uno dall' altro, piccoli, e poco rilevati. Fa i pampani piccoli, sottili, pochissimo vellutati, intagliati, e rabescati profondamente, con le punte lunghe acutissime, di gambo, e di costole sottili, colorite di rossiccio. Vuole il Clima caldo, il suolo di buonissimo fondo, ch' è quanto dire di Terra sana, ch' abbia corpo, grassa e paffosa; potendo addattarsi con buon esito anche all' aria di Ponente. Fa il vino molto colorito, grosso, spiritoso, e durevole, non ha odore, nè gran sapore; piace poco a beverli solo, ma mescolandosi questa con altre Uve proprie, fa buonissima lega.

CAPITOLO XXVI.

Dell' Uva bianca, chiamata Trebbiano Fiorentino, e sue qualità.

L' Uva, chiamata Trebbiano Fiorentino, è di qualità bianca, bellissima, comincia a maturare la seconda settimana del mese d' Agosto, e mentre va maturando perde il bianco, diventando giala, ovvero di color d' Ambra; e maturata in perfetto grado, perde il giallo chiaro, e piglia un colore appunto simile alla fiamma; ne fa molta di pigne belle, di mediocre grossezza, spargole, e lunghe; di granella tonde, passabilmente grosse, e di guscio gentile. Fa i capi grossi, coloriti di scuro chiaro, e razzati di vermiglio, con gli occhi lontani uno dall' altro, piccoli, e poco rilevati. Fa i pampani grandi, grossi, chiari e vellutati dalla parte di sotto; e moltissimo intagliati e rabelcati, con le punte lunghe e acute, di gambo e di costole grosse, colorite gentilmente di scuro chiaro. Vuole il clima caldo, il suolo sano, asciutto, e di mediocre grossezza, e passosità; facendo benissimo in una qualità di terra fertile, di color d' aria, chiamata comunemente Calcinola; siccome fa ottimamente bene nella terra, chiamata Galestro, o Calastriuo coll' Uve secche; e si può addattare con buon esito anche all' aria di Ponente. Fa il vino chiamato Trebbiano dolce, di color bianco, che partecipa del giallo, molto odoroso, grato, spiritoso, sottile e durevole; matura presto, ed è molto squisito, stimabile e salubre a beversi solo; e fa maravigliosamente bene con qualsivoglia altra sorta di Uve.

CAPITOLO XXVII.

Dell' Uva bianca, chiamata Trebbiano di Spagna, o sia Uva Greca, e sue qualità.

L' Uva chiamata Trebbiano di Spagna, o sia Uva Greca bianca, è di qualità bellissima, comincia a maturare la seconda settimana del mese d' Agosto, ne fa infinitamente moltissima ogni anno, di pigne grosse, serrate di granella tonde, grosse, e di guscio gentile; e maturata perfettamente, perde il bianco, e diventa di un colore, che partecipa del giallo chiaro;
fa

CAPITOLO XXVII. e XXVIII. 71

fa i capi passabilmente grossi, coloriti di scuro chiaro, con gli occhi spessi, grossi, rilevati. Fa i pampani di mediocre grandezza, grossi, molto vellutati, e rabescati gentilmente colle punte rotonde, di gambo e di costole grosse, colorite di scuro chiaro. Vuole il clima caldissimo, il suolo esposto totalmente all'aria di mezzogiorno, composto di una qualità di terra leggiera, sottile, e molto atta a pigliare il caldo, purchè non vi sia nè sabbia nè rena; essendo molto propria la solita terra, chiamata Galestro, o altra chiamata Calastrino coll' Uve secche; siccome è propriissima una certa terra grossa e bastarda, estremamente atta a pigliare il caldo, per il che nella State fa molte grandi aperture, ma non eccessive. Fa il vino dolce, di color bianco, che partecipa un poco di giallo, non molto spiritoso, ma grato, odoroso e sottile; matura presto per le prime beve, piace assai a beverli solo, e fa buonissima lega mescolata questa con altre Uve proprie.

CAPITOLO XXVIII.

Dell' Uva rossa, chiamata Vajano, e sue qualità.

L' Uva rossa, chiamata Vajano, comincia a maturare verso la fine del mese d' Agosto; e giunta alla sua dovuta maturità, diventa di colore pienissimo; ne fa molta di pigne grosse, spargole, di granella di mediocre grossezza, tonde, sode, e di guscio duro. Fa i capi grossi, di colore di marrone pieno, con gli occhi in giusta lontananza, grossi e rilevati. Fa i pampani grati, grossi, vellutati, e rabescati con le punte acute, di gambo, e di costole grosse, colorite di rossiccio. Vuole il clima caldissimo, il suolo sano, e composto di buonissimo fondo, grasso, pastoso, purchè sia facile a passare la severissima umidità, e atto a pigliare il caldo; potendo adattarsi con buon esito anche all'aria di Ponente. Fa il vino molto colorito, grosso, spiritoso, e durevole, e con pochissimo o nulla d' odore; non è buono nè praticabile a beverli solo, ma fa assai bene mescolata questa con altre Uve proprie in giusta quantità.

CAPITOLO XXIX.

Dell' Uva Verdea, o sia Bergo, e sue qualità.

L'Uva, chiamata Verdea bianca, o come altri dicono, Bergo, è di qualità bellissima, comincia a maturare circa alla metà del mese d'Agosto; e giunta alla sua dovuta maturità, diventa d'un colore molto bello, lucido, chiaro e trasparente; ne fa molta di pigne grosse, alcune ferrate, ed altre spargole, di granelle grosse, tonde, e di guscio gentile. Fa i capi grossi, coloriti di scuro chiaro, con gli occhi spessi, grossi e rilevati. Fa i pampani non molto grandi, grossi, vellutati e rabelcati gentilmente. Vuole il clima caldo, e il suolo simile appunto al Trebbiano di Spagna. Fa il vino dolce, di color bianco, che partecipa un poco di verdino, poco spiritoso, ma odoroso, grato, gentile e stimabile a beverli solo; matura presto per le prime beve, e fa buonissima lega mescolata questa con altre uve proprie.

CAPITOLO XXX.

Dell' Uva Volpola bianca, o come altri dicono Cimiciattola, e sue qualità.

L'Uva Volpola bianca, o come altri dicono Cimiciattola, comincia a maturare alla metà del mese d'Agosto; e maturata perfettamente diventa d'un colore giallo appannato, con alcune picchettature che partecipano di scuro; ne fa molta, di pigne grosse, di figura lunga, la maggior parte spargole, di granelle piccole un poco bislunghe, e di guscio gentile. Fa i capi grossi, di color di marrone pieno, con gli occhj ingiusta lontananza grossi, e rilevati. Fa i pampani di mediocre grandezza, molto lustri al di sopra, poco vellutati dalla parte di sotto, e moltissimo intagliati e rabelcati acutamente, di gambo e di costole piccole, colorite di scuro. Vuole il clima caldo, il suolo sano, esposto all'aria di mezzogiorno, e composto d'una qualità di terra facile a sgravarsi della superflua umidità, è molto atta a pigliare il caldo, come si è detto per il Trebbiano di Spagna. Fa il vino bianco, che partecipa di giallo chiaro, assai spi-

spiritoso, molto odoroso, grato, e stimabile; matura presto, è buonissimo a beverli solo; e mescolata questa con altre uve proprie, fa ottimamente bene, massime ne' vini bianchi, dandoli molto odore.

CAPITOLO XXXI.

Dell' Uva rossa, chiamata S. Zoveto, e sue qualità.

L' Uva rossa chiamata comunemente S. Zoveto, è di qualità bellissima, comincia a pigliare il colore e maturare circa alla metà del mese d' Agosto; e maturata in perfetto grado, diventa d' un colore così pieno, che partecipa quasi del nero; ne fa ogni anno infinitamente moltissima, facendone molti tralci tre pigne (cosa che si vede in poch' altre qualità d' Uve) alcune grosse, ed altre piccole, tutte di figura lunga, ferrate, di granella tonda di mediocre grossezza, e di guscio duro. Fa i capi sottili, coloriti di scuro chiaro con alcune razzature di rossiccio, con gli occhi spessi, piccoli, e poco rilevati. Fa i pampani di mediocre grandezza, molto sottili, chiari, e lustri al di sopra; pochissimo o nulla vellutati dalla parte di sotto, e molto rasecati con le punte acute, di gambo, e di costole sottili, colorite gentilmente di vermiglio. Vuole il clima caldo, il suolo sano, e composto di buonissimo fondo, di terra gratta, passosa, pronta, e attiva; potendo adattarsi quest' Uva anche nelle pianure, e all' aria di Ponente. Fa il vino senza odore, molto colorito, grosso e spiritoso; ma portandosi nella Estate, piglia facilmente d' aceto, o come altri dicono, il fuoco; ond' è, che per non accrescerle il difetto, quando il vino bolle nelle tigne, non si tuffino le vinacce più che tre, o quattro volte, sera, e mattina; ne' primi due giorni dopo che hanno levato, affinchè il vino pigli un poco più di colore, e odore: cose che li cavano solamente dal guscio dell' Uve; perchè il tuffarle tante volte, come praticano in alcuni luoghi dello Stato Fiorentino, massime ne' contorni, e vicinanze di Montemurlo, è da sapersi che il rituffare dopo cinque o sei volte, non serve ad altro, che per levare col medesimo vino i grapi, ed i gusci delle vinacce, ed intanto i vini pigliano d' acido di raschio, ed attraggono altre cose viziose di cattivi odori e sapori, che hanno in se stesse le fecce delle vinac-

vinacce, e i grappi, e pigliano poinella Estate più facilmente d' aceto, e di fuoco. Il vino fatto di quest' uva non è buono a beversì solo, perchè ha sempre della durezza, e dell' acido; ma dall' altro canto questa medesima uva è molto stimabile per mescolarla con altri Vini piccolli, ordinarij, e di pianure, dandoli molto corpo, colore, e sapore.

CAPITOLO XXXII.

Dell' Uva Tedesca rossa, o come altri dicono, Zeppolino Imperiale, e sue qualità.

L' Uva Tedesca rossa, o sia Zeppolino Imperiale, è di qualità bellissima; comincia a maturare gli ultimi giorni del mese d' Agosto: e maturata perfettamente diventa di colore molto pieno; ne fa moltissima, di pigne di mediocre grossezza, raccolte, serrate, di granella molto belle, grosse, tonde, sode, e di guscio duro. Fa i capi di mediocre grossezza, di colore di marrone pieno, con gli occhj spessi, grossi, e rilevati. Fa i panpani piccolli, sottili, lustri, chiari, niente vellutati, molto intagliati, e rabescati con le punte acute, di gambo, e di costole sottili, colorite di rossiccio. Vuole il Clima caldissimo, il suolo esposto totalmente all' aria di mezzo-giorno, sano, e composto di terra sottile, sciolta, leggiera, e salsola, facendo benissimo nella terra rossa e giala, purchè non sia troppo forte, e atta a pigliare il caldo, non apportandole nulla di pregiudizio che vi sia mescolata la rena, o sabbia in tanta quantità che non superi la terra. Fa il vino di colore rubicondo, molto grosso, duro, spiritoso, senza odore, e difficile a maturarsi; non è molto praticabile a beversì solo, ma fa assai bene mescolata questa con altre uve proprie in giusta quantità.

Scelette adunque le migliori, e più sicure uve per fare diversi ottimi vini, e descritte le qualità delle terre, e del Clima a loro più convenienti e proprie, e dati molti contrastegni per conoscerle, i quali molte volte fanno della variazione, perchè dipendono molto anche dalla gagliardezza, e debolezza delle viti, e della qualità delle terre più o meno gagliarde, sane, prodotte, e attive, siccome dal clima più o meno caldo; resta adun-

adunque da dirsi, e nominarsi le qualità, e quantità dell' uve da scegliersi, accozzarsi, e unirsi insieme, per farne giustamente la dose: ed ecco appunto ciò che in appresso vado a descrivere.

CAPITOLO XXXIII.

Delle qualità e quantità dell' Uva da scegliersi e unirsi insieme per fare varie sorte di vini.

Cominciando dunque dal Vino da farsi all' uso di Montepulciano, ch' essendo, per esempio, venti barili, accozzate, pigliate, mescolate, e messe che siano l' uve nel Tino per cominciare a bollire, se ne pigliino subito dal medesimo la quantità d' un barile, o poco più, tra mello e granella, mettendole in Caldaja, dove si facciano bollire lentamente per lo spazio d' ora una in circa, poslevi prima un centinajo di pera, o siano mela cotogne tagliate in pezzi, benissimo mature, acciò siano più odorose; e dopo bollite, così cotte, calde, e fumanti, si mettino nel medesimo Tino con altre uve in maniera che vadino subito al fondo, e restino benissimo coperte, e ferrate dall' altre vinacce, acciò non possino svaporare; tornando poi il secondo giorno a tuffare la medesima vinaccia, seguitando per due o tre giorni continui sera e mattina, lasciandolo poi così bollire, e perfezionarsi; e chiarito sino a un certo segno, si cavi subito dal Tino, mettendolo in botti usate, che abbiano buon' odore, e molta grana, prima benissimo rinvenute, e lavate col vino fresco, aggiugnendo per ogni barile le scorce di quattro, o cinque pera cotogne, levate sottilissimamente, lasciandole nelle botti sino al tempo che si travasa il vino, non potendosi questo tempo appunto limitare, perchè dipende dalla qualità del vino più o meno gagliardo: ma è da sapersi ch' è sempre bene di travasarlo prima che abbia verminato affatto di bollire, e chiarire; perchè facendosi dopo, i vini perdono la sua vivezza, restando sempre fiacchi, sbattuti, e balordi; cosa che può adattarsi a tutte l' altre qualità di vini rossi e stimabili, che non si vogliono dolci, toltane la cottura con le pera cotogne, quale si praticchi solamente a quei vini, che si fanno all' uso di Montepulciano, dalla quale ha origine quel loro sordato, stimabile, e particolare odore.

5. I.

*Delle qualità, e quantità dell' Uve da scegliersi, e unir-
si insieme, per fare un Vino molto colorito, odoroso,
grosso, spiritoso, e durevole all' uso di
Montepulciano.*

DUE parti di Raffaone.
due parti di Mammola tonda.
due parti di Trebbiano Fiorentino, e
Una parte di Raverusto dolce.
*Delle qualità, e quantità dell' Uve da scegliersi, e unir-
si insieme, per fare un Vino come sopra; quasi
col medesimo odore e sapore, ma un poco
meno colorito del primo.*

Due parti di Raffaone.
due parti di Mammola tonda.
due parti di Trebbiano Fiorentino, e
Una parte di Navarrino, o sia Navarra.
*Per fare un Vino come sopra, ma più delicato,
e meno colorito del secondo.*

Due parti di Trebbiano Fiorentino.
Una parte di Raffaone.
una parte di Pignolo, e
una parte di Mammola tonda.

*Per fare un Vino come sopra, ma più delicato,
e meno colorito del terzo.*

Due parti di Trebbiano Fiorentino.
Una parte di Raffaoncello.
una parte di Mammola asciutta, e
una parte di Canajola.

*Per fare un Vino come sopra, ma più odoroso, più
delicato, e meno colorito del quarto.*

Due parti di Mammola asciutta.
due parti di Trebbiano Fiorentino.
Una parte di Raffaoncello, e
una parte di Malvasia.

*Per fare un Vino pure all' uso di Montepulciano, ma
più odoroso, più delicato, meno colorito del
quinto, e da beverfi più presto.*

Due parti di Pignolo.
due parti di Volpola.

due parti d' uva Lonza.

Una parte di Mammola asciutta, e

una parte di Liatico.

§. II.

*Delle qualità, e quantità dell' Uve da scegliersi, e unirsi
inseme, per fare un Vino molto colorito, grosso,
spiritoso, saporito, odoroso, e durevole.*

DUE parti di Raverusio dolce.
due parti di Lacrima di Napoli.
due parti di Trebbiano Fiorentino.
Una parte di Mammola asciutta, e
una parte di Malvasia.

*Per fare un Vino come sopra, ma non tanto colorito,
nè così grosso, e spiritoso.*

Due parti di Trebbiano Fiorentino.
Una parte di Raverusio dolce.
una parte di Lacrima di Napoli, e
una parte di Mammola asciutta.

*Per fare un Vino come sopra, ma sempre meno colorito,
più sciolto, sottile, e delicato.*

Due parti di Trebbiano Fiorentino.
Una parte di Lacrima di Napoli.
una parte di Mammola asciutta, e
una parte di Colore Canajolo.

*Per fare un Vino come sopra, ma con diverso odore,
e sapore.*

Due parti di Trebbiano Fiorentino.
due parti di Mammola asciutta.
Una parte di Raverusio dolce, e
una parte d' uva Lonza.

*Per fare un Vino come sopra, ma più sottile, più deli-
cato, meno colorito, e con diverso odore, e sapore.*

Due parti di Trebbiano Fiorentino.
Una parte di Mammola asciutta.
una parte di Mammola tonda.
una parte di Canajola, e
una parte di Volpola.

§. III.

S. III.

Delle qualità, e quantità dell' Uve da scegliersi, e unirsi insieme, per fare un Vino molto colorito, e grosso, odoreoso, spiritoso, saporito, e durevole.

Due parti di Raffaone.

Due parti di Lacrima di Napoli.

Due parti di Trebbiano Fiorentino, e

Una parte di Mammola tonda.

Per fare un vino come sopra, ma con diverso odore, e sapore.

Due parti di Raverusio dolce.

Due parti di Trebbiano Fiorentino.

Una parte di Vajano.

Una parte di Pignolo, e

Una parte di Mammola tonda.

Per fare un Vino come sopra, ma non tanto grosso, nè tanto colorito.

Due parti di Trebbiano Fiorentino.

Una parte di Raffaone.

Una parte di Lacrima di Napoli.

Una parte di Mammola asciutta.

Per fare un vino come sopra, ma con diverso odore, e sapore.

Due parti di Trebbiano di Spagna, o sia uva Greca.

Una parte di Raverusio dolce.

Una parte di Pignolo, e

Una parte di Mammola asciutta.

Per fare un Vino come sopra, ma un poco più delicato, e diverso nell' odore.

Una parte di Trebbiano Fiorentino.

Una parte di Volpola.

Una parte di Raffaone.

Una parte di Mammola asciutta, e

Una parte di Canajola.

Per fare un Vino come sopra, ma con diverso odore, e sapore.

Due parti di Trebbiano Fiorentino.

Due parti di Mammola tonda.

Una parte di Malvasia.

Una parte di Claretto rosso, e

Una parte di Pignolo.

S. IV.

Delle qualità, e quantità dell' Uve da scegliersi, e unirsi insieme per fare una qualità di Vino non molto grosso, ma spiritoso, odoroso, colorito, e durevole.

DUE parti di Mammola tonda.
due parti di Trebbiano Fiorentino.

Una parte di Volpola.

una parte di Rassaone, e

una parte di colore Canajolo.

Per fare un Vino come sopra, ma con diverso odore e sapore, e un poco più delicato.

Due parti di Trebbiano di Spagna, o sia uva Greca.

due parti di Mammola asciutta.

Una parte di Rassaone, e

una parte di Canajola.

Per fare un Vino come sopra, ma più delicato, e meno colorito.

Due parti di Trebbiano di Spagna.

Una parte di Mammola asciutta.

una parte di Mammola tonda.

una parte di Canajola, e

una parte di Claretto bianco.

S. V.

Delle qualità, e quantità dell' Uve da scegliersi, e unirsi insieme per fare una qualità di Vino, non molto colorito, spiritoso, sciolto, sottile, odoroso, delicato, e buono per le prime beve.

DUE parti di Trebbiano Fiorentino.

due parti di Mammola asciutta.

due parti di Barbarossa.

Una parte di Canajola, e

una parte di Liatico.

Per fare un Vino come sopra, ma con diverso odore, e sapore.

Due parti di Trebbiano di Spagna.

due parti di Mammola tonda.

due parti di Barbarossa.

due parti di Liatico, e

Una parte di Malvasia.

S. VI.

§. VI.

Delle qualità, e quantità dell' Uve da scegliersi, e unirsi insieme per fare un Vino assai colorito, non molto grosso, ma odoroso, e buono per le prime beve.

DUE parti di Trebbiano Fiorentino .
due parti di Liatico .

Una parte di Canajola .

una parte di Mammola asciutta, e

una parte di Mammola tonda.

Per fare un Vino come sopra, ma con diverso odore, e sapore.

Due parti di Trebbiano di Spagna.

due parti di Liatico.

Una parte di Raffaone:

una parte di Mammola tonda, e

una parte di Malvasia.

Per fare un Vino come sopra, ma più delicato, e meno colorito.

Due parti di Volpola .

due parti di Mammola asciutta.

Una parte d' Occhio di Pernice rossa, e

una parte di Dolcippola.

§. VII.

Delle qualità, e quantità dell' Uve da scegliersi, e unirsi insieme per fare un Vino molto colorito, grosso, spiritoso, saporito, durevole, e capace per la navigazione, ma poco praticabile dagli stomacchi delicati.

DUE parti di Lacrima di Napoli .

Una parte di Navarrino, o sia Navarra .

una parte di Raverusio dolce, e

una parte d' uva Tedesca, o sia Zepolino imperiale .

Per fare un Vino come sopra, ma con diverso odore, e sapore.

Due parti di Lacrima di Napoli .

Una parte di Raffaone .

una parte di Navarrino .

una parte di Pignolo, e

una parte di Vajano .

Per

CAPITOLO XXXIII. 81

*Per fare un Vino come sopra, ma con diverso odore,
e sapore.*

Due parti di Lacrima di Napoli.

Una parte di Raffanccello.

una parte di Mammola tonda, e

una parte d'Uva Tedesca.

*Per fare un Vino come sopra, ma con diverso odore,
e sapore.*

Due parti di Lacrima di Napoli.

due parti di Mammola asciutta.

Una parte di Pignolo, e

una parte d'Uva Tedesca.

*Per fare un Vino come sopra, ma non tanto grosso, men
colorito, e più odoroso.*

Due parti di Trebbiano Fiorentino.

Una parte di Lacrima di Napoli.

Una parte di Raffone, e

una parte di Navarrino.

*Per fare un Vino come sopra, ma sempre meno colorito,
e più odoroso.*

Due parti di Trebbiano Fiorentino.

Una parte di Lacrima di Napoli.

Due parti di Pignolo.

una parte di Mammola tonda, e

una parte di Malvasia.

*Per fare un Vino come sopra, sempre meno grosso,
meno colorito, più odoroso, e delicato.*

Due parti di Trebbiano di Spagna.

Una parte di Raffone.

una parte di Navarrino, o sia Navarra.

una parte di Mammola asciutta, e

una parte di Verdea, o sia Bergo.

6. VIII.

*Delle qualità, e quantità dell'Uve da scegliersi, e unir-
si insieme, per fare un Vino molto colorito, odoroso,
grosso, spiritoso, saporito e durevole,
capace pure per la navigazione.*

UNA parte di Lacrima di Napoli.

una parte di Navarrino, o sia Navarra, e

una parte di Claretto rosso.

F

Per

822 DELL' UVE, E DE' VINI

Per fare una qualità di Vino come sopra, ma più colorito, e più odoroso.

Una parte di Lacrima di Napoli.

una parte di Navarrino, e

una parte di Pignolo.

Per fare un Vino come sopra, ma un poco diverso nel colore, e nell'odore.

Una parte di Raffaoncello.

una parte di Raverusio dolce, e

una parte d' uva Tedelca.

Per fare un vino come sopra, ma non così grosso, meno colorito, più praticabile, e diverso nell' odore, e nel sapore.

Due parti di Trebbiano Fiorentino.

due parti di Navarrino.

una parte di Mammola tonda, e

Una parte di Pignolo.

Per fare una qualità di Vino come sopra, ma sempre meno grosso, meno colorito, e diverso nell' odore, e nel sapore.

Due parti di Navarrino.

due parti di Trebbiano Fiorentino.

Una parte di Pignolo.

Per fare una qualità di Vino come sopra, sempre meno colorito, e più delicato.

Due parti di Mammola asciutta.

due parti di Trebbiano Fiorentino, e

una parte di Navarrino.

Per fare una qualità di Vino come sopra, ma un poco meno colorito, più delicato, e da beverfi più presto.

Due parti di Mammola asciutta.

Una parte di Pignolo.

una parte di Canajola.

una parte di Trebbiano Fiorentino, e

una parte di Volpola.

§. IX.

Delle qualità, e quantità dell' Uve da scegliersi, e unirsi insieme, per fare un Vino colorito, spiritoso, saporito, odoroso, sottile, delicato, e molto stimabile per le tavole nobili, chiamato Moscadello rosso.

TRE parti di Moscadella rossa.

Due parti di Liatico, e

Una parte di Navarrino.

Per

CAPITOLO XXXIII. 83

Per fare un Vino come sopra, ma un poco diverso nell'odore, e nel sapore.

Tre parti di Moscadella rossa.

Due parti di Liatico, e

due parti di Pignolo.

Per fare una qualità di Vino come sopra, ma un poco meno colorito, e con diverso odore, e sapore.

Tre parti di Moscadella rossa.

Due parti di Liatico, e

due parti di Trebbiano di Spagna, o sia uva Greca.

Per fare una qualità di Vino come sopra, ma un poco diverso nel sapore, e nell'odore.

Tre parti di Moscadella rossa.

Due parti di Liatico, e

Una parte di Trebbiano Fiorentino.

Per fare una qualità di Vino come sopra, sempre più delicato, meno colorito, e con diverso odore, e sapore.

Due parti di Moscadella rossa.

due parti di Liatico, e

due parti di Volpola.

Per fare una qualità di Vino come sopra, ma con diverso odore, e sapore.

Due parti di Moscadella rossa.

due parti di Liatico, e

due parti d'uva Lonza.

Per fare una qualità di Vino come sopra, ma più delicato, e con diverso odore e sapore.

Due parti di Moscadella rossa.

due parti di Liatico, e

due parti di Dolcippola.

Per fare una qualità di Vino come sopra, ma un poco diverso nel sapore, e nell'odore.

Due parti di Moscadella rossa.

due parti di Liatico, e

due parti d'uva S. Maria.

9. X.

Delle qualità, e quantità d'Uve da scegliersi, e unirsi insieme per fare un Vino molto colorito, grosso, odoroso, spiritoso, saporito, e molto durevole e stimabile.

TRE parti di Moscadella rossa.

Una parte di Lacrima di Napoli, e

una parte di Navarrino.

Per fare un Vino come sopra, ma con diverso odore, e sapore.

Tre parti di Moscadella rossa.
Una parte di Lacrima di Napoli, e
una parte di Pignolo.

Per fare un Vino come sopra, ma più delicata, e con diverso odore, e sapore.

Tre parti di Moscadella rossa.
Due parti di Trebbiano Fiorentino.
Una parte di Rassaone, e
una parte di Navarrino.

Per fare una qualità di Vino come sopra, ma con diverso odore, e sapore.

Tre parti di Moscadella rossa.
Due parti di Malvasia.
Una parte di Raverusio dolce, e
una parte di Pignolo.

9. XI.

Delle qualità, e quantità dell' Uve da scegliersi, e unirsi insieme per fare un Vino poco colorito, sottile, odoroso, spiritoso, saporito, durevole, e molto stimabile, chiamato Occhio di Pernice.

DUE parti d' Occhio di Pernice rossa.
due parti d' Occhio di Pernice bianca.
una parte di Rassaone, e
una parte di Trebbiano Fiorentino.

Per fare un Vino come sopra, ma più odoroso, e con diverso sapore.

Due parti d' Occhio di Pernice rossa.
due parti d' Occhio di Pernice bianca.
Una parte di Mammola tonda, e
una parte di Trebbiano di Spagna.

Per fare un Vino come sopra, ma più odoroso, e con diverso sapore.

Due parti d' Occhio di Pernice rossa.
due parti d' Occhio di Pernice bianca.
Una parte di Mammola asciutta, e
una parte di Malvasia.

Per

Per fare un Vino come sopra, ma con diverso odore, e sapore.

Due parti d' Occhio di Pernice rossa.
due parti d' Occhio di Pernice bianca.
due parti di Malaga bianca, e
Una parte di Malaga rossa.

§. XII.

Delle qualità, e quantità dell' Uve da sceglierfi, e unirfi insieme, per fare un Vino di poco colore, ma sapori- to, spiritoso, sciolto, sottile, e durevole, chiamato Claretto all' uso di Francia.

DUE parti di Claretto rosso.
due parti di Claretto bianco.
Una parte d' uva Tedesca, e
una parte di Trebbiano Fiorentino.

Per fare un Vino come sopra, ma con diverso odore, e sapore.

Due parti di Claretto rosso.
due parti di Claretto bianco.
Una parte di Malaga rossa, e
una parte di Malaga bianca.

Per fare una qualità di Vino come sopra, sempre con diverso odore, e sapore.

Due parti di Claretto rosso.
due parti di Claretto bianco.
Una parte di Raffaele, e
una parte di Malaga bianca.

Per fare una qualità di Vino come sopra, ma con diverso odore, e sapore.

Due parti di Claretto rosso.
due parti di Claretto bianco.
Una parte di Mammola atciotta, e
una parte di Malaga bianca.

Per fare una qualità di Vino come sopra, ma con diverso odore, e sapore.

Due parti di Claretto rosso.
due parti di Claretto bianco.
una parte di Mammola tonda, e
una parte di Trebbiano Fiorentino.

S. XIII.

Delle qualità, e quantità dell' Uve da scegliersi, e unirsi insieme, per fare una qualità di Vino bianco molto odoroso, dolce, spiritoso, sottile, sciolto, e molto stimabile per le tavole nobili, chiamato moscadello bianco.

Quattro parti di Moscadella bianca perfettamente matura, e scelta esattamente dall' altra troppo vizza, e imperfetta, e

Una parte di Trebbiano Fiorentino.

Per fare una qualità di Vino come sopra, ma con diverso odore, e sapore.

Quattro parti di Moscadella bianca.

Una parte di Trebbiano Fiorentino, e

una parte di Malvasia.

Per fare una qualità di Vino come sopra, ma sempre un poco diverso nell' odore, e nel sapore.

Quattro parti di Moscadella bianca.

Una parte di Trebbiano Fiorentino, e

una parte di Volsola.

Per fare una qualità di Vino come sopra, ma un poco più delicato, e diverso nell' odore, e nel sapore.

Quattro parti di Moscadella bianca.

Una parte di Trebbiano Fiorentino, e

una parte di Trebbiano di Spagna.

Per fare una qualità di Vino come sopra, ma sempre più delicato, e di colore più scarico, e simile alla paglia, e con diverso odore, e sapore.

Tre parti di Moscadella bianca, e

due parti di Verdea, o sia Bergo.

Per fare una qualità di Vino come sopra, ma più delicato, più scarico di colore, e con diverso odore, e sapore.

Tre parti di Moscadella bianca, e

Due parti di Dolcippola.

Per fare una qualità di Vino come sopra, ma assai diverso nell' odore, e nel sapore.

Tre parti di Moscadella bianca.

Due parti d' Uva Lonza, e

una parte d' Uva Santa Maria.

S. XIV.

S. XIV.

*Delle qualità, e quantità del' Uve da scegliersi, e unir-
si insieme per fare una qualità di Vino bianco molto
odoroso, grato, dolce, spiritoso, e stimabile, chiamato
Trebiano alla Fiorentina, ovvero all' uso di Lampa-
recchio.*

Quattro parti di Trebiano Fiorentino, e
Una parte di Malvasia.

*Per fare una qualità di Vino come sopra, ma
con diverso odore, e sapore.*

Quattro parti di Trebiano Fiorentino, e

Due parti di Trebiano di Spagna, o sia uva Greca.

*Per fare una qualità di Vino come sopra, ma sempre
con diverso odore, e sapore.*

Quattro parti di Trebiano Fiorentino, e

Una parte di Verdea.

*Per fare una qualità di Vino come sopra, ma più deli-
cato, e con diverso odore, e sapore.*

Quattro parti di Trebiano Fiorentino, e

Due parti di Dolcippola.

S. XV.

*Delle qualità, e quantità dell' Uve da scegliersi, e unir-
si insieme, per fare un Vino bianco, alquanto spiritoso,
molto odoroso, grato, e stimabile per le tavole
Nobili; chiamato Malvasia.*

Quattro parti di Malvasia.

Due parti di Trebiano Fiorentino, e

Una parte di Volpola.

*Per fare un Vino come sopra, ma un poco diverso
nell' odore, e nel sapore.*

Quattro parti di Malvasia.

Due parti di Trebiano Fiorentino, e

Una parte d' uva Lonza.

*Per fare un Vino come sopra, ma un poco diverso
più delicato, e con diverso odore, e sapore.*

Quattro parti di Malvasia.

Due parti di Trebiano di Spagna, e

Una parte di Trebiano Fiorentino.

Per fare un Vino come sopra, sempre più delicato, e diverso nel sapore, nell' odore, e nel colore.

Tre parti di Malvasia.
Due parti di Trebbiano di Spagna, e
Una parte di Dolcippolla.

6. XVI.

Delle qualità, e quantità dell' Uve da scegliersi, e unirsi insieme per fare un Vino non molto spiritoso, ma odoroso, gentile, dolce, grato, e molto stimabile, massime per le tavole nobili, chiamato Verdea alla Fiorentina, ovvero all' uso di Carmignano.

Quattro parti di Verdea, o sia Bergo.
Due parti di Trebbiano Fiorentino, e
Una parte di Dolcippolla.

Per fare una qualità di Vino come sopra, ma un poco diverso nell' odore, e nel sapore.

Quattro parti di Verdea.
Due parti di Trebbiano Fiorentino, e
Una parte d' Uva S. Maria.

Per fare una qualità di Vino come sopra, ma sempre poco diverso nel sapore, e nell' odore.

Quattro parti di Verdea.
Due parti di Trebbiano di Spagna, e
Una parte di Trebbiano Fiorentino.

TRATTATO DE' GELSI.

*Del modo di far Virvaj di rami di Gelsi, che si
chiamano Barbate.*

CAPITOLO PRIMO.

PER far questa sorta di Barbate di rame di Gelsi, primieramente è necessario avere de' pedali di Gelsi grossi, giovani, e di buona forza, che siano molto bassi; e meglio sarebbero le sole Ceppaje, o barbicaie basse al pari della Terra; poichè, nascendo da quelle i Virgulti, o sieno polloni, se le ceppaje sono veramente buone e gagliarde, in un solo anno i loro Virgulti vengono lunghi più di quattro braccia. Pieghinsi poi con avvedutezza abbasso, facendo in terra sotto di essi una fossa, larga e profonda braccia uno e mezzo per lo meno, dove si calino, piegando i detti Virgulti, senza staccarli dalle loro Ceppaje, comprendoli con terra, e concime trito, e sostanzioso; tirando le cime fuori della fossa piegandole con bella maniera all' insù, e in modo che sieno dritte, serrando loro la terra all' intorno senza pigliarla neppure co' piedi, fermandole appunto come se fossero propaggini, o sottomesse di Viti; che in due anni mettono le loro barbe maesthe mezzo braccio sotto la superficie della terra, e diventano Gelsetti molto belli; onde allora si possono staccare dalle loro piante, per piantarli nelle coltivazioni.

Per quello che riguarda il tempo di fare le barbate suddette, se le ceppaje fossero in luoghi di terreni leggerosi, fertili, e asciutti, si facciano ogn' anno passata la metà di Novembre; se poi fossero in terreni forti, umidi, e grossi; si facciano nel mese di Marzo. Il simile si pratichi nello sbarbarle, e piantarle nelle Col-

CAPITOLO II.

Del modo di fare Vivaſi di Gelfini di ſeme, che ſi cava dalle More de' Gelfi.

SI ſcelga primieramente il Terreno ſano, graſſo, leg-
gieroſo, attivo, e pronto; in luogo caldo, non
troppo eſpoſto alla Tramontana, e col comodo dell' ac-
qua, e ſi vanghi, o ſi zappi per il meno due palmi al
fondo, purgandolo diligentemente da tutte l'erbe, bar-
be, spine, ec. Poi ſi ripartilca in piccole porche, o bran-
nie, appunto come ſe ſi dovessero ſeminare, o pianta-
re Cipolline, o altri ſemi d'erbaggi; ed ivi ſi ſemini il
ſeme delle more de' Gelfi, cavato e conſervato come ſi
dice in appreſſo.

Si ſcelgano le more in tempo che ſieno intieramen-
te fatte, e a perfezione mature, tenendole per cinque,
o ſei giorni ammaſſate, e ſerrate inſieme; mettendole
poi in un vaſo di acqua, dove ſi ſtropicchino, e ſi diſ-
facciano affatto colle mani, tirando fuori tutte le ma-
terie groſſe, mutando più volte l'acqua, acciocchè il
ſeme reſſi ben pulito e netto da tutto il groſſume, ec.
Il ſeme buono reſta ſempre al fondo; queſto ſolo ſi pi-
gli, e ſ' aſciughi perfettamente all' aria, ſubito cavato
dall' acqua; poi ſ' involga in una pezza di tela di lino,
o di canape, ovvero ſi metta in qualche vaſo da por-
terſi ſerrare o coprire, per conſervarlo in luogo ſano,
e aſciutto fino al tempo della ſemenza; e volendolo
potare per qualche anno avanti, ſiamo ſicuri che non
paſiſce, e naſce francamente.

Al principio del meſe d' Aprile, ch' è il vero tempo
di ſeminarlo, ſi meſcoli con rena aſciutta, ſtropiclan-
dola bene inſieme colle mani, affinché ſi diſtaccino i
ſemi l' uno dall' altro, perchè altrimenti naſcerebbero a
mucchietti, e non in giuſta diſtanza, nè agguagliati.
Coſì diſtaccato l' uno dall' altro il ſeme, e meſcolato
colla rena, ſi ſemini nelle porche, o bran-
ie già prepa-
rate, e governate con concime tritiſſimo, e ſoſtanzi-
oſo, come farebbe polvere di grano, roſo dalle tar-
me, ſterco di colombi, di polli, o di pecore, prima ſmal-
tito, e tritato beniſſimo inſieme; dipoi ſi ſcopra leggier-
mente con terra più ſtritolata e ſottile che ſia poſſibi-
le,

le, acciò possa nascere con tutta facilità. Dopo nati di pochi giorni si osservi, che se ne fossero nati a mucchi, come suol quasi sempre accadere, di levare subito i superflui, acciò vengano tutti d' ugual grossezza, e bellezza: e sopra tutto si tengano puliti dall' erbe, e si stia avvertiti, che nella State, o in altri tempi di Primavera, o d'Autunno non patiscano mai l'alcitatore; nè s'adacquino tanto spesso, nè in tanta copia, che la terra resti oppressa, e addormentata per la troppa umidità: e faremo sicuri di avere Vivai di Gelsini bellissimi, ma salvatici, e di Foglia chiamata comunemente Spagnuola.

Chi non volesse il fastidio, e l'imbarazzo di far simili Vivai, quando fosse in paesi, come a Pistoja, a Pescia, ed in altri luoghi, dove gli Ortolani, per la gran pratica che hanno, ne fanno i Vivai grandissimi, da trapiantarli, e trasportarli altrove, e li vendono a vilissimo prezzo: farebbe, dico io, in tal caso meglio comprarli, che mettersi nella suggezione di fare i Vivai, massime alle mani, e alla cura di persone poco pratiche, e di poca capacità.

I suddetti Gelsini si possono sbarbare nel primo mese di Marzo, dopocchè furono seminati, e ripiantarli nel secondo Vivaio, dove si devono innestare.

CAPITOLO III.

Del modo di ripiantare nel secondo Vivaio i Gelsini, e del modo e tempo d'innestarli.

VENendo al modo di sbarbare i Gelsini dal primo suddetto Vivaio, e ripiantarli nel secondo, dove si devono innestare, si faccia in questa maniera. Nella terra scelta, come si è detto nel Capitolo antecedente, già vangata più di due palmi al fondo, pulita e purgata da tutte l'erbe, barbe, ec. si facciano i solchetti, lontani due palmi uno dall'altro, facendovi poi le buchette, serzate nella medesima distanza, sode circa a un palmo, di grandezza capaci tutte di una grossa giunella di concime smaltito, e di buona sostanza, mescolato un poco colla terra. Si piglino poi i Gelsini, tagliandoli le cime, in maniera che restino alti meno d'un braccio sopra la terra, spuntando un poco

poco l'estremità della barba maestra, acciò si guarniscino più facilmente di nuove barbe naturali. Dipoi s'imbrattino al solito, e si piantino nelle buchette meno d'un palmo al fondo, allargandoli benissimo le piccole barbe per il loro verso naturale, coprendole colla melcolanza di terra, e concime senza pigliarla, nè serrarla troppo, neppure colle mani. S'osservi in oltre di tenere sempre il terreno pulito e netto dall'erbe, sarchiandolo, smuovendo, e sollevando la terra, per lo meno ogni quaranta, o cinquanta giorni una volta, particolarmente nella Primavera, nella State, e nell'Autunno; purchè non si tocchi in tempo che sia troppo bagnata; e si faccia che non patiscano mai l'asciuttore, perchè altrimenti i Gelsini s'illanguidiscono, e non vengono in poco tempo di quella forza, e di quella grossezza, che si ricerca per averli perfetti; e talvolta conviene aspettare un anno di più a innestarli, e trasportarli nelle coltivazioni. Nè vi si piantino mai che insalate, o altri minuti erbaggi, da levarsi in pochi giorni.

Cominciando poi a crescere, si levino subito pizzicandoli coll'unghie tutti i rametti che sortiscano per lo dosso del fusto, a riserva d'uno, o due de' più vicini all'estremità; affinchè il fusto venga pulito, liscio, e non brozzoloso. Io dico che si levino subito che si vedono nascere, acciò non abbiano tempo d'ingrossare, e affodare, per non avere a servirsi del coltellino; perchè in questo caso si perde del nutrimento inutilmente, e le cicatrici fanno tosto, che i fusti restano scabrosi, e difficili a innestarsi appunto in luogo proprio, cioè più bassi che sia possibile; e perciò si rivedano spesso, tenendoli sempre puliti da' suddetti rametti: spuntandosi anche una volta almeno le sortite, lasciate su all'estremità, acciò che il fusto si faccia più facilmente grosso, e robusto.

Passata poi la metà del primo mese di Novembre, dopo che furono piantati, si scalzino più largamente che sia possibile, tagliando loro tutte le barbarelle piccole, che si trovano intorno alla coronetta, ch'è quanto dire vicine alla superficie della terra, e si governino con una grossa giumenta di concime buono per ciascheduno; ricalzandoli immediatamente senza pigliarli intorno la terra.

Giun-

Giunti poi circa alla metà del mese d'Aprile dell'anno susseguente, s'innestino con diligenza per mezzo di persone pratiche. E perchè al tempo dell'Innestatura, cioè verso la metà del mese d'Aprile, le mazze de' Gelsi domestici sono entrate troppo in azione, e gonfiati, e ingrossati talmente i loro occhj, che non si possono snodare, e cavare gli anelletti per gl'Innesti, senza che crepino, o si guastino gli occhj; onde è necessario pensare anticipatamente a tagliarle da' Gelsi domestici, prima ch'entrino molto in azione, cioè verso gli ultimi del mese di Marzo; non potendosi appunto limitare il tempo, poichè dipende dalle stagioni, più anticipate, o posticipate, e da' Paesi, e da' Climi più caldi, e più freddi, siccome dalle qualità delle terre, più o meno pronte e attive. Tagliate adunque che avremo le mazze da' Gelsi domestici, prima che abbiano gonfiati e ingrossati i loro occhj, si distendano in terra sopra la rena fresca, coprendole tosto colla medesima per l'altezza di più d'un palmo; scegliendo il luogo sano, non molto caldo, e allo scoperto, acciò non si sciolga; nè si rarefaccia di vantaggio il nutrimento, ma si conservino tali quali fino al giorno, che si devono fare gl'innesti, quale si scelga non piovoso, nè troppo rigido, nè troppo ventoso.

Parlando adesso del modo d'innestare, dico, che si snodino, e si cavino gli anelletti dalle mazze domestiche, in modo che non crepino, nè si guastino loro gli occhj; e dopo snodati, prima di cavarli dalla loro mazza, questa si accosti, e si paragoni col fusto del Gelsetto selvatico, per vedere se le grossezze sieno uguali, e si confacciano, quando non si voglia praticare il compasso colle punte storte, che facilita molto. Ma è da sapersi, che il fusto selvatico, dev'esser sempre un poco più grosso della mazza domestica, per la ragione dell'anelletto, che spinto abbasso nel fusto selvatico, prima che l'abbracci giustamente, viene a stirarsi, e crescere di grandezza. S'innestino adunque i Gelsetti selvatici sempre più bassi che sia possibile; osservando che gli anelletti abbraccino giustamente il selvatico; il che si conosce da una certa piccola acquarugiola, che tramandano fuori gli anelletti nell'atto di spingerli abbas-

basso, essendo questo un vero e sicuro contrassegno, che allora abbracciano giustamente.

Se vi fosse qualche Gelsetto salvatico tanto ingrossato, che non si trovasse mazze domestiche di grossezza capace per innestarlo, si faccia a occhietto, o a scudetto, come gli Agrumi, che in questo modo ancora fanno benissimo; ma è più difficile l'attaccarsi. E se ve ne fossero qualcheduni di fusto storti, s'innestino in maniera, che l'occhio dell'anelletto torni sempre al disopra della piegatura; perchè se tornasse al disotto, in vece di correggere, s'accrescerebbe il difetto.

Innestati che saranno i Gelsetti, viene ad esser fermata la strada al nutrimento, per mezzo di quel gran taglio fatto sopra la loro testa; ond'è che non essendo per allora l'occhietto dell'Innesto, capace di ricevere tutta la sostanza, e la virtù, ch'attraggono, e li tramandano le barbe; e volendosi far nuova strada per mezzo di sortite, e di germogli sopra il Fusto salvatico, vicino alla superficie della terra; i quali si strappino interamente subito che si vedono, per obbligare il nutrimento a far tutta la forza, e l'azione verso l'occhio dell'innesto, mentre sia attaccato. Dal quale ordinariamente ne sogliono nascere tre germogli, o rametti, de' quali se ne lasci solamente uno il più bello, e meglio situato, che suol esser quasi sempre quello di mezzo; levando subito gli altri due, pizzicandoli coll' unghie. Tornando poi di quando in quando a visitarli, osservando se ve ne fossero sortiti altri rametti, tanto per il Fusto salvatico, che dall'occhietto dell'Innesto, si levino subito come sopra; seguitando fino a tanto che il Germoglio ramo maestro, sortito dall'occhio domestico, non si sarà fatto grosso e capace di ricevere andantemente tutto il nutrimento.

Essendo che il suddetto Germoglio ramo maestro siasi fatto grosso, e capace di ricevere stradatamente tutto il nutrimento, e la virtù, che li tramandano le barbe, ne segue, che quasi ad ogni occhio ne fortiscano varj rametti, quali si levino subito che si vedono, strappandoli colle dita; e sopra d'ogni altra cosa, si faccia il possibile, perchè nella State non patiscano mai l'asciutore, adacquandoli sempre che ne hanno bisogno: tenendo continuamente il terreno netto, e pulito

lito dall'erbe, smosso, e sollevato, zappandolo, e vangandolo frequentemente.

CAPITOLO IV.

Del sito, modo, e tempo di piantare nella coltivazione i Gelsi innestati, cavati dal Vivajo.

I Gelsi richiedono il terreno sano, grasso, leggiero, asciutto, e non padulingo, acquatrinoso, nè vizioso per qualsivoglia altra cosa; essendo, quanto amici del suolo sano e fresco, altrettanto nemici del troppo umido, e vizioso, dove s'illanguidiscono, e periscono facilmente. Richiedono anche paese caldo, ovvero temperato; e se mai si piantassero in paesi freddi, s'avverta di piantarli verso Oriente, o Mezzogiorno; e difesi, più che sia possibile, dalla Tramontana.

Parlando adesso del modo di piantarli, è da sapersi, che volendolo fare a buche, si facciano larghe, e sponde sempre più di due braccia per ogni verso; facendovi le sue necessarie sogne, per il dovuto scolo dell'acque sotterranee, come si è detto per le fosse da Viti; in modo che resti fognato anche tutto il fondo della buca. E dandosi l'accidente di qualche luogo, dove non fosse possibile di cavare l'acque sotterranee senza una spesa evidente; in questo caso si faccia la buca assai più profonda, mettendovi maggior quantità di sassi; e di stipa, e frasche grossolane; e questo è per alcune terre naturalmente sode, ferrate, e legate insieme, che non trabevono l'acque dov'è necessario far le buche, e le fosse larghe, per lo meno tre braccia. Laddove nelle pianure, ed in altri luoghi composti di Terre leggierole, e sciolte, non è punto necessario lo scolo dell'acque sotterranee, mentre le trabevono da per loro, passandole facilmente al fondo nelle viscere della Terra dove non possono mai giugnere le barbe delle piante. Indi si mettono per lo meno due grossi fasci di stipa, o altro legname verde per ogni buca, alzandovi poi per mezzo braccio un suolo di Terra scelta, e sopra questa si metta stajo uno e mezzo di concime, e forse più, mescolando un poco colla terra, in maniera che resti ammassato a guisa di un piccolo monticello rilevato appunto in mezzo della buca. Pigliando il Gelsio sbarba-

to di fresco dal vivaio diligentemente , con tutte le sue barbe, faoe, intiere, e perfette, e non tagliate al mezzo, nè lacerate alla peggio , come sogliono fare tutti gli Ortolani, ed altre persone, che ne fanno negozio; e imbrattandole col solito sterco vaccino, sfatto con acqua, si pianta nella buca sopra il monticello, in maniera che non resti al fondo più di due palmi; facendo scendere le barbe colle cime abbasso, distese naturalmente sopra il dosso del divulato monticello; coprendole leggermente colla terra scelta, mettendovi sopra un altro stajo di concime bene allargato da per tutto. Terminando poi di riempire la buca senza pigliare nè calpestare niente affatto la terra. Nè mai si faccia questa operazione in tempo, che la terra sia troppo bagnata, nè in giornate molto rigide. Piantato, e ricalzato bene il Gelfo, come sopra si è detto, si spunti all'altezza di tre braccia e mezzo in circa, e secondo che lo richiede il paese, e la grossezza del fusto; coprendoli la tagliatura con mistura da innesti, che fa, che l'acqua non penetri nell'anima, e nelle porosità del fusto a contaminarlo, e impedire che le sortite più robuste e migliori, non vengano secondo il buon ordine della natura, che vale a dire dagli occhj più alti, e vicini all'estremità. Mettasi poi un palo più dritto che sia possibile, piantato forte in terra, alquanto vicino al Gelfo, e in modo che resti dominato dal Sole; fermandolo con legatura due palmi vicino all'estremità, frapponendovi i suoi fardellini di fieno, acciò non sia sbattuto, nè troppo agitato da' Venti, nè lacerato dal palo, nè dalla legatura.

In quanto alle considerazioni, che riguardano il tempo di piantare i Gelsi nelle Coltivazioni, è da sapersi, ch'essendo le terre leggierose, sciolte, naturalmente asciutte, e in luoghi caldi, nè molto esposte alla Tramontana, si piantino dalla metà di Novembre fino a tutto Dicembre. Dove nelle terre, naturalmente umide, forti, e molto sostanziose, si piantano dal principio fino a tutto Marzo. Il simile nella maggior parte delle pianure basse, dov'è molto difficile e dispendioso trovare i sassi per le fugne, e dar lo scolo all'acque. Adunque in questi luoghi si facciano le fosse, o buche un poco più profonde, per supplire colla maggior

gior quantità di stipa, e grosse frasche, affinchè le barbe, almeno per cinque o sei anni, possano agire colla dovuta vivezza e celerità, e intanto prendano possesso, facendosi proprio quell'asciutto e sano terreno, che se s'infermassero, o s'illanguidissero prima, mai si farebbero da nulla, quando non perissero affatto.

Piantati e fermati i Gelsi, come sopra si è detto, si vadano a rivedere gli ultimi giorni del mese di Maggio, ovvero al principio di Giugno, levandoli tutt' i rametti fortiti per il dosso del fusto, a riserva di soli due, i più robusti, e meglio situati, che secondo il buon ordine della natura, devono essere i più alti, e vicini all'estremità del fusto tagliato; purchè uno guardi a destra, e l'altro a sinistra, nè mai si lasciano ambedue dalla medesima parte, mentre devono servire per cominciare l'ossatura delle rame: e caso che i due rametti più robusti e migliori fossero venuti dalla medesima parte, uno sopra all'altro, come di sovente accade, se ne lasci solamente uno il più grosso, levandoli intieramente tutti gl'altri.

Passata la metà del primo mese di Novembre dopo piantati, in qualsivoglia sorta di terre, si scalzino largamente da per tutto all'intorno, e tanto al fondo, che si comincino a trovare le barbe maestre, e la loro ceppaja, tagliandoli tutte l'altre, che nate fossero per il fusto scalzato, acciò non sieno mai di pregiudizio a quelle di fondo, dovendo sole queste esser le buone per far crescere, e sostenere la pianta, e perciò, scalzate che sieno, si governino alquanto lontani nel fusto, con uno stajo e mezzo per lo meno, del solito concime sostanzioso e smaltito, dove farebbe molto utile, se vi fossero mescolate delle vinacce, e delle fecce, e fondate di vini, che si cavano dalle botti nell'atto di traversarli; ponendolo sopra le barbe, mescolato un poco colla terra, ricalzandoli immediatamente senza pigliarla; e saremo sicuri d'avere più anticipatamente i Gelsi, sani, robusti, e vigorosi, e la foglia non solo in maggior quantità, ma più salubre, più odorifera, e più perfetta.

Se la stagione fosse piovosa, e non a proposito; ovvero la moltiplicità degl'affari non permettesse di poterli scalzare e governare nel tempo sopra accennato;

G

si fac-

si faccia di altri tempi, sempre più anticipatamente che sia possibile, e prima di giugnere alla Primavera, col dovuto riguardo di non farlo in tempo che la terra sia troppo bagnata.

Nell'atto adunque di scalzare, e governare i Gelsi, come sopra, si osservi esattamente, se ve ne fossero de' dubbiosi, e non attaccati, e assicurati perfettamente, o che avessero patito, o non dessero una sicura dimostrazione d'essere interamente sani, il che si conosce dal non aver fatti che piccoli, e minuti getti, languidi, e di cattivo colore, che sono falsi segni di ripresa, derivati poco più, che dal solo effetto della rassolazione, e niente ajutati dalle loro inferme, e addormentate barbe; quali si cavino, e si rigettino subito, ripiantandoveli di nuovo colle medesime regole sopra descritte. Perchè non è perdita uguale nell'agricoltura a quella di lasciare nel terreno già coltivato e governato le piante, che si vedono così imperfette e dubbiose, che per lo più ordinariamente riescon tutte cattive; e intanto si perde il tempo e l'utile, e si moltiplicano le spese, dovendole poi necessariamente ripiantare più tardi, e passati che sieno degli anni; quando non vogliasi dare in una certa biasimevole dappocaggine, di non esser costanti, come ho veduto in molti, che se mi fosse lecito, vorrei dire, che per mancanza di cognizione, nojati, e perduti d'animo, hanno vergognosamente abbandonato il luogo, e battuta affatto tutta la fatica, e la spesa.

Dopo scalzati, governati, e ricalzati i Gelsi, si potino subito, tagliando le loro prime sortite alla lunghezza di quattro, cinque, o sei ocelli, e forse più, avuto riguardo alla robustezza della pianta; purchè gli ultimi ocelli guardino al di fuori, ovvero uno a destra, e l'altro a sinistra; nè mai al didentro della pianta; acciocchè venendone da' medesimi ocelli nell'anno appresso le nuove sortite, vadano formando con bello, e buon'ordine, le rame che devono guarnire, e comporre la pianta.

Del modo d' allevare, potare, e pullire i Gelsi, finchè non avranno almeno quattordici, o quindici anni.

CAPITOLO V.

IL primo anno dopo piantati, governati, e potati i Gelsi, come si è detto nel Capitolo antecedente, si vadano a rivedere esattamente più volte ne' mesi d' Aprile, e Maggio, levandoli tutte le nuove sortite, a riserva di sole due per ramo, le più alte, e vicine all' estremità; purchè guardino al di fuori, ovvero a destra, e a sinistra, affinchè non si rincontrino, e principino subito l' estensione de' rami gradatamente aperti, e lontani dal grand' inconveniente della confusione.

Nè si consideri niente qualche piccola quantità di foglia, che potremmo conseguire ne' primi due, o tre anni, quando si deve valutar molto l' utile, e il vantaggio grande di bene, e anticipatamente allevarli; praticandosi diversamente da quelli, che aspettano a potare i Gelsi, così teneri e piccoli, alla metà di Maggio, e forse più tardi, per l' ingordigia di pochissima foglia; che a fare i conti giusti ridonda in pregiudizio notabilissimo delle piante. Si torni adunque per li primi due, o tre anni, a potarli nel mese di Novembre, e Dicembre, e più anticipatamente che sia possibile, praticandosi le medesime regole sopra descritte.

Passati poi due, o tre anni, ed essendo i Gelsi cresciuti, assodati, e fatti di una ragionevole complessione, si dia principio a coglierne il frutto, e nel medesimo tempo si potino ogni quattro, o cinque anni una volta, racconciando un poco tutt' i rami grossi, e tal volta se ne levino intieramente qualcheduni, pigliando regola dalla gagliardezza, o debolezza de' medesimi Gelsi. Non lasciando però mai di rivederli ogni anno subito colta, o come altri dicono, brucata la foglia, levando tutte le sortite che avessero patito, storte, e rotte disavvedutamente nell' atto di cogliere la foglia con poca avvedutezza, e alla peggio; e altre che sordassero molto al di dentro, incrocciandosi, e facendovi della confusione; levando ancora le più deboli in tutti quei luoghi, dove ne fossero venute più del bisogno,

spuntando tutte quelle, che si lasciano, alla lunghezza di tre, o quattro palmi, che questo pure dipende dalla robustezza, o debolezza, ciò che non si chiama propriamente potare, ma pulire, e disimbarazzare. S'avverta che questa operazione sia fatta per mezzo di persone pratiche, ch'abbiano ferri buoni, e taglienti, e così si vada successivamente seguitando, finchè i Gelsi non avranno compiuti quattordici, o quindici anni; ed essendo allora molto più grossi, robusti, e di buona complessione, si pratichi nel potarli ciò che vado dicendo nel seguente Capitolo.

CAPITOLO IV.

Del modo di potare i Gelsi, passata che avranno l'età di quattordici, o quindici anni, fino che durano.

QUando i Gelsi avranno passata l'età di quattordici, o quindici anni, si potino ogni sette, otto, e forse più anni una volta, diradando, e raccorciando tutti i rami grossi: e l'anno dopo subito colta la foglia, si taglino tutte le ramette, o per meglio dire Vermene piccole, e sottili, che non servono ad altro che a far dell'imbarazzo, e della confusione, e pregiudicare alle rame buone, e maestre. Queste sole si lascino in aggiustata quantità, secondo la robustezza della pianta, ch'essendo gagliarda, se ne lascino lei, sette, e forse otto; se mediocre, quattro, o cinque, e se debole, tre, o quattro per ogni ramo grosso; non potendosi neppure in questo fare una ricetta; mentr'è necessario dipendere dalla robustezza della pianta, e dalla quantità de' rami. Si spuntino poi subito le suddette Vermene alla lunghezza di tre, o quattro palmi, avuto riguardo anche in questo allo stato della pianta.

Passando poi all'anno susseguente, al solito dopo colta la foglia, si dia un'occhiata a tutte le rame, che furon lasciate l'anno già scorso, tagliando tutte quelle che si vedono essersi mantenute piccole, lasciando l'altre di maggior forza, e complessione. Ne si lasci d'osservare esattamente, che sopra di queste rame ne faranno sortite molte Vermene su all'estremità, delle quali si taglino tutte le piccole e miserabili, lasciando sola-



solamente le principali, e buone (potendosi in certa maniera arbitrate) non spuntandole, massime alle piante robuste e gagliarde, lasciando poi operare alla natura per sette, otto, e più anni; tenendoli ogni anno dopo colta la foglia netti e puliti da tutte le rame inferme, secche, e rotte disavvedutamente, ed altre che minacciassero della confusione, e di volere scomporre, e alterare l'equilibrio del nutrimento, nel bell'ordine delle rame, usurpandone la maggior parte in pregiudizio dell'altre; queste ancora si tagliano per mantenerle tutte agguagliate, e in un medesimo stato di robustezza, e grossezza.

Passando poi avanti col tempo, sette, otto, e più anni, come sopra s'è detto, e vedendosi le rame cominciare a prosciugarsi, e dare un certo sicuro contrassegno di essere stracche; e la foglia una simile dimostrazione, essendo troppo piccola, e per così dire, imbarbata; allora siamo sicuri che il Gelfo ha più rame di quel che sia capace d'alimentare, e sostenere bravamente la sua facoltà vegetativa; allora bisogna subito venire alla risoluzione di poterlo, ridurlo, e riconcentrarlo; diradandoli e accorciandoli i rami grossi, detti Branchemadri, dond' ebbero origine l'altre rame più piccole; e vedremo subito, che da quelle tagliature ne sortiranno Vermene bellissime, e dopo il primo anno produrranno foglia veramente bella, e reale: contrassegno sicuro del vero rimedio e provvedimento. Ciò che dovremo successivamente praticare ogni sette, otto, e più anni, e quando i rami daranno i divisati loro soliti contrassegni d'essere illanguiditi e stracchi, sino che dureranno i Gelfi. Nè mai si faccia, come usano in alcuni paesi, che tagliano interamente tutte le rame un anno sì, e l'altro no: cosa che non serve ad altro che perchè il primo anno dopo potati fanno sempre la foglia cattiva, ch'è quanto dire troppo tenera, e tralciosa, ed il secondo in maggior copia, e passabilmente buona; laddove tenuti, e potati, come sopra ho detto, passato il primo anno, fanno sempre la foglia di tutta perfezione, e in maggior quantità.

TRATTATO DEGLI ULIVI

*Del modo, e tempo di far Vivaj, o conservatoj
d'Ulivi, e prima di quelli di Uovoli,
o Puppole.*

CAPITOLO PRIMO.

I Modi di fare i Vivaj d'Ulivi da trapiantare nelle Coltivazioni, sono ordinariamente tre, cioè di Uovoli, di tami d'Ulivo, e d'Ulivastrelli salvatici, che nascono da' nocciuoli dell'Ulive.

Per fare i Vivaj di Uovoli, o sieno Puppole, si scelgano in primo luogo gli Ulivi grossi, gagliardi, e di buona razza, e prima che comincino a muovere, si stacchino li Uovoli dal piede delle loro ceppaje in questa maniera. Si scalzino gli Ulivi, allontanando tutta la terra dalle loro ceppaje, e si vada tanto al fondo, che si cominci a vedere l'origine delle barbe grosse, nè si passi più avanti; e in quei luoghi, dove si vede il legname della ceppaja, scabroso, gonfiato, e rilevato di una figura quasi simile agl'occhi delle canne, qui vi appunto con somma diligenza si facchino li Uovoli, in modo che non si sbuccino; servendosi dell'accetta tagliente, o scalpello col taglio rotondo, facendo meno piaga che sia possibile. Quest'operazione riesce benissimo fatta, mentre si scalzano, e si governano gli Ulivi, ovvero quando vi si lavora all'intorno, in tempo che non sieno in azione; non perchè in questa stagione gli Ulivi patiscano, e li Uovoli non sieno buoni; ma perchè è quasi impossibile di potere evitare che gli Uovoli, e le ceppaje non si sbuccino. E resti ognun persuaso che le piante non patiscono niente, mentre sieno grosse, e non le ne stacchino più di due, o tre per pianta per una volta tanto, lontani uno dall'altro; e non si levino dal dosso delle barbe grosse, ma dalle ceppaje che restino più alte. In secondo luogo si scelgano de' pedali d'Ulivi vecchi, e cadenti, sempre di buona razza, purchè non sieno illan-

illanguiditi, sbarbandoli affatto per levarne tutti li Uovoli buoni; quali si purghino, e si puliscano benissimo da tutte le stigliature, e scheggiature, e da tutto il legname cattivo, e imperfetto, che si conosce dal non essere intieramente bianco.

Gli Ulivi più fruttiferi, migliori, e di buona razza, secondo me, sono gl' Infiantoi, o come altri dicono Pendaoli, o Corregiuoli, che fanno benissimo in tutte le terre capaci d'Ulivi, ma in paragone degl' altri fanno pochissimi Uovoli. Gli Ulivi di questa razza si guariniscono naturalmente di maggior quantità di rame, e da legno, e da frutto; fanno più Olive, più belle, e più grosse, e queste fanno più olio, e molto migliore di tutte l'altre; fruttano quasi ogn'anno, benchè in questo dipendano dal modo di coltivarli, governarli, e potarli saviamente.

Fatti, purgati, e accomodati li Uovoli, come sopra s'è detto, se occorresse conservarli qualche tempo, prima di piantarli in Vivaio, si mettano distesi uno appresso all' altro in qualche luogo di terra leggierosa, e sottile, còprendoli in modo che non possano sentire nè il ghiaccio, nè l'alcuiatore; e venuto il tempo di piantarli, si cavino, e imbrattati al solito si piantino nel Vivaio, preparato con tutte le medesime regole, dette per il Vivaio de' Gelsetti da trapiantare, in distanza di quattro, o cinque palmi, lontani per tutt' i versi, uno dall' altro. In quanto al tempo di piantarli si faccia più anticipatamente che sia possibile, cominciando dal principio del mese di Dicembre fino a tutto il mese di Marzo, e forse alla metà d' Aprile, sempre in tempo che la terra non sia bagnata più del bisogno, governandoli con mezzo stajo di concime per ciascheduno veramente smalcito, trito, e sostanzioso; indi si coprano per l'altezza di tre, o quattro dita di terra di qualità leggierosa e sottile; ovvero si praticchi di coprirla colla rena, affinchè le pioggie non l'induriscano, e non faccia sopra la corteccia, come fanno le terre un poco forti; di maniera che quando ne fortiscano i desiderati Germogli, possano farlo più facilmente senza nessuna sorta d'ostacoli. Spuntati che saranno fuori della terra, e cresciuti di lunghezza, e grossezza capace di poter distinguere i buoni da' cattivi, allora subito con temperino taglierne, e con non or-

dinaria diligenza si tagliano tutti i più inferiori fra le due terre, lasciandone solamente per Uovolo, sempre il migliore, e più bello. Si zappi poi, o si farchi di quando in quando tutto il terreno del vivajo, tenendolo sempre netto e pulito dall'erbe, avendo l'occhio a quelle piccole, e tenere piante per non danneggiarle, nè smuoverli la terra all'intorno; e se nella State passassero l'asciuttore, s'adacquino sempre che ne hanno bisogno per il primo anno almeno; quando il vivajo non sia molto lontano dal comodo dell'acqua; e intanto si metta ad ogni Uovolo una canna; dove si fermi su dritto il Germoglio con legatura, fattali gentilmente con ginefire, o fila d'erba.

Passando poi il primo mese di Novembre dopo piantati, si vanghi andantemente tutto il vivajo; con questo riguardo, che vicino agli Uovali si smuova leggermente la superficie della terra, allontanandola un poco all'intorno, tanto che vi sia adito da poterli governare con una piccola porzioncella di concime sostanzioso, quale si copra benissimo colla medesima terra; tagliando loro tutte i nuovi germogli, che si trovassero fra le due terre, e tutt'i rametti troppo grossi sopra il fusto del germoglio lasciato per farne ulivo; al quale si metta una nuova canna, o paletto dritto, fermandovi l'ulivo con una, o più legature, fatteli saviamente co' suoi fardellini di fieno, acciò non sia nè sbattuto, nè agitato da' Venti, e possa crescere su dritto con tutto il comodo.

Nè si lasci di riconoscerli spesso nell'anno susseguente, massime ne' mesi di Maggio, Giugno, e Luglio, tenendolo continuamente disciplinati col taglio, levandoli tutt'i rametti troppo grossi, e capaci di pigliare la natura del Pedale, e usurparli quella della vera cima; nè mai si levino tutt'i rametti piccoli, lasciando il fusto spogliato affatto, nudo, e bruco. Ma per non dilungarmi troppo a parlare del taglio sopra di queste piccole piante, mi restringo a dir solamente, che avuto riguardo allo stato della pianta, si scelgano, e si destino subito due soli rami, per cominciarla a comporre, tagliando immediatamente tutt'i gl'altri, che potessero essere di pregiudizio a' predetti due rami; sopra de' quali si veda d'equilibrare il nutrimento in maniera, che uno non ingrossi mai più dell'altro, ciò che si fa tagliando, e raccorciando dottamente il ramo più gaglia-

gagliardo, lasciando tal quale il più debole, e così si seguì successivamente a tenerli ben custoditi, e ben guidati col taglio; ed assicuro ognuno, che in termine di tre anni s'avranno vivaj d'Ulivi bellissimi, tutti uguali, e di grossezza capaci di trapiantarli nelle coltivazioni, ove dovranno stare per sempre.

CAPITOLO II.

Del modo, e tempo di far Vivaj, o sieno conservatoj di rami d'Ulivo.

PER questa sorta di Vivaj ancora conviene scegliere, e preparare il terreno, come si è detto per li Gelini selvatici da innestare, praticandosi le medesime regole, tanto per il modo di coltivarlo, che per la distanza de' rami; con questa differenza, che le buche si facciano un poco più profonde di quelle che servono per i gelsetti; affinchè la parte superiore del ramo resti coperta dalla superficie della terra per l'altezza di tre, o quattro dita.

Parlando adesso della qualità de' rami che devono servire per uso del vivajo, è necessario in primo luogo, che sieno di buona razza, e grossi quanto un manico di vanga per lo meno; giovani, vegeti, e robusti, con buccia grossa, liscia, e sugosa, nè mai languidi, nè prosciugati; poichè nella stagione di Primavera, mediante il caldo, nell'atto di risvegliarsi, e rarefarsi la loro facoltà vegetativa, possano facilmente e colla dovuta celerità fortirne barbe, e germogli. In quanto alla lunghezza, si facciano di un palmo, o poco più, col dovuto riguardo di segarli vicino a qualche occhietto, o rilevatura di buccia, di dove comincia più facilmente la pullulazione delle barbe, e de' germogli. Io dico che si segghino, e non si taglino, perchè la sega facilita moltissimo il lavoro, e manda male meno ramo, nè si corre pericolo di lacerare, nè allentare la buccia: non essendo altrimenti vero, che la sega abbrucci, o avveleni il legname, come da molti vien falsamente asserito. Segati adunque che sieno i rami, come sopra si è detto, si coprano le segature d' ambe le parti con mestura da Innessi, perchè restino difesi dalla troppa umidità, e restino più sani. Così impacciati s'imbrattino da per tutto col solito sterco vac-
cino,

cino, o pecorino sfatto con acqua acciocchè abbracci-
no, e sì uniscano più facilmente colla terra, facendo-
sela subito propria: Indi si mettano nelle buche dritti
per il loro verso naturale, ricalzandoli bene all' intor-
no col concime, e colla terra mescolata, senza pigliar-
la neppure colle mani, per non levarli la sua attività;
coprendoli l' estremità con terra sottile, e renosa per l'
altezza di tre, o quattro dita, acciò i germogli possan-
no nascere più facilmente. Per questi viva! di rami di
Ulivo si ricercano terre sottili, leggierose, molto at-
tive, e pronte, nè mai troppo esposte alla Tramonta-
na; e si devono piantare i rami ne' mesi di Novem-
bre, e Dicembre, e non indugiare per quanto sia
possibile a' mesi di Marzo, e d' Aprile, acciocchè ab-
biano maggior tempo di potersi disporre alla vegetazio-
ne, e non si travagli mai la terra, quando fosse trop-
po bagnata.

Sappiasi in oltre, che per questi viva! è quasi neces-
sario, che il divelto, o come altri dicono, lo scasso,
sia fatto al fondo più d' un braccio, mettendovi sotto
dapper tutto molta stipa, o frasche minute: cosa che
riesce con facilità, mentre si praticchi di fare prima una
fossa larga braccio uno e mezzo, e stipata che sia nel me-
desimo tempo cominciarne un' altra, e colla terra di que-
sta si riempia la prima; di sorte che proseguendo il divel-
to, sempre una fossa si scavi, e l' altra, messavi la stipa
si riempia. Quello modo di fare, serve per tenere la ter-
ra più sana, più sollevata, e risvegliata, e in maggio-
re e continua attività: e conseguentemente più pronta
a tirar fuori le barbe, e far pullulare i virgulti; ciò
ch' è necessario in tutte le piante, ma particolarmente
ne' rami d' Ulivo segati in corti pezzi, come sopra,
che non hanno disposizione veruna; nè vi è nessuna for-
za d' avviamento di barbe; di modo che per assicurarli, e a-
verli anticipati, tutto dipende dall' arte, e dalle diligenze.

Ne' mesi di Giugno, Luglio, e Agosto subito dopo
piantati, si riconolcono tutti esattamente, lasciando
solamente un germoglio per ramo, il più bello, e me-
glio situato, al quale si metta provvisionalmente una
piccola canna, levandovi su dritto con fila d' erba il
medesimo germoglio; zappando, e purgando il terrego
del Vivaio da tutte l' erbe.

Giunti poi al mese di Novembre, si scalzino larga-
mente,

mente, e si governino alquanto lontano col solito concime trito, e sostanzioso, mescolando colla terra; e nel medesimo tempo non si lasci di riconoscere, le ve ne fossero qualcheduni addormentati, che non avessero fatte niune getate; questi si riconoscono; tagliandoli in più luoghi un poco la buccia col temperino; o trovati sani, e già disposti alla vegetazione per l'anno venturo, il che si conosce dalla loro buccia gonfiata, lana, verde al di fuori, e bianca al di dentro: questi adunque si lascino stare, si governino, e si riccalzino come gli altri; ricoprendo la loro testa colla terra, come quando furon piantati: e vedremo, che nella Primavera faranno subito gettate bellissime. Se poi al contrario avessero la buccia di cattivo colore, ch'è quanto dire annerita, livida, bigia, e perduta la sua natural vivezza, si rigettino tosto senza altre osservazioni, ripiantandoveli di nuovo. Il simile si faccia ad altri che non avessero fatti che piccoli, e minuti getti di cattivo colore, derivati dal solo effetto della rarefazione. Governati adunque, e riconosciuti tutti, come si è detto, si metta ad ogni germoglio una buona canna, ovvero un piccolo, e dritto paletto, dove si fermi con legatura non molto serrata, e con tutte le considerazioni dette per quelli del Vivato de' Uovoli: ciò che può servire di regola generale a tutte le piante tenere di qualsivoglia Vivajo.

Nè si lasci di riconoscerli spesso ne' mesi di Maggio, Giugno, e Luglio, tenendo di quando in quando zappato, e purgato dall'erbe il terreno del vivajo, levandoli solamente i rametti troppo grossi, chiamati di falso legno, che venuti fossero per il dosso del fusto; lasciandovi tutti gli altri piccoli, che ajutano la circolazione, e chiamato in pro del medesimo fusto il nutrimento, acciò non resti troppo sottile, sproporzionato, e debilitato di forze, come accaderebbe, se si levassero tutti affatto. E dandoli l'accidente di qualche rametto di falso legno tanto ingrossato, che avesse pervertito il buon ordine della natura, e pregiudicato alla vera cima; questo mette conto tirarlo avanti, tagliando subito tutta la parte superiore; mentre si veda nel predetto ramo di falso legno migliore speranza di cavarne la vigorosa, e desiata pianta: come ho più volte praticato.

tiaro, e sempre con buonissimo esito, massimamente nelle piante di pochi anni, e quando i vigorosi rametti di falso legno andavano su dritti a cilindro. Ne si lasci di tenerli continuamente ben palati, e custoditi, ch'avremo in tre, o quattro anni Ulivi assai grossi, e belli, da trapiantarsi nelle coltivazioni.

Ma perchè gli Ulivi, che vengono dal Vivajo fatto di rami, si guarniscono naturalmente di pochissime barbe, e talvolta da una sola parte; ond'è che si rende molto difficile, per non dire impossibile, di trasportarli dal Vivajo alla coltivazione senza che si scompagini e si disfaccia il pane della terra; e di quì è che molti Ulivi, cavati da questa sorta di vivaj, si perdono affatto, ed altri s'attaccano così debolmente, che non risolvono quasi mai nulla; perciò io dico che si lascino in Vivajo per sei, o sette anni, che tanto basta perchè vengano più grossi di un manico di vanga, ed allora si cavino senza il solito pane, con tutte le barbe staccate affatto dalla terra, tagliandoli il fusto all'altezza di due braccia e mezzo in circa, piantandoli nella coltivazione appunto come se fossero piantoni, cavati dalle cepaje degli Ulivi vecchi; e faremo sicuri, che si attacchino tutti francamente, coll'esito di buonissima riuscita; e in tanto si perde molto meno tempo a trasportarli dal Vivajo alla coltivazione, e ci liberiamo dalla spesa, e dall'imbarazzo de' pali, che occorrono necessariamente, quando si piantano piccoli collo rame.

CAPITOLO III.

Del modo, e tempo di fare i Vivaj, o sieno Conservatoj d'Ulivastrelli selvatici, che nascono dal seme.

PER questa sorta di Vivaj ancora è necessario, che il terreno sia della qualità e positura degl'altri, e però mi riporto a quanto sopra ho detto ne' Capitoli primo, e secondo. Dico adunque che gli Ulivastrelli selvatici, che si vogliono mettere in Vivajo, si scelgano giovani, sani, e di buona forza; il che si conosce dall'esser grossi per lo meno come il dito piccolo di una mano d'uomo; con buccia liscia, verde, sugosa, e non profciugata, e sopra tutto, ch'abbiano delle barbe commodamente grosse, e non tutte piccole, e capillari, che

che sieno sane, e di buona forza: cosa che si conosce dal non essere muffite, annerrite, bigie, nè livide, ma colla buccia grossa, vegeta, e che nel didentro sieno di colore che tiri al bianco, e con piccola ceppaja, o barbicaja, che s'attaccano più facilmente, e fanno prove maggiori. Al contrario, gl'altri, che hanno tutte le barbe piccole, capillari, e grossa ceppaja, v'è da dubitare, che non sieno di seme; ma fortiti dalle barbe, o ceppaje d'altri Ulivi grossi, quali fanno sempre meno prove, e s'attaccano più difficilmente di quelli, che nascono veramente dal seme, che sono i noccioli dell'Ulive; e per chi non ha tutta la pratica, non è molto facile a distinguere gli uni dagli altri; ond'è che poi se ne vedono ne' Vivaï di quelli che fanno subito prove maravigliose, ed altri che restano sempre languidi e miserabili; dal che ne segue che i padroni, o per il troppo affetto che portano a quelle piante, ovvero (siami permesso il dirlo) per la poca cognizione che hanno, li trapiantano tutti nelle Coltrivazioni, facendo di grosse spese, colla speranza, ma falsa e mal fondata, di vederli presto crescere, e cavarne molto frutto; cosa che a mio giudizio è quasi affatto impossibile; perchè non ho mai veduto, per lo spazio di molti anni di pratica, che le piante per loro stesse languide, miserabili, prociugate e raffreddate nella loro vegetazione, facciano bella, nè buona riuscita; ma bensì l'hanno fatta quelle, che sino in Vivaio, da bel principio, diedero subito veri e sicuri contrasegni del loro essere sane, gagliarde, e di perfetta salute, il che si conosce dall'essere di buccia liscia, verdona, e gonfiata, e che non solo dalle cime, ma anche dal dosso delle loro rame, ne siano venute in quell'anno nuove e belle gettate: essendo questi verissimi, e sicuri contrasegni, che la sorgente, ch'è quanto dire le barbe, è intieramente sana, e ricca di nutrimento.

Trovati ch'avremo gli Ulivastrelli di seme, prima di piantarli nel Vivaio già preparato, si tagliano i loro fusti alla lunghezza di un palmo, compretaci tutta la barbicaja, sempre vicino ad un occhietto vegeto e rilevato, di dove possano più facilmente fortirne i germogli. Indi si riconoscano le barbe; ed essendovene delle rotte, sfigliate, o lacerate si tagli loro solamente tutto
il

il cattivo; levandosi tutte affatto alcune altre piccole e capillari, che sogliono essere intorno alla coronetta, cioè in luogo dove gli Ulivastrelli restavano a fior di terra; perchè lasciandole a quell'altezza, rubano queste l'alimento migliore all'altre buone, principali, e sotterranee, che alimentano, e mantengono tutto l'incremento alle piante; valutando io moltissimo l'ajutarle in tutto, e non permetter mai cosa che possa esserli di pregiudizio benchè minimo.

Preparati come sopra, s'imbrattino tutte le barbe, e si piantino subito nelle buche del Vivajo, messovi prima il solito concime, ricalzandoli in modo che l'estremità resti coperta per l'altezza di due dita di terra leggierola e sottile. In quanto al tempo di piantarli egli è dalla metà di Novembre, fino a tutto Marzo; ma è sempre meglio farlo più anticipatamente che sia possibile, e in tempo che la terra non sia bagnata più del bisogno. E caso che occorresse sbarbarli da' bolchi, o dal Vivajo di seme, qualche tempo prima di piantarli per farne anticipata la provvisione, si conservino nel medesimo modo, che si è detto per li Magliuoli, nel Capitolo quarto del trattato delle Viti.

Gli Ulivastrelli selvatici si possono avere in due maniere, con seminare le ossa spolpate, o noccioli nudi dell'Ulive ben mature, ch'abbiano la loro anima ben granita, soda, e perfetta, perchè altrimenti non nascono. Questi adunque si seminino nel mese di Marzo in terreno ben governato, che sia esposto a Mezzogiorno, fano, leggieroso, e sottile; adacquandoli nella State per lo meno due volte la settimana, acciò non patiscano l'asciuttore; tenendoli per tutto il Verno coperti colle stoje messe alte dalla parte di Mezzogiorno, e dall'altra tanto basse che tocchino la terra, acciò sieno riparati dal freddo, e dominati dal Sole, ed alla fine del mese di Novembre comincino a nascere, e seguitino per tutto Marzo; e in due anni vengono tanto grossi da poterli trapiantare in Vivajo, dove si devono innestare. Ma perchè questa maniera d'avere gli Ulivastrelli selvatici porta seco del perdimento di tempo, e il più delle volte pochi ne nascono, per mancanza di diligenze, e per non aver saputo scegliere i noccioli, e il terreno a proposito; perciò le persone poco costanti
con

con facilità si nojano, e s'abbandonano, parendo loro loro una cosa incerta, ovvero troppo lunga aspettare nove, o dieci mesi prima che comincino a nascere. Ma per maggior sicurezza d'ognuno, è da sapersi, come io ne ho seminati molte volte in più luoghi, e sempre con buonissimo esito, massime in Pistoja il 1734. me ne nacquero sopra a 2500. e il 1736. passarono tre migliaja, de' quali ne feci due Vivai bellissimi. Ma chi non vuol l'imbarazzo di seminarli, e custodirli per due anni così piccolini, pensi anticipatamente a farne cercare per li boschi, ed in altri luoghi, ove restano gli ossetti dell'Ulive cadute, ovvero spolpate dagli Uccelli, dove nascono da per loro, e in tre, o quattro anni diventano grossi, e capaci di potersi trapiantare nel Vivajo per innestarli. Ma è vero che questi non sono tanto buoni, come quelli seminati, che vengono i soli due anni, e molto più guarniti di buone barbe, per tutti i versi. Io non vorrei che l'avere avvertito a cercare gli Ulivastrelli selvatici per li boschi, fosse appreso per uno scherzo, ovvero per una cosa detta di più, quando è verissimo, che ne' Paesi caldi, dove sono qualità d'Ulivetti, come nel Pisano, nel Lucchese, verso Pietrasanta, ed in altri luoghi simili alle sponde della marina, non solo per li boschi, ma per li medesimi Ulivetti, si trovano molti Ulivastrelli grossi, e di buona forza, essendovi persone che li cercano, e li vendono a quattro, o cinque lire il cento, buoni e capaci di piantarsi subito in Vivajo per innestareli.

Dopo piantati gli Ulivastrelli si vadano a riconoscere gli ultimi giorni del mese di Maggio, ovvero primi di Giugno; ciò che dipende dal clima, dalla Stagione, e dalla qualità della terra più o meno pronta e attiva, zappando minutamente il Terreno, e purgandolo dall'erbe; e di mano in mano che si zappa, o si vangha vicino agli Ulivastrelli, s'allontani loro un poco la terra all'intorno; e nel medesimo tempo si osservino esattamente tutte le nuove sortite di germogli, lasciando solamente uno per Ulivastrello il più robusto, e meglio situato, tagliando diligentemente tutti gli altri con temperino, o forbicette taglienti; tenendo nella State, e nell'Autunno continuamente zappato,

to, e pulito il terreno dall'erbe, e i medesimi Ulivastrelli dalle nuove sortite; affinchè queste non sieno nè pur di minimo pregiudizio al germoglio lasciato per innestare, levandoli parte del nutrimento, e in tanto s'abbia l'occhio al medesimo germoglio, tagliando diligentemente tutt'i piccoli ramettini, che si vedono nascere per il dosso del fusto, per l'altezza d'un palmo almeno sopra la terra, acciò venga più liscio, e pulito che sia possibile, per poterlo innestare giù abbasso. Io dico che s'innestino bassi, e vicino alla terra, poichè trapiantati nelle coltivazioni sarebbe bene che l'innestatura restasse coperta dalla superficie del suolo, mentre vado persuaso che non possa esser che bene il pensare, e antivedere più che sia possibile, perchè se mai accadesero disgrazie, che Dio non voglia, d'armate di Soldati che tagliassero, e abbruciassero gli Ulivi, ovvero seccassero, com'è accaduto più volte, per il troppo rigore del freddo, possino rimettere sul domestico: essendovi anche da considerare che il selvatico cresce assai meno del domestico, perlocchè non vengono mai i fusti uniti, nè di grossezza uguale, quando l'innestatura resta scoperta, e alza dalla superficie della terra.

Il primo mese di Novembre dopo piantati in Vivajo si vanghi, o si zappi andantemente tutto il terreno, e nel medesimo tempo si scalzino diligentemente gli Ulivastrelli, tagliandoli tutte le barberelle piccole, e capillari, che avessero gettate su altre a fior di terra, governandoli col solito concime bene smaltito, trito, e sostanzioso.

Passando poi all'ultima settimana del mese d'Aprile, ovvero alla prima di Maggio dell'anno dopo piantati, e governati, si comincino a innestare senza intervallo di tempo, come dirò in appresso.

Il più sicuro, e sbrigato modo d'innestare gli Ulivastrelli selvatici, si è quando son piccoli del secondo anno, dopo piantati in Vivajo, e a bocciuolo, o come altri dicono bucinello, cannello, o anelletto. Si scelgano adunque le mazzette dagli Ulivi domestici di buona razza, venute nell'anno avanti dalle cime delle ramerobuste, e gagliarde, ch'abbiano gli occhi vicini uno all'altro, grossi, e rilevati; alle quali si stacchi con diligenza tutta la buccia, facendosi dalla parte della cima, indi si tagli tutta all'intorno fra un occhio, e l'altro

altro per cavarne solamente gl' Anelletti, già staccati, e allentati; accostando poi la mazzetta, con più anelletti accanto al fusto selvatico da innestarsi, per vedere se le grossezze sieno uguali, coll' avvertenza, che la mazzetta domestica resti un poco più piccola del fusto selvatico, perchè mentre si fanno gl' innesti, gli anelletti s' allargano, facendosi più grandi di quel che naturalmente stavano sopra il dosso della loro mazzetta, nè mai si cavino prima che dal canto nostro non sian in certa maniera assicurati, che stiano bene, e vadano giusti nel fusto selvatico, acciocchè l' aria calda non abbia tempo d' asciugarli, e consumare, come accade facilmente, una certa piccola, e naturale umidità di nutrimento, che resta al di dentro della buccia, e facilita moltissimo l' attaccamento. Laddove cavati prima, e tenuti molto fra le mani all' aria scoperta, per provarli più volte sopra a diversi fusti selvatici, s' asciuga, e si consuma tutta l' umidità, originata da quel poco di nutrimento, quando non avvizziscano; e di què è talvolta che molti non s' attaccano. Non pigliandosi mai gli anelletti vicini al piè della mazzetta, dove gli occhi sono troppo piccoli, poco vegeti, e tanto imprigionati nella buccia, che sono quasi ciechi, quali benchè si attacchino francamente, non fanno mai sortite che sieno buone a nulla: perlocchè molti s' ingannano, mentre l' attribuiscono all' essersi attaccati malamente, ovvero alla debolezza delle piante.

Trovata la mazzetta domestica di grossezza uguale al fusto dell' Ulivastrello selvatico; questo si tagli poco sopra al luogo, dove si vuole innestare, e allentata la buccia dal fusto, divisa e spaccata in due, o tre parti, si cavi tosto con diligenza il destinato anelletto dalla mazza domestica, in modo che non venga fuori crepato, mettendolo subito sopra il diviso fusto selvatico, spingendolo con avvedutezza abbasso, tanto che non crepi, e abbracci giustamente il medesimo fusto; e in maniera che l' occhio migliore resti al di sopra della piegatura, caso che l' Ulivastrello fosse storto; poichè rimanendo al di sotto, in vece di correggere, si accrescerebbe il difetto. Nè si faccia mai questa operazione in giornate piovole, nè troppo ventose, nè pure sul mezzogiorno, quando fosse un gran caldo.

Venticinque o trenta giorni dopo innestati gli Ulivastrelli, si vadano a riconoscere esattamente, se aveilerò gettati, come necessariamente avranno fatto, nuovi germogli per il basso fusto selvatico, per cagione di quel gran taglio fatto sopra la loro testa, che ha ferrata la strada al nutrimento; quale volendosela fare di nuovo, fa immediatamente la sua prima azione verso l'occhio dell'innesto, mentre questo sia attaccato. Ma non essendo anche capace di ricevere tutta l'esuberanza della virtù vegetativa, che li tramandano le barbe, non può esser di meno, che non si facciano dell'apertura, per mezzo di nuovi germogli, sopra il fusto selvatico, che impediscano che l'occhio dell'innesto non getti subito il desiderato, e anticipato virgulto con quella prontezza, e con quella forza, e attività che fa, quando il fusto selvatico è tenuto pulito da tutte le nuove sortite; e perciò si levino, non solo più presto che sia possibile, ma subito che si vedono nascere, per obbligare tutto il nutrimento a favore dell'occhio dell'innesto, affinchè ne venga sollecitamente un germoglio di robustezza capace di ricevere, e impiegare validamente in se stesso tutto il nutrimento, che li tramandano le barbe. Cresciuto poi alla lunghezza di un palmo incirca, si osservi, se dal medesimo occhio domestico ne fosser venuti altri, come suole accadere; questi si levino con temperino tagliente, lasciandovi solamente il primo, e se per il dosso di questo si vedessero rametti, capaci di farsi troppo grossi, e pervertire il bell'ordine della natura, si taglino subito intieramente; non essendo altrimenti vero ciò che da molti viene falsamente asserito, che il tagliare il primo, secondo, e terz'anno sopra le piante giovani, sia un grosso male, adducendo per ragione, da loro sognata, che le piante restano nojate, infallidite, e avvelenate dal ferro, e in tanto non vedono queste buone genti, che la vera noja, fastidio, e veleno sono i troppi rami, che fino da principio si lasciano sopra le piante giovani, dove cominciano subito a fare della confusione, e alterare tutto il buon ordine con pregiudizio notabilissimo delle medesime piante. Né mai si taglino tutti affatto gli altri rametti piccoli, venuti per il dosso del fusto secondo il buon ordine; perchè questi facilitano la circolazione del medesimo fusto, senza

senza esser di minimo pregiudizio alla vera cima, e all' altre rame destinate a componer la pianta, zappando, o vangando più volte il terreno, tenendolo sempre netto, e pulito dall'erbe.

Innestati, e stradati gli Ulivi, come sopra si è detto, si metta a ciascheduno provvisionalmente una piccola canna, fermandovi l'innesto con legatura non molto serrata, fatta in luogo proprio con ginestre, o fila d'erba; perchè essendo così piccoli, teneri, e delicati; non hanno altro bisogno che d'esser guidati dritti, per poter crescere con maggior comodo. Cresciuti poi tanto che possano essere troppo agitati, e danneggiati dai venti, si metta loro una grossa canna; ovvero un piccolo paletto, fermandovi l'Ulivo con legatura di salcio fatta propriamente colli suoi fardellini di fieno, acciò non restino sbucciati, nè danneggiati per nessun verso. Facendoli tutte queste diligenze, che non richiedono tanto perdimento di tempo, nè sono così dispendiose, quanto subito a prima vista vengono considerate, io assicuro ognuno, che il terzo anno dopo innestati, avremo Ulivi bellissimi, e di grossezza capaci di trapiantarli nelle coltivazioni.

Questa sorta d'Ulivi innestati sopra gli Ulivastrelli di seme, coltivati e custoditi che sieno in Vivajo, come sopra si è detto, sono molto migliori, e più fruttiferi degli Ulivi d'Uovoli, e di rami d'Ulivo; perchè quelli di seme si piantano colle loro barbe, e cominciano subito ad agire, e disporsi alla vegetazione: per lo contrario quelli d'Uovoli, e di rami, per essere, dirò così, piccoli membri, o particelle di puro legno, recise e separate affatto dalle loro piante, senza niente d'avviamento di barbe, non possono cominciare ad agire che nell'atto della loro rarefazione, risvegliata dal caldo della stagione: dovendo in un tempo stesso fortirne e germogli, e radici, per attrarne dalla terra il nutrimento, acciò possano crescere i loro virgulti; ond'è che a mio giudizio, è molto difficile, che possano farlo andantemente colla dovuta celerità; mentre non possono per allora avere le loro barbe grosse, e capaci di mandarli il dovuto necessario alimento; e cominciando poi a farsi sentire il caldo della stagione, e asciugarsi la terra, con pregiudizio notabilissimo di quelle piccole, tenere, e delicate barberelle, che non

hanno forza, nè sussistenza capace di resistere al caldo, e all'asciuttore della State; e intanto si soffermano, e restano d'agire, addormentandosi, e prosciugandosi i loro germogli, quando non avvizziscono; di manieracchè si rendono affatto incapaci di ricevere tutta l'esuberanza, e pienezza di nutrimento, che in avvenire possono tramandarli le barbe; quando per mezzo delle nuove stagioni propizie, e favorevoli, con maggiore energia e attività principiano una nuova azione; e di qui è che gli Ulivi d'Uovoli, e di rami, sono di gran lunga inferiori a quelli di seme, che furon piantati in Vivajo colle loro barbe selvatiche già grossarelle, e assodate, e cominciano tosto ad agire colla dovuta vivezza, e celerità, senz'essere con tanta facilità trattenuta la loro azione dal caldo, e dall'asciuttore della State; perchè le barbe selvatiche anche di quell'età, hanno sussistenza capace di resistere molto più all'ingiurie della stagione di quel che possano mai fare le delicate, e meno attive barbe degli Uovoli, e de' rami; ond'è che gli Ulivastrelli di seme sono sempre capaci di migliore, più sicura, e anticipata riuscita, di quel che sieno gli altri, quando anche i Vivaj abbiano ugualmente il comodo dell'acqua. E chi avesse difficoltà di crederlo, si contenti di farne la prova con tutte le regole sopra descritte, e l'assicuro che resterà facilmente persuaso, e convinto.

CAPITOLO IV.

Del modo, e delle regole più sicure per mettere all'ordine il terreno per la Coltivazione degli Ulivi.

Primieramente è da sapersi, che nelle Terre bizzarre, forti, e capaci di ritenere in se stesse della soverchia umidità, sarà cosa molto utile, e vantaggiosa il farvi le fosse anticipatamente un anno prima di piantarvi gli Ulivi; lasciandole poi così aperte, esposte al caldo della State, ed al ghiaccio dell'Inverno, acciò le terre possano ricuoersi, sritolarsi, e mutar natura, facendosi più attive, e pronte ad abbracciar le piante, e inviar le barbe. E se il caso, e la necessità portassero, che se ne dovessero piantare qualcheduni in questa sorta di terre subito fatte le fosse, vi si brucino prima de' fasci di stipa, o altro legname, almeno in quei
luo-

luoghi, dove si devono mettere le piante degli Ulivi; perchè anche in questa maniera si rendono quelle terre alquanto più pronte, e trattabili; aggiugnendo quattro, o sei Corbelli di terra scelta per Ulivo, messali intorno alle barbe.

In quanto poi alle maniere di preparare, e mettere all'ordine il terreno, queste sono molte e diverse; perchè un paese richiede la Coltivazione in una maniera, e l'altro in un'altra tutta differente; oltre all'esserli molti che in un medesimo spazio di terreno, vogliono piantarvi Ulivi, Viti, Frutti, ec. e altri, che vogliono solamente Ulivi; di modo che non si può descrivere una certa regola generale, che non patisca veruna eccezione; mentre è necessario riguardare alla qualità, e positura del suolo, al Clima del paese, e al genio delle persone: cosa ch'è difficile, per non dire impossibile a descriversi in maniera che tutti ne possano restare soddisfatti e contenti. Ma tuttavolta voglio far animo, e dir qualche cosa come di passaggio per quello riguarda il dar ordine alle Coltivazioni, e alle piante, acciò facciano la loro dovuta simetria; e dir poi al dilungo ciò che vada praticato nel piantare gli Ulivi, per averli anticipatamente grossi, robusti, e fruttiferi.

Per quello adunque che riguarda l'ordine di coltivare il terreno, quando sia in positura che pianeggi, si facciano subito le fosse, fonde due braccia, e larghe assai più, col' avvertenza che l'acque, tanto superficiali, che sotterranee, abbiano felicemente il dovuto esito, facendovi le sue fogne, e sopra la solita stipa, o altro legname verde, e grossolano; e si pratichino tutte le medesime regole già dette per le fosse da Magliuoli nel Capitolo terzo, del Trattato delle Viti.

In quanto alla lontananza delle fosse una dall'altra, quando si voglia far solamente Uliveto senza nessuna altra sorta di piante, si facciano in distanza di dieci, undici, e fino in dodici braccia, e più e meno secondo la qualità del suolo; ch'essendo sostanzioso, e grasso si facciano più lontane che se fossero magro, e di poco corpo. Piantandosi poi gli Ulivi lontani uno dall'altro appunto quanto è la distanza delle fosse, e in modo che facciamo la quincunee, ch'è quanto dire sterzati, dritti, e affilati per tutti i versi; nè mai si lasci di piantare nelle medesime fosse i Magliuoli a due filari, in distanza di quattro, o

cinque palmi l'uno dall'altro; poichè questi cominciano a fruttare, rendono in breve tempo la spesa della coltivazione, e costano pochissimo, mentre si piantano nelle medesime fosse fatte per uso degli Ulivi.

Se poi volessimo le Coltivazioni d'Ulivi, frutti, viti, ec. si facciano le fosse nella medesima distanza, piantandone una tutta Ulivi e viti, e l'altra tutta di viti, e frutti; ovvero si piantino andatamente in tutte le fosse un Ulivo, e un frutto con i suoi Magliuoli, mettendo da per tutto le bronche, in mezzo agli Ulivi ed a frutti, tirandovi sopra due viti per ciascheduna, con l'avvertenza, che s'accordini, e facciano simetria gli Ulivi con i frutti, ed i frutti con gli Ulivi; e similmente le bronche messe col medesimo ordine faranno la dovuta comparsa e dimostrazione ordinata: cosa che per chi ha genio alla Campagna, e senso alla Coltivazione, è capace di darli molto piacere, oltre all'utile considerabile, ch'è certissimo. E non volendo servirsi delle bronche, si piantino in loro luogo degli Oppi, che in questo modo ci liberiamo dalla spesa, e dal perdimento di tempo, ch'è necessario per accomodarle, e rinnovarle di quando in quando.

Si facciano poi sopra il suolo della coltivazione ne' luoghi più bassi le sue fosse, per uso delle acque superficiali, e meglio, e più stabili sono le sassaiole; come altri dicono acquidocci di sassi murati a secco, che li fanno benissimo, e con poca spesa alcuni Contadini dello Stato Fiorentino, e di Parma.

Queste fosse o acquidocci debbono servire per ricevere, e portar via l'acque piovane, e superficiali, che quivi scendono dal suolo della Coltivazione, e dall'altra campareccia superiore; e tal volta raccattano, e portano via anche parte dell'acque sotterranee, quando le fogne delle fosse si fanno sboccare nei predetti acquidocci, mentre questi sieno più profondi delle fogne delle fosse. Ma perchè non è sempre possibile che tutte le fogne delle fosse, che si fanno in una coltivazione grandiosa, ch'abbia la superficie del suolo discomposta e d'ineguale adjacenza, abbiano l'esito dell'acque sotterranee per mezzo de' suddetti acquidocci; di qui è che molte volte ci troviamo in necessità di dover fare qualche fossa traversa, o laterale con fogna più

più grande dell'altre, che pigli tutte le sboccature, e testate delle fogne dell'altre fosse della coltivazione; facendo, che queste commettano e si uniscano bene insieme con la fogna della fossa maestra, (chiamandola così, mentre questa deve ricevere, e portare via tutte l'acque sotterranee, che vi scendono dalle fogne di molte altre fosse) in modo che tutte l'acque sotterranee possano avere felicemente il loro esito, acciò il terreno della coltivazione si renda maggiormente sano, quando di sua natura non fosse.

Nè si lascino di fare in più luoghi della coltivazione i suoi muretti a secco, ovvero cigli di piallacci, o come altri dicono piote di terra erbata, in distanza di più e meno braccia, laddove porta il bisogno, per mettere il suolo più che sia possibile in piana positura; acciocchè il corso dell'acque delle grosse piogge, che pur troppo vengono, non porti via quella quantità di terra, che sarebbe senz' i suddetti muretti, o cigli: e riguardo all'altre coltivazioni, che si fanno in luoghi più montuosi, e situati in positura molto scoscesa, necessariamente vi si debbono fare ad ogni corto tratto di terreno i suoi rattegni, con muretti o cigli come sopra, mettendo dentro a cialcheduno il suo filare d'Ulivi, Viti, e Frutti, e nel mezzo delle branie, o come altri dicono piane, o campetti, che restano tra un ratteagno e l'altro, vi si mettono i suoi filari d'Ulivi con le medesime regole, e col medesimo ordine detto di sopra; con la differenza, che ne' luoghi molto scoscesi i filari degli Ulivi, che si mettono ne' mezzi dei campetti, si possono piantare a buche o sieno formelle, larghe tre braccia per ogni verso, e due profonde; facendo a tutte le sue piccole fossette con le sue fogne, che piglino tutto il fondo della buca, e abbiano comunicazione, e si uniscano con le fogne delle fosse, che restano dentro ai cigli, acciò possano andarsene felicemente l'acque sotterranee; quando non si vogliano fare andatamente le fosse, come consiglio, che vadano da una parte all'altra, essendo questa la regola migliore e più sicura; e volendoli fare solamente Oliveto senza nessuna altra sorta di piante, si facciano i cigli, e muretti un poco più vicini uno all'altro, mettendo in mezzo delle branie i suoi filari d'Ulivi piantati a fosse, o a buche, secondo che si sti-

ma più proprio: facendo sotto a' cigli le sue piccole fosse, che vadano da una parte e l'altra della coltivazione con alcuni denti, o rattegni, che raccattino e portino via non solo l'acque sotterranee, ma anche le superficiali, che vi scendono dalla camperaccia superiore. In somma non si cominci mai una coltivazione, se prima non siamo assicurati, che sia benissimo digerita da persone capaci e intendenti, ch'abbiano prese le dovute misure per i ripartimenti, e destinati i muri, e le fosse maestre per gli scoli dell'acque, con altre osservazioni necessarie, che facilitano il lavoro, scemano la spesa, e riescono più stabili, più belle, e meglio fatte. Non essendo così facile di pigliarne subito il suo verso, perchè anche in questo si ricerca della cognizione, e della pratica.

CAPITOLO V.

Del modo, e tempo di svelle gli Ulivi dal Vivaio, e piantarli nelle Coltivazioni.

Preparato ch'avremo il terreno con tutte le regole già dette nel Capitolo antecedente, e appropriato di qualche tempo avanti il concime di Cavallo biadato, di pecorino, lupini corti, cuojazzoli, e sieno ritagli di Calzolari, sterco di Colombi, e di Polli già mescolato, ridotto trito, e tutto d'una medesima qualità: Dovendosi piantare gli Ulivi in terreno leggiero, sottile, asciutto, ed in paese non molto freddo, si comincino a piantare subito passata la metà di Novembre, fino alla metà di Dicembre, tanto quelli di Vivaio, che i piantoni, che si staccano dalle ceppale degli Ulivi vecchj. Laddove ne' terreni forti, e capaci di ritenere in se stessi della soverchia umidità, non si piantino prima, che al principio del mese di Marzo fino a tutto Aprile.

Parlandosi adesso degli Ulivi di Vivaio, e del modo di scavarli, e portarli nelle Coltivazioni, si osservino, e si scelgano primieramente tutti que' buoni, e senza nessuna imperfezione, che si conoscono dalla vivezza della loro buccia, liscia verdone, e molto sugola, e dalle gagliarde, robuste, e nuove sortite venute in quell'anno. E perchè non tutti fanno distinguere i buoni da' cattivi, non si lasci d'andare, o mandare persona pratica nel Vivaio a farne la scelta, segnandoli con una lega-

legatura di falcio, e tagliandoli tutte le rame superflue; affinchè andando i Contradini a scavarli, non piglino errore; che in questa maniera siamo assicurati di piantarli tutti robusti, vegeti, di buona forza, (mentre non gli succedano disgrazie accidentali) e capaci di farsi presto grossi e fruttiferi.

Parlando adesso del modo di sbarbare gli Ulivi del Vivaio, si cominci questa faccenda colla vanga, e si termini colla zappa; scavando la terra largamente all' intorno dell' Ulivo, in maniera che vi resti sempre attaccato il suo pane, e si vada più al fondo di quel che sieno le barbe, acciò restino bene isolate, levandosi affatto tutta la terra di sopra, fino al piano delle barbe per alleggerirlo di peso. Legandosi poi il medesimo pane strettamente con due, o tre legature di falci, mesfavi prima intorno della paglia, o fieno, acciò stia unito, e non si scompagini; indi si smuova, alzandolo con diligenza, tanto che vi possa entrar sotto una pezza di tela grossa, come sarebbe un canevaccio grande, ovvero un grembiale ordinario da Donna, tirandolo da tutte le parti all' insù, in maniera che ferri, e stringa il pane dell' Ulivo, segnando i quattro canti della predetta tela strettamente al fusto dell' Ulivo, affinchè la terra non si possa allargare, nè staccare dalle barbe. Avendolo adunque così legato e fasciato, per portarlo con più facilità dal Vivaio alla Coltivazione, si metta in una corba, o sia corbello fatto apposta largo di sponda; ponendolo poi sopra le spalle d' un Uomo, raccomandandoli che lo porti colla dovuta diligenza: e se il viaggio fosse tanto lungo che bisognasse riposare, avverta nel posarlo, e ripigliarlo sopra le spalle, di farlo in maniera che non si stacchi la terra dalle barbe.

Arrivato che sia nella Coltivazione, si metta subito nella fossa già preparata in questa maniera. Si faccia sopra la stipa, o macchia già messa in detta fossa, un grosso suolo di terra scelta, leggierosa, pronta, e attiva; mettendovi sopra per lo meno un grosso corbello del solito concime sostanzioso, mescolandolo colla medesima terra; allargando poi quella mescolanza in maniera che faccia la figura d' una buca, dove si metta diligentemente l' Ulivo nella medesima positura, e aria che stava nel Vivaio, e in modo che non resti al fondo

do più di due terzi, o tre quarti di braccio nelle terre sottili ed asciutte, considerato il calo, e avvallamento per la ragione della pipa, e della terra smossa, e sollevata: che nelle terre forti, grosse e atte a ritenere in le stesse della soverchia umidità non si passi mai due terzi di braccio e forse meno, ciò che deve servire di regola generale per tutte l'altre qualità d'Ulivi. Levandoli poi la fasciatura, e legatura, e addirittura che sia, s'accosti senza pigliare la divisa mescolanza di terra, e concime, in maniera che il pane resti benissimo dappertutto circondato, e coperto. Nè si lasci di scalfare più che sia possibile d'ambe le parti della fossa, acciò le barbe abbiano maggior adito di potere agire, e allargarsi. Praticandosi tutte queste diligenze, che secondo me, sono facilissime, è certo, che siamo subito assicurati, non solo che s'attaccino tutti francamente; ma che facciano altresì ugualmente prove maravigliose, come n'hanno fatte molte migliaia da me piantati in diversi luoghi della Toscana. Indi si metta a ciascheduno Ulivo un dritto, e grosso, palo, lontano circa a un palmo dal suo fusto, acciò non possa scompaginare il pane, nè lacerare le barbe, nell'atto di ficcarlo in terra; e legato su alto, e accostati e serrati insieme il palo, e l'Ulivo, agitati poi da Venti, trovando coll'altro resistenza, vengono a contrastare, e stanno molto più forti, che se il palo fosse messo appunto al piè dell'Ulivo; perchè in questa maniera il palo con tutta facilità s'unisce, e s'addatta subito a piegarli per tutt' i versi, che l'Ulivo lo chiama; e intanto non s'urtano, nè si stropicciano insieme, in maniera che la soddezza, e rustichezza del palo colle legature de' falci lacerino, e guastino la scorza con pregiudizio notabilissimo dell'Ulivo; perchè la buccia è la parte più nobile, e delicata, ch'abbiano le piante, e perciò vien chiamata comunemente il loro cuore; e senza di questa non possono nè vivere, nè crescere, nè produrre rami, nè foglie, nè fiori, nè frutti; e però si faccia tutto il possibile perchè non sia mai nè lacerata, nè guasta in nessuna maniera. Accomodato che sia il palo, come sopra si è detto, vi si fermi l'Ulivo con una legatura vicina alle rami colli suoi fardellini di fieno; ovvero si faccia passare il falcio fra una rama, e l'altra,

altra, facendo una sola legatura alla più grossa, secondo che porta il bisogno, e il caso. Nè mai si pigliano, e si ferrino insieme più rame, come ho veduto praticare in alcuni luoghi, che pigliano col falcio la maggior parte delle rame, ferrandole addosso al palo in maniera che quelle piante pajono granate; onde ne segue, che i poveri Ulivi così maltrattati non possono stendersi, nè allargare le rame; e così quelle legature in vece di farli il dovuto beneficio, li cagionano un grosso male.

CAPITOLO VI.

Del modo, e del tempo di piantare gli Ulivi, detti Piantoni, che si staccano dalle Ceppaje, o barbicaje degli Ulivi grossi.

ANche per questa sorte d'Ulivi, chiamati piantoni, si debbono preparare le fosse colle medesime regole accennate nel Capitolo quarto; e trattandosi di piantarli nelle terre leggiere, e di poco corpo, si faccia, dalla metà di Novembre fino alla metà di Dicembre; e nelle terre umide e forti, dal principio di Marzo fino a tutto Aprile, scegliendo i Piantoni giovani d'otto, nove, e fino in dieci anni, grossi come il collo della mano d'Uomo, sin' all'altezza di tre braccia, di buona razza, e di buona forza; ch'è quanto dire non languidi, indeboliti, nè prosciugati; perchè essendo così impoveriti di nutrimento, in vece d'andare avanti e seguitare a crescere, raffreddansi, e tornano indietro; e non è altrimenti vero, che il concime sia capace di farli rin vigorire; perchè oramai sono assicurato dalla pratica e dall'esperienza di trentacinque e più anni, che non solo gli Ulivi, ma anche l'altre piante languide, e prosciugate, restano sempre piccole, miserabili, e poco fruttifere. Si staccino adunque dalle loro Ceppaje, o barbicaje per mezzo di Persone pratiche, acciò lo facciano destramente, senza guastare le medesime Ceppaje, nè farli altro male, e senza lacerare, nè staccare la buccia a' Piantoni.

Riguardo poi al modo di piantarli, è da sapersi, che si debbono segare in maniera che il loro fusto resti più di due braccia alto sopra la terra; cosa che non si può appun-

appunto limitare, perchè non tutti hanno i fusti alti, dritti, lisci, e puliti da poterli segare alla medesima lunghezza: dimodochè bisogna dipendere dalla qualità de' fusti, e segarli più lunghi, o più corti dove il bisogno richiede, sempre col dovuto riguardo, che vicino alla legatura vi resti qualche occhietto, o sia utricolo, già disposto alla vegezazione per la sortita d'un nuovo rampollo, da servirsene per cominciare a formare l'osatura delle rame. Dopo segate a quella lunghezza creduta propria, si purghino meglio che sia possibile le loro Ceppaje da tutto il legname, stillato, cattivo, e imperfetto, tagliandoli tutte le barbarelle piccole e capillari, senza lacerarli, nè guastarli la buccia; servendosi dell' Accetta, o del Pennato colla cresta; e molto meglio sono alcuni scalpelli col manico di legno forte, ch'abbia il taglio rotondo fatto a lunetta, quasi a forza di un piccolo mazzuolo, facilitano moltissimo, e fanno il lavoro con somma pulizia, senza lacerazione di buccia, e senza stigliature, e scheggiature di legname. In somma questi scalpelli sono strumenti propriissimi, non solo per questa faccenda, ma per fare anche tagli di grossi rami, sopra gli Ulivi, ed altri Alberi, dovendosi tagliare tra un ramo, e l'altro, dove per la molteplicità, e per la confusione de' medesimi rami non possiamo servirci de' Pennati, dell' Accette, nè delle Seghe. Preparati come sopra, si copra la legatura con mestura da innesti, imbrattandoli col solito sterco tutta la barbicaja, indi si piantino nella medesima positura e aria, che stavano sopra le loro Ceppaje; e in maniera che non restino al fondo più di due terzi, o tre quarti di braccio, considerato l'abbassamento che fanno subito alle prime piogge dopo piantati, per la ragione della stipa, e della terra smossa, e sollevata di fresco, governandolo col solito concime sostanzioso nella quantità d'un grosso corbello per ciascheduno, mescolato colla terra scelta, accostandola, e ferrandola da per tutto al piantone, senza pigliarla, nè batterla; ed assicuro ognuno che avremo più anticipatamente Ulivi bellissimi, senza la spesa de' pali, e senza il perdimento di tempo di doverli tenere per cinque, o sei anni continuamente legati, e riveduti, meglio difesi dalle bestie, e da' Venti, più facili ad allevarsi bene; ed il terz'anno dopo piantati cominciano a fruttare, e fanno

fanno benissimo in tutt' i paesi, e in tutte le terre capaci d' Ulivi. Ma è altresì verissimo, che ne' paesi caldi, come nel Pisano, nel Lucchese, verso Pietrasanta, e in altri luoghi simili alle sponde della marina, dove sono quantità d' Oliveti bellissimi, che rendono meraviglia a chiunque li vede; dico che in questi luoghi per la ragione del beneficio dell' aria, e del vento zeffiro, molto propizio e favorevole a quelle piante, fanno assai meglio, e più presto; e per dirla giusta, non sarebbe loro di certo pregiudizio, quando non si praticassero esattamente tutte le diligenze sopra descritte; ma per non aprir la strada a qualche disordine, che pur troppo se ne vedono, massime in quel genere, s' imo bene di confermarmi, dicendo che si faccia il possibile per praticarle tutte colla maggior esattezza.

Per quelli poi che si trovano di fusto corto, storto, e scabroso, si seghino alla lunghezza di due terzi, o tre quarti di braccio, coprendo la legatura con mestura da innesti, purgando loro la Ceppaja da tutto il legname cattivo, e imperfetto, tagliandoli le solite barbe sottili, e capillari, e imbrattati che sieno, si piantino con tutte le regole, dette per quelli che si lasciano col fusto alto sopra la terra, avuto riguardo che l' estremità resti coperta per l' altezza di due dita di terra, mettendo a ciascheduno una cannuccia che serve di segnale; scassando più che sia possibile la fosta d' ambe le parti, acciò le barbe possano maggiormente allargarsi, e agire con più facilità, nè si faccia mai questa faccenda in tempo che la terra sia troppo bagnata. E se occorresse staccarli dalle loro piante qualche tempo prima di piantarli nelle coltivazioni, si conservino in qualche cantina, o stanza che non sia molto fredda, coperti affatto con l' arena; ovvero si sotterrino in luogo di terra leggiera, sottile, e facile a passare la superfluità dell' umido.

Io temerei di mancare, se non dicessi qualche cosa anche degli Ulivi, che si cavano da quei rami, che avanzando sopra le teste dei piantoni, ovvero si tagliano sopra gli Ulivi grossi nell' atto di piantarli, e si piantano immediatamente nelle coltivazioni. Questi si seghino alla lunghezza di due terzi, o tre quarti di braccio, coprendo ambedue le segature con mistura da innesti, e imbrattati che sieno da per tutto col solito sterco, si
piani.

piantino per dritto nelle fosse della coltivazione con tutte le medesime regole dette per li piantoni bassi , che rimangono sotto la terra ; col dovuto riguardo , che il mezzo delle fosse resti un palmo più basso di quel che sia la superficie della sompareccia adjacente ; perchè anche da questa sorta di rami , piantati subito nelle coltivazioni , benchè facciano un poco più adagio , se ne cavano Ulivi assai belli ; in particolare alle sponde della marina , ove sono terre molto grasse , leggiere , pronte , e attive , e per la ragione della dolcezza dell'aria , e del Clima propriissimo per queste piante : al contrario ne' Paesi di terre forti , pigre , e d'aria un poco fredda , non si vede che facciano una così bella riuscita .

E quì nell'atto istesso ch'io spiego , ed insegno il vero modo di scalzare questa sorta d'Ulivi , venuti dai rami , messi in Vivajo , dichiaro anche il vero , e necessario agire de' medesimi (ciò che debbe adattarsi a tutt' i viventi virgulti , ed è regola generale , generalissima , però si tenga bene a memoria , e se ne faccia quel capitale e conto che merita .) Ne lascio di dire per compimento di questo Capitolo l'ulo migliore de' due , o come altri vogliono , tre modi praticabili per trapiantarli poi nelle coltivazioni , disapprovando il terzo come dirò .

Adunque dopo cinque , o sei anni , che avremo tenuti con le divisate regole quei rami nel Vivajo ; quando il migliore , e lo scelto rampollo , sortito dall'occhio più vegeto , sarà cresciuto all' altezza di più di tre braccia , e grosso quanto un manico di vanga , gli si cavi con diligenza dal piede in giusta lontananza la terra , per ben riguardarli le giovani e tenere barbe , e troveremo , che il fucchio , o l' accagliato liquore , che fanno , intero , e fecondo , ma pigro esisteva nel suo centro , ch'è quanto dire negli Utricoli , o Valvole , cotto poi dal caldo sotterraneo , reso sciolto , spiritoso , e sottile col mezzo della propria rarefazione , e suscitata molizie , aveva già dal primo anno nel tempo istesso , e forse prima , come credo , scoppiato dall' Utricolo , o valvola in giù verso il terreno , producendo fino d' allora le barbe , nel medesimo modo , che all' insù per l' occhietto già disposto alla vegetazione , mediante l' ambiente caldo della Primavera , produsse rag-

grup

gruppati i primi rampolli, quasi sempre pieni, ubertosi, e traboccanti alle cime per li sifoni, o fistole interne, spinti da quel provvido, e in maggior copia rattivato liquore, somministratoli vie più dalle barbe, succhiando questo a prò loro continuamente lo spirito vivificante della terra, madre feconda di detto spirito; dimodochè in giù ritornando il medesimo sugo, o liquore, non già per li soliti sifoni, o fistole, ma per l'interna buccia, irrigando, e riempiendo compiutamente tutte le Valvole, Utricoli, ed occhietti, concorrendovi moltissimo il nutrimento, mediante l'altra circolazione trasversale, che si dà in tutt' i vegetabili, s' andran sempre accrescendo di forza, di grandezza, di fecondità, e di completezione il rampollo, e le barbe, di dove ha tutta l' origine la robustezza, e ingrossatura del tronco, e di tutt' i rami, e barbe della pianta; e intanto si formano ogn' anno nuovi fogli, o rezzes, che questa pure cresce sempre di mole, e resta intieramente composta di tutto il numero delle sue dovute cartilagini. Da tutto ciò si ricava, che l' essenziale e miglior parte degli alberi, sia la sola buccia, massime quella interna dalla parte del legno, che immediatamente lo tocca, con l' ajuto della quale in soitanza restan vive, e vegete con le sue barbe le piante, s' accresce il tronco, s' ingrossano i rami, si fecondano gli Utricoli, gli occhietti mandan fuori i germogli; e questi finalmente producono e fronde, e fiori, e frutti, e rendono insieme con l' utile, vaghezza, e piacere.

Ma è tempo oramai di ritornare all' uso migliore promesso de' sopraddeiti Ulivi, venuti da rami messi in vivaio, lodando più d' ogn' altro quello di segnarli in modo che i loro fusti restino alti più di due braccia sopra la terra, nè disapprovando l' altro di segarli alla lunghezza di due terzi, o tre quarti di braccio, e piantarli nel medesimo modo, che si è detto de' piantoni bassi senza barbe: non concorrendo nel terzo modo, che alcuni praticano di piantare questa sorta d' Ulivi con tutte, o parte delle loro rami.

Tornando agli Ulivi piantati col fusto basso, e coperto con la terra, venuto il tempo, che cominciano a mettere, le li smuova, e sollevi leggermente la terra all' intorno, acciò la corteccia fatta, per ragione delle grosse pioggie, non impedisca l' uscita delle nuove
for.

fortite; e passando più avanti con la stagione, si riconoschino esattamente; e trovando ch'abbiano fatte molte gettate, se ne lascino due, o al più tre per Ulivo, ugualmente ripartite in giusta lontananza all'intorno del fusto, nè mai tutte da una parte, con l'idea di scegliere poi la migliore per stabilirvi la pianta, e intanto ci assicuriamo dell'anticipato vantaggio per le medesime gettate, che si fanno tosto di miglior robustezza, e complessione, e capaci di validamente pigliare tutto il nutrimento, che vi ascende dalle barbe, mediante la capacità, e dilatazione fatta a tempo, a' loro canali grandi ed ubertosi.

CAPITOLO VII.

Del modo di coltivare, e allevare gli Ulivi il primo anno dopo piantati.

AL principio del primo mese di Novembre, dopo piantati gli Ulivi di Vivajo con le loro rame, si scaizino largamente fino alle barbe maestre, tagliandoli tutte l'altre, che si vedono troppo alte per il fusto scalzato, governandoli con un grosso corbello di concime sostanzioso per ciascheduno, e nel medesimo tempo si osservi, se il palo avesse bisogno d'essere risegato, ovvero cavato, e rimesso dall'altra parte, e si faccia, ricalzandolo poi senza pigliarli, nè calpestarli la terra all'intorno. Nè si lasci d'osservare, se vi fossero fortite in quell'anno rame troppo gagliarde, e mal situate, che andassero al di dentro, e minacciassero della confusione, quali si taglino immediatamente; affinchè solamente le buone piglino il nutrimento, e seguino felicemente la loro estensione, non solo per una bella, e regolata figura ma anche per darci più anticipatamente il dovuto frutto: e trovandone qualcheduni attaccati debolmente, che non promettono certa buona riuscita, si cavino, e si rigettino immediatamente, osservando di dove possa esser derivata la cagione, per potervi opportunamente rimediare, acciò le nuove piante, che ivi si rimettono, non cadano nell'istesso male.

Per li piantoni, lasciati col fusto alto sopra la terra, dopo scalzati, e governati come sopra, si scalzino a ciascheduno due soli rami i più robusti, meglio situati,
e vi-

e vicini all'estremità, uno da una parte, e l'altro dall'altra; tagliando sopra di questi tutt'i rametti troppo grossi, che andassero al di dentro; e venuti fossero contro il buon ordine naturale per cominciare della confusione, e portar via inutilmente la maggior parte del nutrimento alla loro madrebranca, e impedire, che non vada avanti la vera cima, per cominciare e formare a poco a poco, e a misura della forza tutta l'estensione delle rame necessarie alla pianta; e caso che non fossero state diradate, e lasciate le fortite dell'anno avanti, come bene spesso succede, se ne lascino sole due, le più robuste e meglio situate, purchè una guardi a destra, e l'altra a sinistra del fusto, ovvero nella miglior distanza possibile, tagliando subito tutte l'altre con coltellino tagliente; acciocchè il nutrimento, e la virtù si staccia tosto migliore strada nelle due uniche rame, destinate per componer la pianta, affinchè non abbiano tempo di prosciugarli, e raffreddarsi nella loro vegetazione, come accaderebbe se non si levassero a tempo tutte l'altre superflue; poichè levandole, come molti praticano, due o tre anni dopo, ne nasce, che le due, che restano destinate per la pianta, non sieno di quella robustezza e complessione, ch'è veramente necessaria per ricevere, e impiegare andantemente in se stesse tutto il nutrimento, e intanto se ne perde molto inutilmente per mezzo di nuovi germogli, che di sovente fortiscono non solo alla testa, ma anche per il dosso del basso fusto, fino che le medesime rame non sieno fatte capaci di riceverlo immediatamente. E perchè in tutte le coltivazioni per diversi accidenti restano quasi sempre delle piante, che non gettano nulla affatto, ed altre gettano pochissimo e con poco segno di perfetta salute: nell'atto adunque di scalzare, e governare gli Ulivi, si riconoscano e gli uni, e gli altri; e trovando che i primi abbiano patito, cosa che si conosce tagliandoli un poco di buccia, e trovandola di colore scuro, ovvero gialliccia, o bigia; si rigettino tosto senz'altre osservazioni, e in tantochè si scavi la fossa lasciandola così aperta, per ripiantarvi a suo tempo l'Ulivo. Ma se trovassimo il piantone, con tuttocchè non abbia gettato nulla affatto, come qualche volta succede, buono, e già disposto alla vegetazione, il che si conosce dalla buccia piena, gonfia-

ta, verdone al di fuori, e con certe piccole e bianche rilevature, che pare sian per crepare e aprirsi, e al di dentro sana, bianca, e sugola; in questo caso siamo sicuri, ch'è in una specie di letargo, che ha addormentata a tempo la sua facoltà vegetativa, come accade più spesso negli Agrumi nuovamente piantati: trovandosene alcuni, che stanno due, o tre anni quasi senza far niente, ed in fine risvegliati fanno prove maravigliose. Ma non è qui la mia questione, perchè i Piantoni d'Ulivo in poco più d'un anno mostrano certamente la loro vita, o la loro morte; ond'è che trovato il Piantone sano, buono, e addormentato, si governi, e si ricalzi con la medesima terra, mettendoli appresso una cannuccia o mazzetta, che serva di segnale, trattandosi di quelli piantati bassi senza fusto sopra la terra, tornandolo poi a rivedere nella stagione di Primavera, smovendoli al solito la terra all'intorno, siamo sicuri, che farà anticipatamente gettate bellissime.

In quanto poi a' secondi, che non hanno fatti che piccoli e minuti getti di cattivo colore, questi si rigettino subito senza farne nessun capitale; non essendo d'ordinario quei miserabili e falsi getti, che veri contrasegni d'una cattiva pianta, che non ha niente agito, ma derivati dal solo effetto della rarefazione.

Parlando adesso in generale dei Piantoni tagliati corti, e Piantoni colla testa coperta dalla terra, si scalzino, tagliando loro tutte le nuove barbe venute troppo alte per il frutto scalzato, governandoli, e ricalzandoli questi ancora, come sopra si è detto per quelli di Vivaio, ec. lasciandoli solamente due germogli, uno il più robusto, e meglio situato, e l'altro dalla parte opposta, benchè debole, e miserabile; e caso che questo ancora fosse robusto, e gagliardo, si spunti all'altezza di mezzo braccio in circa; nè mai si lascino ambedue dalla medesima parte, e molto meno da un medesimo occhio, e non essendovene che molto vicini, se ne lasci solamente uno, sempre il più bello, e meglio situato. Io dico, che, quando è possibile, si lascino due germogli, uno da una parte, e l'altro dall'altra, con animo, che il più robusto, e meglio situato debba servire per farne l'Ulivo, e l'altro semplicemente per facilitare la circolazione, e chiamare il nutrimento anche da quella parte, per mantenerla viva; perchè altri-

men-

menti resta abbandonata dalla natura, e facilmente s'asciuga, secca, e talvolta si contamina, andando immediatamente tutto il nutrimento dalla parte del germoglio, cominciando molto più basso per linea obliqua ad abbandonare affatto la parte opposta. Nè si lasci d'osservare se sopra il fusto del germoglio maestro, destinato per farne Ulivo, vi fossero rametti troppo grossi, venuti contro il buon ordine, capaci di pigliare la natura del pedale, e usurparsi quella della vera cima; questi si taglino subito, lasciando tutti gli altri piccoli, venuti secondo il buon ordine, che sono molto utili, e profittevoli al medesimo fusto, facendolo anticipatamente ingrossare con la sua dovuta proporzione, perchè servono solamente d'incentivo, e chiamano il nutrimento in prò del medesimo fusto. Laddove levandoli tutti, come ho veduto praticare in molti luoghi, restano i fusti talmente brucati, indeboliti, e sproporzionati, che ci vogliono molti anni prima che ingrossino, e possono resistere a venti, e sostenersi senza pali; dimanieracchè ogn'uno vede ben chiaro, quanto è necessario, che questa operazione sia fatta per mezzo di persone pratiche, e di buona capacità; e intanto si metta a ciascheduno il suo dritto palo, dove si fermi l'Ulivo, con una, o due legature, fatteli accuratamente, con li suoi fardellini di fieno; acciò possino crescere col dovuto comodo senza essere storti, nè agitati da venti; e passato il secondo, o terzo anno, si tagli affatto il germoglio, lasciato dall'altra parte col solo fine di facilitare la circolazione, e chiamare il nutrimento.

CAPITOLO VIII.

Del modo di coltivare, e allevare gli Ulivi, finchè non saranno d'età di quattro, o cinque anni.

Parendomi oramai d'aver detto abbastanza nel Capitolo antecedente non solo per quello riguarda le stagioni, e il modo di governarli, palarli, e legarli; ma anche per lo stradanento da darli per mezzo del taglio il prim'anno dopo piantati; dirò adesso qualche cosa con la maggior brevità sopra ciò, che dovrà farsi finchè non saranno d'età di quattro, o cinque anni almeno.

Non si lasci adunque di rivederli sovente, mutando loro la legatura, e'l palo, bisognando, tenendoli sempre tagliate tutte le barbe, che fortiscono fra le due terre, ch'è quanto dire tanto alte, che possano essere danneggiate e dal caldo, e dal gelo: cosa che serve anche per tener sempre la pianta obbligata a far tutta la sua azione solamente con le barbe di fondo, che sono le principali, e buone, mentre restano lontane e dal caldo, e dal freddo, e dagli strumenti rusticali de' Contadini. Tenendoli continuamente riveduti, tagliando tutte le rame inutili, superflue, e dannose; lasciandovi solamente quelle da frutto, e da legno già destinate per comporre la pianta.

Il quarto anno dopo piantati, si scalzino largamente più al fondo di quello che sieno le barbe maestre, senza accostarsi al fusto dell'Ulivo, lasciandovi all'intorno il pane della terra; e messavi prima da per tutto della stipa in fondo; si governino di nuovo nel mese di Novembre, e non potendo in questo tempo, si faccia più anticipatamente che sia possibile, dando a ciascheduno due grossi corbelli di concime trito e sostanzioso, dove sarebbe molto bene, che vi fossero mescolati de' cuojazzuoli, o sieno ritagli di Calzola, che oltre all'esser molto spiritosi, hanno sussistenza capace di farsi sentire favorevoli alle piante per cinque, o sei anni. Intanto si ricalzino, disfaccendo prima il pane della terra lasciato intanto al fusto dell'Ulivo, tagliando al solito tutte le barbe, che si trovano troppo alte per il fusto scalzato; nè si lasci mai di rivederli almen due volte l'anno, una ne' mesi di Novembre e Dicembre; e l'altra di Maggio e Giugno, tagliando tutte le rame, che venute fossero in luoghi impropri per cominciare della confusione, e pregiudicare alle rame buone, e alterare il bell'ordine già cominciato; levando anche tutte l'altre minute, inferme, ed inutili; di modo che le piante restino sempre chiare ed aperte, e non lunghe, ferrate, e piene di confusione, come molte se ne vedono.

Io non dico, che ne' paesi dove sono quantità di grandi, e vassi Uliveti, simili alle selve, e alle boschiglie, si possano, e si debbano praticare tutte le regole, che dice il fu Monsù della Quintinyè nel suo celebre, e gran trattato del taglio degli alberi bassi e fruttiferi, ma dico altresì, che per lo meno si levino tutt'i rami

rami già indeboliti, e quasi consumati dalla stanchezza d'aver fruttato molti anni, ed altri abbandonati dalla natura, minuti, inutili, infermi, e morti affatto, che non servono ad altro, che per adombrare, e imbarazzare le piante, e in tanto ne segue, che le rame da frutto restano sempre più piccole, e miserabili fanno meno quantità d'Olive, e di peggior condizione, che non farebbero; se gli Ulivi fossero tenuti chiari, aperti, netti, e puliti da tanta moltitudine di branche superflue, inutili, inferme, e del tutto morte; come praticano saviamente in tutto il territorio Fiorentino, in alcuni luoghi del Senese, ed in altri dello Stato di Lucca dentro alle sei miglia.

Passati poi che saranno quattro, o cinque anni dopo piantati, e coltivati gli Ulivi, come sopra, vedremo con molto piacere, e soddisfazione, che non avranno più bisogno d'esser sostenuti da' pali, e cominceranno a rendere ogni anno una comoda e ragionevole quantità d'Olive, quali si colgano con le mani, verso la metà di Dicembre, e forse prima, che tanto basta perchè sieno ragionevolmente mature; poichè lasciandole molto tempo sopra di quelle giovani, e tenere piante, potrebbero esserli di qualche piccolo pregiudizio. Ed è da sapersi, che nel coglier l'ulive con le mani vi si ricerca della diligenza, onde si faccia per mezzo di persone pratiche, che non rompono, nè guastino le rame, nè le cime. Il simile, e molto peggio quando si sbattono con canne, o pertichelle, perchè gli Ulivi di quell'età così robusti, freschi, e gagliardi, hanno le cime delle loro rame tanto tenere, che ogni piccolo percussimento le rompe; essendo questo, a mio giudizio, un grosso male, massimamente nelle piante giovani.

CAPITOLO IX.

Del modo di coltivare gli Ulivi passata che abbiano l'età di quattro o cinque anni, fino che durano.

Finalmente per esser la pianta dell'Ulivo una cosa tanto riguardevole, e necessaria, primieramente per lo grand'utile, che se ne ricava, e secondariamente perchè senza il suo frutto difficilmente si potrebbe vivere, non lascerò di dire qualche cosa intorno a ciò,

che si deve fare, perchè gli Ulivi sieno più fruttiferi, e si conservino sempre robusti, e di buona forza. Non si lasci adunque di scalzarli largamente, e governarli ogni cinque, o sei anni, come ho detto nel Capitolo antecedente, essendo quello il più vero, e sicuro modo di secondarli, e mantenerli sempre con la dovuta robustezza: e volendoli governare con una scalzatura un poco più ristretta, senza mettervi sotto nè stipa, nè altro frascame, si faccia ogni tre anni sempre nel mese di Novembre o più anticipatamente che sia possibile. Nè si pratici mai nel governarli di fare una semplice scalzatura solamente vicina al piede, mettendo il concime grossolano, e non smaltito sopra le barbe grosse accanto al fusto; di dove, secondo me, è molto difficile, per non dire impossibile, che le dette barbe possano attrarne la sostanza e virtù, quando sia vero, com'è verissimo, che le barbe piglino la maggior parte del nutrimento dalle loro estremità, e d'altre barbe maestresse nate per il loro dosto, quali restano sempre lontane dal piè dell' Ulivo; e dal concime, che ivi si mette per governarlo; dimanieracchè questo modo di governare non può apportarli quel giovamento, e beneficio, che ne speriamo. O perchè dunque più tosto che governarli in questo modo, non si fa in lontananza aggiustata, e adattata alla grossezza della pianta? zappando la terra al fondo più di due palmi, mettendovi sotto spartitamente il concime, siano pur sicuri, che l'acque piovane penetrano nella terra, e portano al fondo, dove sono le barbe, la sostanza, e virtù del medesimo concime; e per minorare le spese, si possono pure governare gli Ulivi nel medesimo tempo, che si fanno le zappature, non solo negli Uliveti, dove si semina grano, ed altre robe, ma anche in quegli dove non si semina niente, e non ostante si zappano per il meno un anno sì, e l'altro no. Ma s'io fossi in paesi, dove fossero persone, che pigliassero il terreno degli Uliveti per seminarlo a metà, e forse a terzo, li darei volentierissimo, non solo per sfuggire la spesa delle zappature, e delle rimordature, o bene roncolature, che queste seconde dobbiamo farle necessariamente ogni anno: e fra l'unc e l'altre, per quelli che hanno quantità d'Uliveti, ascendono a qualche somma considerabile.

bile. E quel ch'è peggio, che gli Ulivi restano sempre maltrattati; perchè quando vi si semina, oltre al tener sempre pulito, e purgato il suolo da tutte l'erbaccie, spine, roghi, ec. che sfruttano molto la terra, i Contadini badano anche, che l'acque piovane ne portino via meno che sia possibile, ch'è cosa da considerarsi, e valutarli molto; e quel che forse è di non minore importanza, è, che i medesimi Contadini, non permettono quasi mai, che si vadano pecore, nè altri bestiami a pascolare, a riserva di poche volte l'anno nelle stagioni asciuttissime; perchè con quell'occasione le bestie calpestano in mala forma la terra, facendovi sopra una ben grossa e soda corteccia, che impedisce, che l'altra terra, che resta al di sotto, non possa godere, nè approfittarsi de' benigni influssi celesti, che sono le dolci piogge, le rugiade, e le guazze, molto propizie e favorevoli al terreno e alle piante. Il simile, e peggio è per le grosse piogge della State molto necessarie, e vantaggiose alle piante; e appena che cadono, in vece di penetrare nelle viscere della terra, e portare il dovuto sollievo alle barbe delle piante, se ne scorrono subito via, per non essere il suolo sciolto, sollevato, scabroso, e zoloso, ma appianato e indurito dal continuo calpestare, che vi hanno fatto le pecore, particolarmente in tempi di stagioni umide e piovose, che facilmente il terreno s'ammassa e si ferra molto insieme; essendovi anche il pregiudizio delle piante giovani, e basse, che restano sempre mangiate, e danneggiate dalle bestie; e di qui è ch'io non ho nessuna difficoltà a consigliare tutti quelli, che possiedono Uliveti, che facciano il possibile per tenerli lontane le Pecore. Non dico nulla delle Capre, perchè questa sorta d'animali, non solo infallidiscono, per non dire avvelenano le piante, col mortificarle; ma fanno loro del male con i piedi; e perciò io consiglio ogn'uno, che ha delle possessioni non solo in luoghi domestici, ma anche boschive, e selve vicine alla Città da poter far ritratto di Carbone, legna per il fuoco, pali, e cose simili, a tenerle lontane. Ma se trattiamo di boschive incomode, lontane dalle Città, e da' Paesi domestici e coltivati, dove non si possa fare ritratto veruno di carbone, di legna, nè di pali; si può dire, che

queste boschaglie sieno fatte quasi apposta per uso delle Capre.

Governati, e zappati che abbiamo gli Ulivi, come sopra, si ripuliscan ogni anno, tagliando almeno tutto il legname inutile, infermo, e morto, con questa precauzione di tener sempre più tagliati, ch'è quanto dire chiari, e con meno rame gli Ulivi, che sono in terreni leggieri, e poco sostanziosi, che quelli che sono in terreni forti e grassi; perch'è necessario addattare, e bilanciare la quantità e la lunghezza delle rame alla robustezza e forza della pianta. E finalmente non si permetta mai, che al piè degli Ulivi giovani, nè sopra le loro ceppaje, o barbicaje v'ingrossino polloni, o siano germogli col fine di farne piantoni, perchè pregiudicano moltissimo alle piante; e perciò si levino, strappandoli subito che si vedono nascere.

CAPITOLO X.

Del modo di tagliare gli Ulivi, se mai per il gran freddo seccassero: con la Storia di alcune straordinarie seccagioni di Ulivi, accadute in Toscana.

QUando io credeva d'aver terminato il discorso sopra gli Ulivi, ho fatte alcune riflessioni; ed ho stimato bene descrivere il modo, che dee praticarsi per tagliarli, in caso che mai per lo gran freddo si seccassero, che Dio non voglia. Ma perchè già si vede questo succedere qualche volta, come ne fanno chiara testimonianza le memorie di diversi autori, cioè del Molto Rev. Padre Ridolfo di S. Girolamo Ferrarese, Visitatore Generale de' Chierici Regolari delle Scuole Pie, nel suo Ragguaglio della Vita, martirio, e miracoli di S. Pantaleo Medico, a car. 79. di Giovanni Cambi Fiorentino, scritte intorno alle cose memorabili, accadute in Firenze dall'Anno 1480. fino al 1535. di Marco Bufato di Ravenna nel suo giardino d'Agricoltura, a carte 64. Cap. 107. Ecco le parole del Molto Reverendo Padre Ridolfo di S. Girolamo Ferrarese: *Correva l'Anno del Signore 1216. il decimo nono del Pontificato d'Innocenzo Terzo, allorchè nel mese di Gennaio così atroce riuscì l'Inverno, che non solamente gli alberi, e le Viti, per forza di freddo si seccarono in Italia, ma anche*

anche il fiume Pò divenne congelato fino dall' altezza di 15. cubiti : nè meno stupendo fu il caso occorso in quell' Anno medesimo li 2. febbrajo nel Territorio di Reggio; ove s' attaccò disgraziatamente il fuoco ad una certa casa; e mentre il tutto quale Etna, o Mongibello fumante ardeva, non restò illesa la Cantina. S' incenerirono le Botti, ma non si liquefecce punto il vino gelato, di cui erano ripiene, anzi in mezzo delle fiamme restò sì duro, è appreso, che non si potè rompere, o dissolvere se non a forza di gagliardi; e replicati colpi di accetta; come fede ne fanno il Sigonio, e lo Spondano, ne' loro annali. (*)

Ecco le parole di Giovanni Cambi. Ne' 15. Gennajo 1510. Cominciò a nevicare in Firenze, ed alzò un braccio; dimodochè non ti era in Firenze uomo sì vecchio, che mai rimirasse la più bella, ed alta neve di questa: passati alquanti dì di detta neve, venne una mattina una nebbia, e quella diacciava, ed appiccossi su gli alberi, come se fosse nevicato, e dipoi altresì nevicò un' altro giorno, e finì detto gran nevajo, quale non era stato mai maggiore in Firenze, nè sul suo Contado, disretto per fino a questi giorni, per scritture, che si trovassero, nè per uomo antico, che mai avesse udito dirlo altresì da nessuno suo antico: di che per la gran freddura, e neve durata ben 15 giorni, e quella nebbia, si tenne, che facesse seccare i Melaranci tutti, che non ne campò uno, o fossero coperti, o scoperti, e gli Ulivi, e gli Allori, e i Fichi, Romerini tutti in questi piani, non ne campò nessuno, ma per mostrare il Signore maggior segno, preservò i Lini, ed eziandio le lattughe bellissime; e questo segno si tenne, che venisse perchè nella Città di Firenze non si faceva giustizia, nè si raffrenavano le scelleratezze de' giovani.

Ecco le parole di Marco Buflato. Del grandissimo, e crudelissimo freddo, che ha dato l' aria alla terra, l' anno Santo 1600. sotto il Pontificato di Papa Clemente VIII. è stato bisefo, correvan due Lettere Dominicali B A, con crudelissimo freddo, ch' è stato più di Primavera, che non è stato la Invernata, con nevi alte poco meno di mezza lunghezza di persona, più di 40. giorni sono state sopra la terra, fece cadere muraglie, case, con mortalità di Famiglie, assai bestiami morti dal freddo, e dai coperti delle stalle caduteli addosso per il peso della neve; molti

(*) Sigon. de Regn. Ital. lib. 16. Spondan. An. Ch. 1216. n. 1

molto candelotti alle case a pericolo d'ammazzare delle persone: ancora in diversi luoghi, ha fatto rompere, e rovinare assai rami, e seccare in assai luoghi alberi: si sono seccati i corpi degli alberi fruttiferi, che a mio giudizio alcuni saranno quattro, o cinque anni a non far frutti: i quali alberi ch' hanno patito, sono Viti, Fichi, Ulivi, Cedri, Pomo-adamo, Limoni, Naranzi, Pomi granati, Noci, Sorbi, che sono dieci sorte d'alberi, e forse più che io non so, anche Melauri, Cipressi, Osmarini, Gismini; sterilità, cioè carestia di granella di formento, detto di grano, con leggio assai, vecchia, vena, e citrone accompagnato insieme col grano, per la mala disposizione della terra, la quale ha avuto dall'aria, come quella, che governa la terra, come ho veduto al capo 89. e al capo passato; ancora in alcuni luoghi fu carestia grandissima di vino, e olio, per essersi seccate le Viti, e Ulivi.

Dovremo pur troppo avere a memoria, e ricordarci di una seccagione d'Ulivi molto strepitosa, e quasi universale succeduta a i nostri tempi: ed è che era già passato il festo giorno di Gennaio dell'anno 1709. senza, che si fosse quasi niente provato il rigore dell'Inverno a causa delle continue pioggie, che cadevano, e del vento Scirocco, che quasi continuamente spirava; onde non essendo l'aria calda, ma tiepida, il nutrimento, e la virtù delle piante era anche in qualche parte rarefatta per il dosso delle medesime, e non anche tutta riconcetrata, attesa la continua umidità, e tiepidezza dell'aria, che mantennero quasi sempre il terreno, e le piante umide, e molli, com' erano appunto; quando sul principiare della sesta notte di Gennaio, cominciò a farsi gagliardamente sentire il vento Tramontana, o Rovajo, accompagnato da un rigidissimo freddo e gelo, per cui l'aria ben tosto raffreddossi, ed irrigidì, facendosi subito un fortissimo ghiaccio, che fermò, e gelò, l'acque di alcuni fiumi da una riva all'altra, e continuò per il primo, e secondo giorno in così fatta guisa la forza, e l'impeto del vento, che finalmente declinando a poco a poco fermossi. Cominciò subito a nevicare in tale abbondanza, che in pochissimo tempo si alzò ben molto la neve, e le rami di tutte le piante degli alberi erano affatto ricoperte;

ma finalmente parendo quasi che fosse terminato di nevicare, atteso che l'aria cominciò ad addolcirsi, speravasi, che la neve dovesse presto liquefarsi, perchè aveva già dato qualche segno d'essere inumidita per andarsene in acqua; ed appunto allora fu, che principiò a farsi sentire dalle parti occidentali un vento assai freddo, portando seco un'aria piena di grossa e folta nebbia, con una minuta e gelatissima neve, la quale depositandosi sopra degli alberi, s'attaccò, e ghiacciò fortissimo. E da questo assolutamente si crede, che venisse lo strepitoso seccamento degli Ulivi, e di molte altre piante di modocchè quasi chiaramente può dirsi esser stato questo un'effetto gagliardo dell'onnipotente mano di Dio, ed un grandissimo male per la nostra deliziosa, e bella Toscana.

Se mai si desse un caso simile, che gli Ulivi si seccassero, prima di venire alla risoluzione di tagliarli, si riconoscano esattamente tutti, pianta per pianta, e tutte quelle, che si trovano veramente seccate affatto, che si conoscono dalla loro buccia distaccata dal legno, che ha gettata una certa muffatellina di colore nericcio attaccata al di dentro della buccia; seguendo ciò non solo per il basso fusto, e pedale delle piante, ma molto più nelle rami alte, e lontane dal centro. Trovate che sieno veramente secche, si scavi la terra largamente all'intorno in modo, che tutte le barbicaje, o ceppaje restino bene isolate e scoperte per potervi lavorare comodamente con le scuri, o accette bene taglienti, affinchè taglino, e non scheggino, nè lacerino il legname; purgandole benissimo da tutto il cattivo, e imperfetto, che si conosce dal non essere intieramente bianco; e si taglino in maniera, che le barbicaje restino mezzo braccio almeno più basse dalla superficie del suolo. Nè mai si faccia come in molti luoghi fu praticato il 1709. che dopo seccati gli Ulivi, gli fecero tagliare senza che prima facessero le dovute necessarie considerazioni, e intanto furono tagliati alla peggio, più alti della superficie della terra, senza purgare, nè pulire le ceppaje dal legname cattivo, ed imperfetto; ed essendo poi risorti i polloni, si sono trovati troppo alti, e mal situati; onde n'è seguito, che molti sono periti affatto, ed altri illanguiditi, e abbandonati tal-

talmente dalla natura, che non sono stati buoni da nulla; ma per chi ne ha dubitato a tempo, e staccati dalle ceppaje dopo otto, nove, o dieci anni, che vale a dire, prima che cominciassero a prosciugarsi, e raffreddarsi nella loro vegetazione, e piantati nelle coltivazioni, certo che hanno fatta buonissima riuscita. Al contrario gli altri, che ostinatamente hanno preteso d'allevarli, e tirarli avanti per Ulivi da frutto, hanno veduto poi con dispiacere, alcuni andarsene affatto, ed altri ridursi in uno stato tanto miserabile, di non esser buoni nè pure per farne Piantoni, specialmente la maggior parte di quelli venuti sopra le ceppaje degli Ulivi vecchj, cattivi, e tagliati troppo alti. Ma se fossero stati tagliati sotto la terra, e purgate le ceppaje da tutto il legname cattivo, risorti che ne fossero i polloni, lasciati subito in numero tre o quattro, e più e meno, secondo la grandezza delle ceppaje, e governati, e ricalzati a tempo con la terra già scavata, sarebbero stati molto più stabili, e durevoli non solo per Ulivi da frutto, ma per Piantoni ancora.

Io non ho inteso di dire, che si dovessero tutti staccare dalle ceppaje per piantarli nelle coltivazioni, neppure che tutti sieno periti, o debbano patire, o ridursi in uno stato di non esser buoni a nulla, mentre vado persuaso, che la maggior parte di quelli venuti dalle ceppaje degli Ulivi giovani e gagliardi, si dovessero coltivare e allevare per il frutto, benchè tagliati troppo alti, ma gli altri venuti dalle ceppaje d'Ulivi vecchj, deboli, e tagliati troppo alti, sono ormai assicurato dall'esperienza, che sarebbe stato meglio sbarbarli a tempo, e piantarli nelle coltivazioni; poichè la maggior parte sono periti affatto, e gli altri ridotti in uno stato così miserabile, che non v'è da sperarne mai che poco, o nulla di frutto, con tutto che abbiamo secondo il suolo, benigno il Clima, e sollecita la coltura,

Parlando adesso di quelli non secchi nel fusto, ma solamente nelle rame, come successe in alcuni luoghi, nel medesimo anno 1709. si riconoscano attentamente, e fermato dove vadano tagliati i rami, si segnino tutti quei luoghi con tintura bianca, o rossa, servendosi di un pennello legato sopra di una pertica, che facilita molto, senza salire sopra gli Ulivi; e gli altri seccati
affat-

affatto, si segnano nel basso piede, facendovi una croce con la medesima tintura, affinchè gli uomini che debbono tagliarli, non piglino errore, nè perdano tempo, ma veggano subito alla prima occhiata dove debbono tagliare. Venute poi le nuove sortite sopra i rami non seccati fino alle barbe, si taglino tutte le superflue, e mal situate: praticandosi le medesime regole descritte nel Capitolo settimo per i Piantoni, che si lasciano col fusto alto sopra la terra; e per i polloni, che risorgono dalle barbicaje tagliate basse sotto la terra, si coltivinno, e si allevino nel medesimo modo, che si è detto per li Virgulti venuti da' piantoni bassi senza fusto.

CAPITOLO XI.

Del tempo di raccogliere l' Olive, e del modo di ben conservarle, e stagionarle.

IN quanto al tempo di raccogliere l' Olive, non si può limitare, perchè cominciano a cadere al principio del mese di Novembre, seguitando fino a tanto che non siano terminate di cogliersi, o di scuotersi, ch'è quanto dire fino a tutto il mese d' Aprile, e più ancora, massimamente ne' paesi, ove sono quantità di grandi, e belli Oliveti come per esempio alle sponde della marina dello Stato di Lucca, nel Pisano, verso Pietrasanta, ed in altri luoghi simili; ond'è necessario, e mette conto raccogliere più presto che sia possibile, massime quelle cadute sopra la terra smossa, e lavorata di fresco, dove più facilmente si guastano, e s' inacidano; ond'è che fanno meno olio, e questo di brutto colore, e di peggior sapore: essendo verissimo, che la terra smossa e lavorata di fresco, fa quasi subito qualche lacerazione all' Olive, ed attrae dalle medesime l' olio più sublimato, e fortile, che vale a dire lo spirito; laddove quelle che cadono sopra la terra erbata, ovvero coperta dalla roba già seminatavi, nè si lacerano, nè s' inacidano così facilmente, ciò non ostante, è bene che queste ancora siano raccolte con ogni prontezza; perchè quanto più tempo si lasciano in terra, più sono sottoposte al pericolo d' esser dannegiate e dalla soverchia umidità, e dal ghiaccio, e tal volta possono esser portate via dall' acque piovane, massime negli Oliveti situati in positura scoscesa e dirupata.

Rac-

Raccolte poi che faranno l'Ulive, è cosa molto necessaria metterle subito negli stanzoni sani, ariosi, ed asciutti, che abbiano i solari di tavole, che sono molto migliori che di mattoni, con le tue finestre grandi da tutte le parti per quanto sia possibile; acciò l'Ulive raccolte per lo più molli e guazzole, possano maggiormente esser dominate e dall'aria, e dal Sole; e perciò si mettano sopra li detti solari allargate in maniera che non restino alte mai più d'un palmo; affinchè possano tutte asciugarsi presto, e stagionarvisi bene. Nè si lasci sopra tutto di voltarle almeno ogni due giorni una volta; poichè asciugandosi subito tutte egualmente, si liberano da tutt' i cattivi odori, capaci allora di darci l'olio a suo tempo di qualità perfectissimo.

Passati poi quindici, diciotto, o venti giorni in circa dopo raccolte, voltate, e stagionate, come abbiamo detto, vedendosi l'Ulive perdere il loro chiaro, e natio lustro e colore, diventando vizze, grinzose, bigie, ed oscure, allora è necessario di farle subito frangere, e cavarne opportunamente l'olio. Nè mai si faccia, come in alcuni Paesi pessimamente vien praticato, dove subito raccolte, le mettono il più delle volte molto alte, e quasi ammassate nelle stanze umide buie, dove non vedono mai aria, nè Sole, ed ivi le lasciano per molto tempo senza voltarle, nè mai rivederle; e in tanto in vece d'asciugarvisi, ammutoliscono, e pigliano molti diversi cattivi odori. Giunti poi cinque, o sei giorni vicini al tempo che vogliono cavarne l'olio, le ammassano tutte molto serrate insieme, acciò riscaldino, e bollino per due o tre giorni prima di frangerle; alterando questa buona gente, che in questo modo ne ricavano assai più d'olio: cosa che in verità è falsissima, e intanto non si avvedono che guastano l'olio in una forma, che diventa di colore appannato, verde, ed oscuro, che rende quasi orrore a mirarlo, e di sapore tanto rancido, impetuoso e cattivo, che difficilmente si può soffrire gustandolo; laddove l'altro che si cava dall'Ulive raccolte subito cadute, e messe sopra i solari dominati dall'aria e dal Sole, ed ivi asciugate, rivolte, e stagionate, come abbiamo divisato, e frante poi nel suo più vero tempo, riesce l'olio di colore così bello, chiaro e lucente, che gioisce,
o si

e si rallegra la vista a mirarlo ; ci conviene così esquisito, odorifero, e delicato, che ci conviene gustarlo con tutto il nostro maggior piacere.

Da tutto questo resti ognun persuaso, che non il tutto dipende, come alcuni falsamente credono, dall' arte, e dalle maestranze il far l'olio buono, o cattivo ; perch'è molto difficile che l'Ulive naturalmente buone, bene asciugate, stagionate, e frante a tempo, come abbiamo detto, facciano olio che non sia bello, e buono ; siccome è impossibile affatto, che l'altre che hanno patito, facciano olio, che non sia di bruto colore, e di cattivo sapore, ec.

CAPITOLO XII.

Del modo di conservare l'olio, acciò non prenda di rancido, nè di altri cattivi odori, o sapori ; e del modo, e del tempo di travasarlo per mantenerlo perfetto.

IN quanto al modo di conservar l'olio chiaro, lucente e bello, senza che pigli di rancido, o di altri cattivi odori, e sapori, egli è da sapersi ch'è necessario metterlo subito fatto ne' pozzi, o nelle pile, o coppi ben puliti che siano, in istanze calde esposte all'aria di mezzogiorno, alle quali di notte, ed in giornate troppo fredde, e rigide, tenghinsi ben ferrate le porte, e finestre, acciò non possa penetrarvi eccessivo il freddo, ciò che molto pregiudicherebbe all'olio, se si accagliasse ; nel qual caso si metta pure nella stanza, dove conservasi, carbonella, o braccia, alla quale si attacchi il fuoco ; acciò riscaldi bene la stanza, perchè l'olio si sciolga, e non sia punto accagliato : essendo cosa molto necessaria, che sia sempre liquido, rarefatto, sciolto, e sottile ; affinchè possa liberamente deporre le materie grosse, precipitandole a basso, e rendersi con tutta facilità, e sollecitudine sublimato netto, lucente, e purgato da tutte le fecce. E tosto ch'egli si vede esser chiarito, ed aver fatta la sua intiera deposizione, ciò che suole accadere verso la fine del mese di Giugno ; massime quando non si è accagliato nell'Inverno ; allora è che bisogna travasarlo da un vaso all'altro, ponendo da per sé l'olio sublimato, ben purgato,

to chiaro, e lucente; ed in altro vaso si ponga quello che si vede mutarsi di colore nell'atto di travalarlo, quando ci accostiamo verso la fine del pozzo, della pila, o del coppo, mostrandosi di colore cupo, torbido, ed albo. Si separi adunque questo secondo olio, mettendolo in altro vaso da te, e non si mescoli col primo già cavato chiaro e lucente, che per essere stato il primo a chiarire, e galleggiare, è sempre di qualità più stimabile, e molto migliore del secondo, chiamato il primo comunemente *Olio soprafino, scelto, sottile, ed asciutto*.

In quanto al suddetto secondo olio cupo, torbido, ed albo, chiamato *Olio di fondi fini*, il quale pur travasato di nuovo, torna buono, non a paragone del primo, ma poco meno; si travasi anche questo secondo olio circa la fine del mese di Luglio, ovvero al principio d'Agosto, scegliendo dal suo vaso quello che si trova esser chiaro e lucente, ponendol' altro da parte in altro vaso, chiamato questo *Olio di fondi grossi*, mettendolo in una stanza assai più calda, acciò questo pure si rarefaccia, e si sciolga più presto che sia possibile, precipitando a basso tutte le materie grosse, crasse, viziose, e cattive. Giunti poi circa alla metà del mese di Settembre, si travasi quest' olio di fondi grossi, cavandosi tutto il chiaro, a riserva del torbido, e della sua fondata, riuscendo il medesimo, benchè molto inferiore agli altri, assai ragionevole; poichè nè pur questo ha avuto tempo di attrarre molti cattivi odori, e sapori pur troppo comunicabili, che contiene in se stessa la fondata più grossa.

Io dico, che si travasi il suddetto primo olio soprafino, scelto, ed asciutto alla fine del mese di Giugno; il secondo, detto olio di fondi fini, alla fine del mese di Luglio, ovvero al principio d'Agosto; ed il terzo, detto di fondi grossi, alla metà di Settembre, per liberarli più presto che sia possibile, e levarli subito chiariti dalla sua fondata, e deposizione; perchè lasciandoveli, come in alcuni paesi malamente costumano, ho veduto in sostanza, che tutto l'olio di bello e lucido, diventa brutto, ed oscuro; siccome di odoroso e delicato, rancido, sapiente, insipido, e cattivo.

In quanto poi all'ultima fondata più grossa, dov'è semi-

sempre dell'acqua, e della terra, ed altre materie crasse, e viziose, che uscirono dall'Ulivo, questa spurgata che sia, e buona per far sapone, e per unger le lane ordinarie e grossolane de Contradini.

Adunque dopo chiarito, purgato, e travasato l'olio, farà bene tenerlo in luoghi che nella State non siano molto caldi, e nell'Inverno non troppo freddi; atteso che il troppo caldo lo stempra, e il troppo freddo lo fa accagliare; di maniera che da questi due estremi viene assai perturbato l'olio, mettendolo troppo in mezzo il gran caldo, su tramandandone quelle piccole particelle di pochissima fondata, che quiete e sanamente riposansi in fondo; fissandolo malamente il freddo, per cui vien separato dal suo continuo, e li vien tolto affatto il dovuto suo liquido. Cose tutte che ammortano l'olio, rendendolo men delicato al sapore, nè tanto lucido alla vista. Sappiasi in fine che l'olio quanto più invecchia, sempre più perde il suo nato colore, e delicato sapore, ec.



146
T R A T T A T O
DELLE PIANTE DE' FICHI.

Della qualità della Terra, e del Clima per li Fichi.

C A P I T O L O P R I M O.

LE Pianta de' Fichi s'chiedono paese caldo e temperato; perchè ne' paesi molto freddi non vengono bene, e fanno poco frutto; salvo alcuni luoghi di ridossi difesi dalla Tramontana; ed in paesi molto caldi, composti di terra lecca, leggiera, troppo asciutta, e poco sostanziosa, non regnano, perchè il gran asciuttore, e siccità della State gli fa ogni anno avvizzire, e cadere le foglie, ed i frutti prima che arrivino al tempo della loro maturità. Ma quest'è solamente per li Fichi Settembrini, che maturano tardi; che per quelli di Malta, di Portogallo, S. Pieri Gentili, o sieno Dori, e simili, che maturano presto, questi paesi, e questa qualità di terra sono molto a proposito, e producono quei frutti di un sapore, e odore così perfetto, che pajono canditi. Ma è però vero, che le piante restano sempre piccole, e poco robuste.

Ne' paesi mediocrementi freddi si scelga la terra leggiera, asciutta, e non molto grassa, ed in luoghi verso Oriente e Mezzogiorno, e difesi dalla Tramontana più che sia possibile, ed ivi si piantino i soprannominati Fichi della State, che maturano presto; e alcuni Settembrini, o Autunnali, che maturano più anticipatamente degl' altri, come sono gli Ottati, gli Albanelli, o sieno Albi, perchè entrando in altre razze più tarde, ne' paesi freddi non concludono nulla.

I veri terreni per li Fichi sono quelli mediocrementi pastosi, asciutti, e calalinghi, purchè sieno in paesi caldi, dove vengono presto alberi molto belli, e fanno i Fichi dolci, saporiti, e di tutta perfezione. Al contrario le terre troppo umide, e grasse gli fanno molto acquosi, di minor sapore, e crepano, e marciscono facilmente sopra degl' Alberi prima della loro maturità; massime nell' annate troppo umide, e piovose. Vi sono però alcune specie di Fichi asciutti, e poco melosi, come

me sono gli Albi, Brogiotti neri, Docicali, Poponi S. Firenzi, o sieno verdini, e simili, che fanno molto bene nelle suddette terre. Ma altre che di lor natura riescono molto umidi, e melosi, come sono i Maltesi, Portogalli, S. Pieri Gentili, Ottati, S. Martini, e simili, che richiedono il paese caldo, ed il suolo mediocrementemente asciutto; per quali sono molto proprj i terreni casalinghi, particolarmente in luoghi di case sfatte, o rovinate; purchè sieno in paesi caldi; questa sorta d'alberi vi crescono prestissimo, e fanno i frutti molto saporiti, odorosi, e perfetti.

CAPITOLO II.

Della qualità delle Pianta de' Fichi, e del tempo, e modo di piantarli.

Queste sorte d'alberi si possono avere in più modi; ma perchè due mi sembrano i più facili, e i più sicuri, parlerò solamente di questi. Alcuni si chiamano barbate, che sono polloni, che nascono dalle barbicaje delle piante grosse, quali si cavino diligentemente più guarniti di barbe, che sia possibile; e dovendoli piantare in paesi caldi, ed in terre leggiere e asciutte, si faccia dalla metà di Novembre, alla metà di Dicembre. Laddove in paesi freddi, ed in terre umide e forti, dalla metà di Febbraio, fino a tutto Marzo; e imbrattate che sieno le barbe col solito sterco, si piantino nella coltivazione preparata, come si è detto per li Gelsi, Ulivi, ec. in modo che non restino al fondo più di due palmi, valutato l'abbassamento, che fanno alle prime piogge dopo piantati, per la ragion della stipa, e della terra smossa, e sollevata di fresco. Indi si metta a ciascheduno un dritto palo, dove si fermino i fusti delle piante de' Fichi, con legatura di falcio, colli suoi fardellini di fieno, ec. Ma perchè questa sorta di barbate ho veduto più volte coll'esperienza, che non fanno certa buona riuscita, di qui è che non voglio diffondermi di vantaggio, mentre penso di parlare più a lungo di un'altra sorta, che si possono facilmente avere da rami robusti, e di buona forza, staccati dalle piante grosse; quali per verità mi hanno fatte sempre prove così belle, che v'è restato ammirato ognuno.

Parlando adesso delle piante de' Fichi, che vengono da rami, dico, che si prepari la coltivazione, come le ci dovessimo piantare Ulivi; e in tanto si sappia, che

dovendoli piantare in paesi caldi, e in terre leggiere, e asciutte, si faccia dalla metà di febbrajo alla metà di Marzo; e nelle terre fredde, umide, e grasse dalla metà di Marzo fino a tutto Aprile. Io dico, che si piantino nelle stagioni suddette, e non in altri tempi dell'Autunno, e dell'Inverno, perchè trattandosi di rami senza barbe, massimamente di legname di Fico, ch'è di sua natura pochissimo consolidato, e di niuna sussistenza, molto sfoscio, tenero, poroso, di buccia grossa, e piena di un nutrimento simile al latte, facilissimo a conglutinarsi, e marcire, quando si piantano molto prima, ch'entrino in azione, l'umidità della terra si contamina, e marisce facilmente: ovvero gli opprime in maniera, che non mettono che pochissime, e cattive barberelle circa a un palmo vicine alla superficie della terra, e fanno gettate così sottili e miserabili, che non sono buone da nulla; e intanto le persone di corta vista vi si attaccano, lusingandosi vanamente. Io dico questo non solo per via di ragione naturale, quantunque chiarissima, ma con l'esperienza alla mano, mentre due volte sono restato ingannato: la prima, ne piantai venti nel mese di Gennajo, senza che se ne attaccassero neppure uno: la seconda dodici, o quattordici nel mese di Novembre, che neppure allora se ne attaccarono nissuni. Mi parvero così strani quegli accidenti, che feci scavar le fosse, dov'erano piantati i detti rami, per venire in cognizione del perchè non si erano attaccati, e trovai, che dal primo fino all'ultimo era a tutti marcita affatto la buccia e quasi il legname, eccettuate le cime, perchè restavano scoperte, si conservarono fino a un palmo sotto la superficie della terra, dove pur queste erano diventate di color bigio e cattivo, non ostante che le fosse fossero ben fognate, stipate, e piantate con le dovute diligenze.

Preparato che avremo il terreno con tutte le regole dette per gli Ulivi, si scelgano le rame di Fico di tre o quattro anni dalle cime delle piante giovani, sane e vigorose, e dalle parti verso Oriente e Mezzogiorno che abbiano la cima maestra grossa, robusta, non sottile, nè di buccia liscia; perchè di questa sorta si attaccano più difficilmente, e riescono le piante sempre piccole, miserabili, e poco fruttifere; ma quelle scelte si attaccano francamente, e vengono presso alberi grossi,

vigorosi, e fruttiferi. Si taglino dunque le rame scelte alla lunghezza di due braccia e mezzo, e forse tre coprendo la tagliatura con misura da innesti, senza tagliarli nessun rametti; indi s'imbratti tutta la rama eccettuata la cima maestra; e così imbrattata, si distenda nella fossa in maniera, che resti poco meno di due palmi al fondo; dove si faccia prima un grosso suolo di terra scelta, mescolata con due grossi corbelli di concime bene smaltito e sostanzioso, coprendo la rama, con li suoi rametti addezzati per il loro verso senza romperli, e senza pigliare, nè calpestrare la terra, e intanto s'alzi con avvedutezza la cima maestra all'insù in modo, che non resti più di tre, o quattro dita fuori della terra, lasciandola quivi un poco più bassa di quel che sia l'altra superficie del suolo. Io dico, che non si taglino alcuni rametti, nè si spacchi l'estremità del fusto, come molti praticano, non solo perchè si guarniscano tosto più copiosamente di buone barbe, ch'è il maggiore aiuto, che possa darsi alle piante; ma per liberarle dall'acque, e dalla soverchia umidità della terra, che penetra per quelle tagliature, incorporandosi facilmente nel legname, con pregiudizio notabilissimo della rama; e di quì è, che non fanno poi quelle robuste, e belle gettate, che fanno l'altre rame, piantate con le divise diligence.

CAPITOLO III.

Del modo di coltivare i Fichi la prima stagione dopo piantati.

DOpo piantate le rame di Fico, si osservi quando cominciano a gettare; e tosto che si vedono le nuove cime tanto lunghe, ch'abbiano 4. o 5 foglie, s'allontani un poco la terra all'intorno, in maniera che faccia la figura di una piccola catinella fonda circa a un palmo; indi si piglino 3. o 4. libbre di latte di Pecora, di Capra, o di Vacca, munto l'istesso giorno, acciò non sia inacidito, che in questo caso sarebbe forse dannoso, ovvero non tanto proficuo; mettendolo in una pignatta, o altro vaso, facendovi prima un piccolo foro, per dove possa uscire adagio, e sottilmente. Mettasi poi il detto vaso vicino alla cima del fico in modo che aprendo il foro, il latte vada a cadere nella buracella, e incorporarsi a poco a poco nella terra appunto intorno al fusto, ed alle piccole e tenere barbe del fico, facendolo per una

trentina di giorni, due volte la settimana, sempre dall'ore 24. addietro, e in tempo che i fichi abbiano cominciato a muovere, e sieno gagliardamente in azione, acciò le barbe possano più validamente approfittarsene. E calo che in quel tempo la stagione fosse molto piovosa, s'aspetti a farlo pailate che siano le pioggie, e che il terreno sia un poco asciutto. Ogni mattina dopo adacquati i Fichi col latte si vadano a lavare i vasi, e si riempiano le bucherelle con la terra, acciò il calor del Sole non venga ad asciugarle troppo, e consumare inutilmente parte di quella sostanza.

Egli è da saperfi, che l'adacquare i fichi di rami con il latte nel principio della loro azione è una cosa tanto propria, che secondo me, non si può trovar meglio; primieramente per esser di una sostanza senza paragone, molto rinfrescativo, totnile, e facilissimo a introdursi subito validamente in quelle piante, e secondariamente per essere il nutrimento e la virtù delle medesime piante simili appunto al latte; e perciò farei per dire, che faccia il medesimo effetto, che fa agli Agnelli, Capretti, ed altri animali: dimodochè dal principio, che cominciarono a entrare in azione, fino che non restarono per quell'anno d'agire, ch'è quanto dire in meno di sette mesi, hanno sempre fatte gettate lunghe circa a tre braccia, ed alcuni di più; e quel che ha resa maggiore ammirazione ad ogn'uno, è che nell'anno primo hanno fatto ad ogni foglia un Fico, principiando giù vicino alla terra, alle cinque, o sei foglie, e seguitando continuamente quasi fino che hanno durato a crescere; dimodochè i Fichi ascendevano al numero di quindici, diciotto, e venti per ciascheduno; e talvolta ne hanno condotti a perfezione, non solamente i primaticci della State, ch'è molto più facile, ma i Brogiotti neri, che sono degli ultimi, che maturino, e non ostante che ne hanno maturati perfettamente il primo anno.

Io non pongo in dubbio di non essere stato, e di non dover esser nuovamente criticato, massime dal Popolo più minuto, e di poco conto, per aver insegnato, e consigliato a adacquare il prim'anno i Fichi con il latte; mentre non sa ch'io vada persuaso, che piantandone qualche grosso numero, e in coltivazioni incommode, e lontane, non sarebbe praticabile: ma trattandosi di

poche piante negli Orti, e Cortili delle Città, o vicini alle Ville, e luoghi simili, dove s'abbiano cari Alberi grossi, fruttiferi, e anticipati, non sò vedere, che non si possano agevolmente sacrificare per una trentina di giorni due volte la settimana, tre o quattro libbre di latte per volta, senza incomodarsi nè pure con la spesa, che finalmente non ascende a tre paoli per ciascheduno; e in tanto siamo sicuri d'aver prestissimo piantate grosse, robuste, e fruttifere; dimaniera che le faremo i conti giusti, resteremo persuasi d'aver sofferto meno incomodo, e meno spesa di quelli, che con poco denaro ne piantano molti; perchè i nostri si attaccano ugualmente tutti, e vengono prestissimo a perfezione. Al contrario gli altri si perdono la maggior parte; e quei pochi, che s'attaccano, lo fanno così debolmente, che restano sempre Alberi piccoli, e poco fruttiferi.

Avanzandosi poi la State, e veduto ne' mesi di Luglio e Agosto patissero l'asciuttore come molte volte succede, s'adacquino in questa maniera. Si prenda un tinello, o altro vaso capace di quattro, o cinque barili d'acqua, e messolo vicino al Fico che si vuole adacquare, si faccia un piccolo foro giù rasente al fondo, acciò dopo pieno possa uscirne l'acqua a guisa di un piccolo zampillo, guidata per mezzo di un Teologo, o canaletto di legno vicino al piedale di Fico, cominciando circa all'ore 23. affinchè possa gettare quasi tutta la notte, replicandolo per due sere continuate, ad effetto, che la terra resti benissimo inzuppata; e se l'asciuttore seguitasse, passati che sieno otto o dieci giorni, si replichi di nuovo la medesima innacquatura, affinchè mai patiscano troppo l'asciuttore, che li farebbe di pregiudizio grande; poichè interrompendosi l'azione, restano subito d'agire, e intanto si prosciugano, e non fanno quelle belle, e robuste gettate, che sopra si è detto. Nè si manchi di riconoscerli di quando in quando, tagliandoli con avvedutezza tutt' i rametti, che venuti fossero per il dosso del fusto; e nel medesimo tempo si metta ad ogni pianta il suo palo, fermandovi il fusto del fico con legatura di falcio, fatta destramente con li soliti fardellini di fieno, acciò non sieno sbattuti, nè troppo agitati da' venti. E se dubitassimo, che le cime di questi Fichi, così tenere, e delicate potessero esser guastate dalla rigidez-

gidezza del freddo , si fascino con de' pezzi di staja , o altra cosa per assicurarle ; e intanto si rivedano qualche volta , perchè non sieno guastate dagli Animali , che ivi soglion nascondersi , per difendersi dal freddo .

CAPITOLO IV.

Del modo di coltivare i Fichi , e dello sfadamento , da cominciarceli a dare per mezzo del taglio .

PAssata la metà del primo Mese di Novembre dopo piantati , si scalzino più anticipatamente che sia possibile al fondo circa a mezzo braccio , tagliando tutte le barbe per il fusto scalzato , allontanando le terra senza smuovere , nè sollevare da mezzobraccio in giù , quella vicina al fusto , dove restò incorporato il latte , lasciandola isolata , e attaccata intorno alle barbe , scavando l'altra più largamente un braccio al fondo , acciò si possano governare agiatamente con un grosso corbello di concime per ciascheduno , bene smaltito , trito , e sostanzioso , ricalzandoli subito con la medesima terra ; e nell' istesso tempo s' osservi , se il palo avesse bisogno d' esser cavato , rimesso , e rilegato dall' altra parte , si faccia : e s' avverta anche per quest' anno , se negli Mesi di Luglio e Agosto patissero l' asciuttore , s' adacquino nel medesimo modo , che ho detto nel Capitolo antecedente . E cominciando a mettere i rami per il fusto , se ne lascino soli due , uno che guardi a destra , e l' altro a sinistra , acciò comincino la loro ellensione , aperta tanto da una parte che dall' altra , senza che si confondino , nè si contrastino insieme . E veduto che alcuni non gettassero i rami laterali , seguendo a crescere solamente con la cima , questa si tagli subito a quell' altezza , che si stima propria , e dove si vogliono i rami , coprendo la tagliatura con mistura da innesti , acciò non vi penetri l' acqua , nè altra umidità , e venuti che sieno i rami , se ne lascino soli due , uno da una parte , e l' altro dall' altra , tenendoli disciplinati col taglio in maniera che uno non ingrossi mai più dell' altro , ciò che si esige facilmente , tagliando , e raccorciando dottamente il più grosso , e meno il più piccolo ; e talvolta si lasci questo secondo tale qual' è : così si seguiti successivamente ogni anno , tagliando sempre tutti que' rami , che minacciano della confusione , e altri che nascessero
con

con troppa forza vicini al centro, e sopra il dosso de' rami maestri vicini alla loro madrebranca, chiamati comunemente rami di falso legno, che d'ordinario si usurpano non solo inutilmente la maggior parte del nutrimento, ma con pregiudizio notabile delle rame da frutto; e però si tagliano immediatamente insieme con tutti gli altri inutili, intermi, e di poca forza, affinchè la pianta rimanga sempre chiara, e aperta di rami, e dominata anche in mezzo dall'aria, e dal Sole; acciò possano asciugare le umidità, che vi depongono le nebbie e le guazze, che fanno ingiallire, e cadere i frutti prima che arrivino alla dovuta maturità. E resti ognun persuaso, che questa sorta d'alberi piantati e custoditi, come sopra si è detto, il terz'anno son grossi di fusto più che il collo della mano d'Uomo, e si comincia a conseguirne del frutto.

Io sono ormai assicurato, che i Contadini disavveduti, e di grosso intendimento, credano, che sia impossibile il praticare tutte le diligenze descritte, e forse soggiungono essere la maggior parte superflue, vane, e gettate; asserendo aver sempre veduti, e mangiati de' Fichi senza tante precauzioni; non avendo mai preso nulla di lume, nè di cognizione nel corso di tant'anni; che hanno piantati moltissimi Fichi, e pochi ne sono cresciuti, e venuti a perfezione; bastandoli di far vedere, che molti si sono attaccati, ma restati languidi, miserabili, e senza forze; adducendo per ragione da loro sognata, che la terra è sdegnata, e non vuol più quella sorta di piante, non volendo credere che vi sia differenza ne i rami, considerandoli ugualmente tutti buoni. Nè tampoco si persuadono, che possa esserli di nessun vantaggio il piantarli bene, dal piantarli male: e finalmente non valutano nulla molte altre diligenze accennate, quali sebbene a prima faccia pajono molte, e forse difficili a praticarsi, non sono però di quella fatica, e di quel perdimento di tempo, che vien creduto; anzi di grandissimo piacere, e divertimento, massimamente per chi ha genio alla Campagna; ottenendo al fine di vedere in breve tempo con sommo piacere le divise sue piante tutte ugualmente grosse, ben formate, e fruttifere, assaporandone subito le primizie che giudica dolci, benchè acerbe; nè gli par vero dalla gioia di possederle mature, nè pure quando si accosta alle labbra il di loro dolce, saporitissimo frutto.

TRAT-

TRATTATO DELLE PERA.

Del modo più facile di far la provvisione di semi di Pera, e d'altri Frutti.

CAPITOLO PRIMO.

Primieramente dico, che per radunare senza incomodo, e con facilità i semi delle Pera, ed altri frutti, possono tutti quelli, che ne mangiano, tenere nelle loro tavole una piccola scatoletta di legno, ed ogni volta che ne mangiano, e che trovano i semi veramente buoni e perfetti, li cavino, mettendoli nella detta scatoletta, dove si conservino fino al tempo di seminarli. S'avverta però, che quando se ne cavassero molti in una volta, e da frutta troppo matura, e fracide, è necessario metterli prima in luogo arioso fino a tanto che siano bene asciugati, acciò la troppa umidità non li faccia, come facilmente accade, muffire, o patir tanto, che non naschino.

Potrà forse parere ad alcuni, che questa sia cosa di poca stima, e da non farne gran capitale; ma per verità chi vuol far bene i Vivai di buone piante, ci vogliono i semi, senza de' quali non riescono mai compiutamente perfetti; e facendosi poi, come ho già detto, in capo all'anno, quasi senza fatica, con poco incomodo, e con nulla affatto di spesa, anzi con sommo piacere, l'uomo si trova incontanente scelta e comoda provvisione di semi massimamente nelle case de' Signori, che mangiano continuamente alle loro Tavole ogni sorta di frutta; ond'è che possono ordinare, e dare positivamente l'incombenza ad uno de' loro servi, che faccia accuratamente questa faccenda, quando per proprio divertimento, e piacere non gualasse di pratticarla a' medesimi padroni. Raccomando pertanto di tener conto de' semi di tutte le frutta, perchè oramai sono abbastanza persuaso della vera e sicura esperienza, che tutte le piante, che vengono dal seme massimamente messe in Vivajo, sono senza paragone le perfettissime, e molto migliori

gliori di quelle selvatiche, che si trovano casualmente nei luoghi coltivati, nei boschi, o altrove, ec.

CAPITOLO II.

Del tempo, e modo di seminare i semi delle Pera nel primo Vivaio.

IL vero tempo di seminare i semi delle Pera egli è dalla metà del mese di Gennaio fino a tutto Febbrajo; benchè ne' luoghi caldi, di terra sottile, asciutta, e non soggetta molto alle Talpe, Rusole, ed altri animalletti, si possono seminare sicuramente dal principio di Novembre fino alla metà di Dicembre. Adunque si metta all'ordine un pezzo di terreno in luogo arioso, non esposto alla Tramontana, di qualità grassa, pastosa, e col comodo di poterlo adacquare; vangandolo più di mezzo braccio al fondo, purgandosi benissimo da tutte l'erbe, barbe, ec. Si mescoli poi colla terra già vangata una giusta porzione di concime benissimo smaltito, trito, sottile, e spiritoso, come sarebbe polvere di vagliatura di grano roso dalle tarme, sterco di Colombi, di Polli, e di Pecora, stritolato, e ridotto in polvere, zappando poi minutamente il medesimo terreno, acciò il concime resti benissimo mescolato con la Terra. Si piglino poi i semi delle Pera, seminandoli sopra la detta terra, lontani quattro o cinque dita uno dall'altro, coprendoli leggermente con la medesima terra stritolata, acciò si accosti, s'unisca e abbracci i medesimi semi; affinchè non sieno mangiati, nè portati via dalle Rusole, ed altri animalletti, che facilmente entrano fra la terra particolarmente quand'è smossa, e lavorata di fresco.

Prendasi in oltre un innaffiatojo, si dia leggermente una spruzzata d'acqua sopra tutto il suolo del terreno, dove sono seminati i suddetti semi, perchè maggiormente s'accostino, e s'uniscano colla terra. E se prima di nascere si vedesse, che ne' mesi di Marzo, d'Aprile, o in altri tempi, la stagione andasse molto asciutta, si replichi di quando in quando la suddetta innaffiatura, acciò possano più facilmente e anticipatamente nascere.

Per quelli poi che non possiedono terreno a proposito, ovvero mancasse loro il comodo dell'acqua, questi

si possono seminarli in vasi pieni di terra con tutte le medesime regole quì sopra descritte; e trapiantarli poi dopo due anni, come dirò nel seguente Capitolo.

CAPITOLO III.

Del modo d' allevare , e coltivare il primo e secondo anno le piante nate dal predetto seme .

Primieramente s' offervi quando cominciano a nascere , e si tenga sempre netto e pulito tutto il terreno del Vivaio dall' erbe ed altro , che vi potesse essere d' impedimento , e di pregiudizio a quelle piccole , tenere , e delicate piante , adacquandole ogni volta che si vede il bisogno , acciò non patiscano mai l' asciuttore , che sarebbe loro di pregiudizio grande . Si tenga anche in questo prim' anno il loro , benchè piccolo , fusto netto , e pulito da tutt' i rametti troppo grossi , acciò il nutrimento non abbia la libertà di sfogare inutilmente ; ma sia obbligato a starsene più ristretto a beneficio delle barbe , e del fusto ; acciò si faccia più anticipatamente di maggior complessione , ch' è quanto dire robusto ; vegeto , liscio , di buccia grossa , viva , e piena di nutrimento ; capacissimo a suo tempo di validamente ricevere l' innesto alto , o basso , dove il genio , o il bisogno richieda . Laddove lasciato sfogare in buccie , o in falsi rametti , a capriccio della storta natura , si trovano poi così scabrosi e stentati , che siamo forzati ad innestarli dove vogliono , e richiedono i medesimi fusti ; e per lo più , quando si attaccino , fanno sempre gettate languide , e miserabili .

Passata poi tutta la Primavera , la State , e la maggior parte dell' Autunno , ed arrivati al primo mese di Novembre dopo seminati , si puliscano benissimo dall' erbe , sarchiando leggermente tutto il terreno del Vivaio , scalzando con somma diligenza quelle piccole piante , senza toccar loro le barbe , nè smuoverli la terra all' intorno ; governandole ciascheduna con una piccola giumenta di concime della medesima qualità sopra descritta , coprendolo con la medesima terra senza pigliarla , nè camminarvi sopra .

Si stia attenti anche nel second' anno , oltre al far , che non patiscano l' asciuttore della State , e al tener pulito dall' erbe , e sarchiato tutto il terreno del Vivaio ,

valo, e tutt' i rametti che vengono per il fuslo, con segno di voler troppo ingrossare, e usurparsi senza frutto gran parte di nutrimento; quali si levino subito che si vedono esser di quella natura, affinchè la sostanza maggiore acquistata viepiù dalle barbe, stia sempre tutta ristretta, e impiegata a beneficio del solo fuslo.

Passati poi il primo, e second' anno dopo seminati, e custoditi come sopra, si spiantino da questo primo Vivajo, e si ripiantino nell' altro, dove si dovranno innestare, come dirò nel seguente Capitolo.

CAPITOLO IV.

Del modo, del tempo, e della necessità di fare i Vivaj per trapiantarvi i Peri venuti in due Anni dal seme.

PER fare i Vivaj delle piante de' Peri, che si cavano dal primo Vivajo, dove già furon seminati, si scelga una pezza di terra sana, leggerosa, pronta, attiva, in luogo arioso, e non esposto alla Tramontana, e se sia possibile, col comodo di poterla adacquare; vangandola, o per meglio dire, diveltandola un braccio al fondo; cominciando col fare andantemente una fossa larga più d'un braccio; e piena che sia di stipa, o altro fasciname minuto, se ne cominci a scavare andantemente un' altra accanto alla prima, in modo che non vi resti nulla di sodo fra l' una e l' altra, come se si dovesse diveltare, o scavare per uso di Vigna; mettendovi sotto da per tutto la stipa, buttandovi poi sopra la terra, che si scava dall' altra fossa, che si va facendo, e nel medesimo tempo vi si metta il dovuto solito concime sostanzioso; e si piantino i Peri dritti, e affilati in distanza di due palmi uno dall' altro, e niente più al fondo di quel che stavano nel primo Vivajo, senza pigiarli, nè calpestarvi la terra all' intorno; allargandoli con avvedutezza le barbe per il loro verso naturale, senza tagliarli le piccole, nè spuntare la destra, chiamata Fittone, nè altre delle grosse, lasciandole tutte tali quali, acciò si allarghino, e si dilatino con buon ordine per la terra, dimodochè sbarbandoli poi da questo Vivajo per ripiantarli in Giardini, o nelle coltivazioni, riesca fatto con tanti vantaggi mai possibili a ottenersi dalle piante troppo avanzate nel primo Vivajo.

Par-

Parlando adesso del tempo di sbarbare i Peri dopo due anni, che furon seminati nel primo Vivaio, e ripiantarli nel secondo, come sopra si è detto; si faccia dalla metà di Novembre fino alla metà di Dicembre, ovvero dal principio di Febbrajo fino a' primi giorni di Marzo; sempre in tempo, che la terra non sia niente bagnata più del bisogno; nè si tengano mai più di due anni nel primo Vivaio, e mentre si sbarbano, si faccia il possibile per non offenderli, nè lacerarli le barbe, nè la buccia, levandoli solamente tutt'i rametti troppo grossi, che venuti fossero per il fusto contro il buon ordine naturale, senza toccarli, nè spuntarli la cima, quando non eccedesse molto in lunghezza.

Io stimo così necessario di sbarbare i Peri, dopo due anni seminati nel primo Vivaio; e ripiantarli nel secondo tutti ugualmente distanti due palmi uno dall'altro; perchè avendo scelta e preparata la terra con la divisata sapa, mettiavi sotto da per tutto, e governata col solito concime, viene a restare più tana, sciolta, rarefatta, sollevata, e con maggior attività; dimanieracchè mettevvi le piante de' Peri con le loro barbe allargate, si attaccano francamente, abbracciano, e si fanno subito propria quella terra, dove cominciano tosto ad agire con tutta vivezza e celerità; e in tanto si guerniscono di maggior quantità di barbe, fane, robuste, e attive, ch'è il più difficile di queste piante, e senza un preparativo di questa sorta, non ho mai veduti Vivai di piante di Peri tutti unitamente gagliardi, robusti, e ben guerniti di buone barbe.

Parlando adesso de' Perugini selvatici, che si trovano ne' Boschi, Ragnaje, ed in altri luoghi simili; scelti che siano vegeti, con buone barbe, non prosciugati, nè languiditi, si piantino nel Vivaio con le medesime regole, che ho qui sopra descritte per quelli, che si cavano dal Vivaio fatto di seme: poichè da questi Perugini se ne cavano piante ragionevolmente buone.

CAPITOLO V.

Del modo di coltivare, e del tempo d'innestare le piante de' Peri tenute un'anno nel suddetto Vivaio.

AL principio del mese di Novembre, dopocchè saranno state le suddette piante un'anno intiero in que.

questo suddetto Vivajo, si allontanano loro la terra all'intorno al fondo circa un palmo, tagliando tutte le barberelle, che si trovano esser fortite a quell'altezza; governandole poi con una grossa giumenta di concime buonissimo, si ricoprino colla medesima terra, e s'innestino subito in questa maniera. Primieramente si segghino un palmo alte sopra la terra, sempre in luogo di buccia liscia, che non vi siano nodi nè altre scabrosità; e pulita che sia la rozzezza della segatura, si spacchi nel vero mezzo il fusto con ferro tagliente e pulito dalla ruggine; mettendo nella spaccatura una bietta, o zeppa di ferro, o d'osso, ovvero di legname forte, assai più piccola, e stretta della grossezza del fusto, acciò vi possa restare d' ambe le parti tanto di vuoto, che vi possano facilmente incastrare, e accomodare le mazzette domestiche; quali si lascino con un solo occhio per mazzetta, appuntandole in maniera, che commettano, e si tocchino bene non solo al di fuori delle buccie, ma anche al di dentro. E perciò è necessario, che le mazzette domestiche sieno non solamente a zeppa, sottili in fondo, ma di più bisogna scarnirle e tagliarle ugualmente, acciò restino tanto grosse da una parte, che dall'altra.

Per quelli poi che sono di fusto sottile, e non si possono innestare che ad una sola mazzetta; questa si digrossi diversamente dall'altre, cioè in modo, che la parte, che deve restare al di fuori, sia assai più grossa dell'altra, che restar deve al di dentro. Si faccia adunque della figura, ch'è una lama di coltello, ma non gli si levi di dentro affatto la buccia, che in questa forma riesce facile la commessura, tanto dalla parte dov'è insetata la mazzetta domestica, quanto dall'altra che resta senza; poichè stringendosi con salcio, o altro legame, la spaccatura non patisce, nè fa risalito dall'altra parte, ma unitamente riserransi, e si ritoccano bene insieme d' ambe le parti tutte le buccie.

Si mettano le mazzette domestiche nella spaccatura del fusto selvatico in modo che il loro occhietto resti più basso, e vicino alla segatura del predetto fusto più che sia possibile; e si osservi, che l'occhietto resti sempre al di fuori, benchè altri pretendano che sia meglio metterlo al di dentro; asserendo, che il germoglio, che fortisce dal detto occhietto, s'unisce, e s'addirizza

za più facilmente col fusto selvatico. Ciò, che in fatti non regge, perchè io che ne ho fatti molte volte e nell' uno, e nell' altro modo, ho veduto con l'esperienza sempre miglior prova in quelli voltati al di fuori. E la ragione è chiarissima; poichè questi restano molto più vicini alla buccia del fusto selvatico, dalla quale debbono ricevere il nutrimento: e questa glielo tramanda assai più facile, e naturalmente; e attaccati che siano, in due o tre anni fatti germogli, o per meglio dire rami, s'uniscono e s'addrizzano tanto bene, come se la mazzetta fosse stata messa nel vero mezzo del fusto.

Prima di legarli si stacchino due pezzi di buccia dal fusto selvatico già legato, e s'addattino d' ambe le parti, in maniera che coprano bene le mazzette, che restano incastrate nella spaccatura del fusto: dimodochè serrandosi con falcio spaccato, ovvero con tiglie di canapa pettinata, validamente s'abbraccino, ed attacchino senza minima lacerazione; s'impecino poi, tanto la segatura del fusto selvatico, che le tagliature delle mazzette domestiche, con la solita mistura non troppo calda; e si procuri di circondare benissimo le mazzette dalla parte di fuori, acciò non vi possa penetrare nè acqua, nè altra umidità.

Vi sono altre stagioni, e altre diverse maniere per far gl' innesti, che tutte a volere quì riferire, porterebbero molto in lungo questo capitolo; e però s'imo bene di trattarne diffusamente in un Capitolo a parte.

Passato che sarà tutto l' Inverno dopo innestati, ed arrivati alla Primavera in tempo, che i vegetabili cominciano a entrare in azione, e muovere, si osservino quelli che non fossero attaccati, e s'innestino di nuovo più bassi, perchè questa stagione ancora è molto buona e propria per innestare, passata che sia la metà di Marzo, e più presto o più tardi secondo le correnti stagioni, e la caldezza del Clima. Indi si taglino, o strappino subito, che si vedono nascere alcuni germogli per il fusto selvatico, acciò non si perda mai inutilmente niente di nutrimento; tenendolo obbligato anche da principio a far tutta la sua forza verso l' occhietto dell' inesto; e veduto questo sicuramente attaccato, o cresciute le fortite in modo, che si possa distinguere la migliore, si tagli subito tutta l' alta mazzetta

zetta dalla parte opposta, che da segno di mettere più stentatamente, e con meno forza: e intanto si metta una grossa canna fitta in terra, alla quale s'addrizzi il germoglio dall'innesto, fermandolo con legatura fatta gentilmente con fila d'erba; e in tanto si sciolga l'altra fatta al fusto selvatico nell'atto d'innestarlo; acciocchè il nutrimento possa più facilmente circolare, e passare nelle sortite domestiche. Si osservi ancora, se dal medesimo occhio non fossero venuti, come suole accadere, più d'un germoglio, e si taglino, o si strappino tutti a riserva del migliore, e più bello; e se per il fusto di questo si vedessero rametti troppo grossi, che minacciassero di pervertire l'ordine più comune della natura, si taglino anche questi subito che si vedono, affinchè la virtù della pianta resti sempre tutta impiegata in prò del fusto della cima, e delle rame buone. Nè si lasci di tenere continuamente zappato, netto e pulito dall'erbe tutto il terreno del Vivajo, adacquandolo ogni volta che si vede il bisogno, acciocchè queste tenere piante non siano mai fermate, nè trattenute dall'asciuttore della State; ed assicuro ognuno, che faceli tutte queste vantaggiose diligenze (che secondo me si riducono a un civile e nobile divertimento,) in un solo anno faranno gettate così alte, grosse, robuste, belle, e capaci di potersi trapiantare ne' giardini, e nelle coltivazioni, come dirò nell'appresso Capitolo.

CAPITOLO VI.

Del tempo, e del modo di sbarbare le piante de' Peri dopo innestate, e piantarle ne' giardini, e nelle coltivazioni.

IL vero tempo di sbarbare le piante de' Peri, e ripiantarle ne' giardini, e nelle coltivazioni, che sono in paese caldo, e non esposto alla tramontana, e composto di terra leggiera, asciutta, e non molto grassa, egli è dalla metà di Novembre, fino alla metà di Dicembre; dove ne' paesi freddi, e composti di terra umida, grassa, e sustanziosa, dalla metà di febbrajo, fino alla metà di Marzo; col dovuto necessario riguardo, che nelle terre leggiere, sottili, asciutte, e poco sustanziose, vi si mettano piante, che facciano le Pera

L tene-

tenere, delicate, e meglio saggose, come sono le Bugiarde, Burè bianche e grigie, Angeliche, Ciafferia, Spina di Carpi, Bergamotte, della Novellaria, Colmare, e simili: al contrario ne' paesi un poco freddi, e di terra umida, grassa, e sostanziosa vi si piantino qualità di Pera asciutte, nè molto saggose, come sono le Chiaraville, Gerusalemme, o siano Allorè, Garafanone, Carovelle del Bacchettone, Missergian, Giugnolone, Moscadelle tonde dalla State, e altre odorose e saporite di simil sorta. Visono poi le Buoncristiane dall' Inverno, che secondo me sono le migliori, e più nobili di tutte l'altre, purchè siano fatte in terra nè molto umida, nè molto forte, ma gentile, leggirosa, profonda, pastosa, e grassa, ed in luogo caldo, che non vedano, nè sentano la Tramontana; come per esempio ne' giardini, ed orti della Città, e Ville di Clima dolce, ed in terreno non frigido, nè capace di ritenere in se stesse della soverchia umidità; vicino poi alle muraglie vengono ottimamente non solo le piante, ma le Pera ancora molto grosse, lisce, belle, sostanziose, e di un sapore molto odorifero e delicato.

Al contrario, ne' paesi freddi, e composti di terra umida, e forte, ovvero troppo asciutta, e poco sostanziosa, fanno le Pera piccole, nodose, brutte, e quel ch'è peggio, non sono buone a nulla; e perciò s'abbiano tutti i dovuti necessari riguardi quando si piantano, non solo ne' giardini e orti della Città, ma anche nelle Ville, e coltivazioni della Campagna si mettano Pera, che siano proprie, e si confacciano alla terra, ed al Clima; altrimenti non riescono mai di quella bontà, e perfezione, che si vorrebbero. E sappiasi che le Pera Buoncristiane dall' Inverno, poste in terreno e clima a proposito, vengono molto belle le piante, buonissimi ed durevoli i frutti; ed essendoci ingannati nella scelta della terra, ed el clima, non fanno buona prova le piante, nè son buoni e durevoli i frutti. Nè occorre che i giardinieri si lamentino d'altro, che di non aver saputo scegliere la terra, e l'aria. Io discorro così, perchè dubito molto, che si manchi nella cognizion delle piante, e molto più in quella delle terre, e del taglio, che sono le tre cose più importanti, che si diano nell'Agricoltura: con tutto che siano pochissimo valutate e meno studiate.

Sbarbati adunque dal Vivaio con somma diligenza, non

Non si taglino, nè si spuntino nessune barbe, lascian-
dole tutte tali quali: e imbrattate, che siano, si pian-
tino nella coltivazione già pteparata, come quella de-
gli Ulivi, e in modo che non restino al fondo più di
mezzo braccio; allargandoli diligentemente tutte le bar-
be per il loro verso naturale senza pigliarli niente af-
fatto la terra all'intorno: e volendoli tenere ad altro
vento a seconda della maggior parte degli àlberi di cam-
pagna, si lascino alti con tutta la loro cima; e se a
mezz'aria, e un poco ristretti di rame, si taglino in
modo, che il fusto resti alto circa a cinque palmi sopra
la terra; e se bassi a cespuglio, all'uso de' giardini no-
bili, si taglino alti almeno di tre palmi, mettendo a cia-
scheduno un dritto palo, dove si fermino con legatura,
acciò non siano sbattuti, nè troppo agitati dal vento.
Avanzandosi poi la stagione, e venendo il tempo che
cominciano a mettere, si taglino, o strappino subito
che si vedono tutt' i rametti, che nati fossero per il fu-
sto, a riserva di alcuni sottili, orizzontali, spartati per
il basso fusto, che chiamano il nutrimento, e facilita-
no la circolazione; e di soli due sù all'estremità, uno
a destra, e l'altro a sinistra da servirsi per guarni-
re, e comporre tutto il corpo delle rame, che bisogne-
ranno alla pianta; guidate, e condotte che siano savia-
mente col taglio, come dirò nel seguente Capitolo.

CAPITOLO VII.

*Del tempo, e del modo di coltivare, ed allevare le pian-
te de' Peri passato il primo anno, dopo piantate nella
coltivazione, fino che non saranno d'età di quattro,
o cinque anni.*

NEL primo mese di Novembre dopo piantati i Peri,
tanto ne' giardini, che nelle Coltivazioni, si fac-
cia a tutte le piante una giusta osservazione, e trove-
remo senza dubbio che avranno fatte di cinque cose una.

Primo, o vi troveremo delle piante del tutto morte.

II. Benchè sane, vive, e verdi, non avranno getta-
to nulla affatto.

III. O che non avranno fatti che piccoli, e minuti
getti cattivi, e d'imperfetto colore.

IV. O che avranno gettato mediocrementemente.

V. O che gagliardamente.

I. Quelle adunque del tutto morte si spiantino, e si cerchi minutamente donde possa esser venuto il difetto, e facilmente riconosciutolo, si dia miglior esito all'acque sotterranee con nuova fogna; si facciano altre necessarie diligenze, e si ripiantino in luogo delle piante già morte altrettante delle buone, con l'avvertenza di metterli intorno alle barbe della nuova terra scelta, e del solito concime.

II. Quelle che non hanno gettato nulla affatto si scalzino circa a mezzo braccio al fondo, facendo attentamente una esatissima, e giusta riflessione, per vedere se fossero, come suol qualche volta accadere, sane e buone: cosa che si conosce dal non esser nè muffite, nè gialle, nè bigie, ma di buccia verdone, molto piena di nutrimento, e disposta alla vegetazione. In questo caso, essendo, come ho già detto de' Piantoni nel Capitolo settimo del Trattato degli Ulivi, in una specie di letargo, ch'abbia addormentata a tempo la loro facoltà vegetativa, non si disprezzino, anzi se ne faccia buon capitale, e si governino, e si ricalzino con la terra già scavata, poichè al principio della nuova stagione questa sorta di piante così addormentate sono capaci di ripigliare, e risorgere con molta forza e attività, ed in un solo anno far gettate così grosse e robuste, che suppliscano a ciò che avevano mancato l'anno antecedente.

III. Per quelle, che non hanno fatti che piccoli, e minuti getti di cattivo colore, queste meritan subito di essere rigettate senz'altre osservazioni; attesochè que' miserabili getti non sono ordinariamente altro, che veri contrassegni di piante tanto inferme, che sian di giorno in giorno per morire affatto.

IV. Per l'altre poi, che hanno gettato o mediocrementemente, o gagliardamente, si tengano in conto tanto l'une, che l'altre; scalzandole largamente più di mezzo braccio al fondo, tagliando tutte le barbe, che si trovano per il fusto, che resta scalzato, governandole con un corbello del solito concime: e ricalzate che sian con la medesima terra, si taglino i loro rami, alla lunghezza di cinque, o sei occhj, e più o meno secondo la debolezza, e gagliardezza delle piante, e complessione de' rami; lasciando più corti i più gagliardi, e so-

ven-

CAPITOLO VII. 165

vente nulla toccando i molto deboli , con la dovuta avvertenza , che gli ultimi occhi che restano all' estremità , uno guardi alla destra , l' altro alla sinistra , acciocchè le nuove sortite non si rincontrino insieme , nè facciano altro disordine , ma restino da tutte le parti in giusta e debita lontananza uno dall' altro , e sempre mai lontane dal grande inconveniente della confusione . Indi si rimettano i loro pali , e si rileghino con le sempre solite divise diligenze .

Adunque saremo attenti particolarmente nelli mesi di Maggio , Giugno e Luglio , tagliando o strappando tutte le nuove sortite , che andassero al di dentro delle rame in falsi legni , in Cilindri , ed in altre inutili Vermene ; affinchè le rame buone vengano con bello e buon ordine , ed il nutrimento resti sempre tutto ugualmente riconcentrato , e ripartito nelle sole rame che debbono unicamente servire per comporre la pianta , e intanto si lascino per il dosso delle medesime alcuni corti spartati rametti asciugati , che sono da fruttare ; poichè questi ne' primi quattro o cinque anni sono capaci di farci gustare con nostro sommo piacere le loro tanto desiderate primizie .

CAPITOLO VIII.

*Del tempo , e del modo di coltivare le piante de' Perì
passati che siano quattro , o cinque anni dopo
piantati nelle Coltivazioni , e fino che
dureranno .*

PAssati quattro o cinque anni dopo piantati i Perì ne' giardini , e nelle coltivazioni , si scalcino di nuovo più largamente nel mese di Novembre , circa a un braccio al fondo ; tagliando tutte le piccole barbe che si trovano per il fusto su alte a fior di terra , senza tagliare nè lacerare nissune delle principali e maestre : governandoli con un grosso corbello di concime per ciascheduno ; quale saria quasi necessario , che fosse di qualche tempo avanti preparato , e composto di vinaccia , che si cava dalle tina di fondate di vini , e granella d' uva , che si cavano dalle botti nel travasarli , di sterco di colombi , di pelli di pecora , di cavallo biadato , di cuojazzoli , di lupini cotti ; mescolato , e rivoltato

spesso per ridurlo smaltito, sottile, e tutto di una medesima qualità. Questa sorta di concime è buonissimo per le piante de' Peri, particolarmente per quelle che sono in terre fredde, umide, frigide, fiacche, grasse, ma pigre, e poco attive, ed in luoghi ombrosi, e paesi d'aria bassa; dove per lo più questa sorta di piante, benchè in apparenza diano dimostrazione di esser sane, spiritose e gagliarde, sono per altro balorde, fiacche, e poco, o niente fruttifere; ond'è che i spiriti, i sali e la prontezza del suddetto concime, non solo le ravvivano, ma le risanano, e rinvigoriscono, rendendole anche feconde di frutti di un esquisito sapore.

Dopo governare, si ricalzino, e si zappi loro la terra all'intorno, e si venga tosto all'operazione del taglio alle rame, non solo per renderle più durevoli, ed aggradevoli alla vista, ma ogn'anno fruttifere. Scrimo pertanto quì necessario di riferire alcune regole, le più utili, e principali; ma per praticarle dottamente, si ricercano uomini di buona capacità, e lavj, che riflettano, intendino, e posseggano bene la scienza del taglio; ch'essendo altrimenti, io son sicuro, che facciano più male, che bene.

Primo, si osservino tutt' i rami inutili, infermi e morti, e non si permettano mai sopra le piante.

II. Si osservi se la pianta sia in terra grassa o magra, e se in luogo ombroso, ovvero arioso, e bene ventilato; e se sia di razza di frutti grossi, o piccoli; che se in terragrassa, e di razza di frutti piccoli, si lascino i rami in maggior quantità, e più lunghi; ed essendo in terra magra, e di razza di frutti grossi, si lascino i rami in minor numero, e più corti: essendo poi in paese basso e in luogo ombroso, si guidi la pianta più alta di fusto, e si tenga più chiara, ed aperta di rami; in paese poi più elevato, e arioso, si tenga più bassa di fusto e di rami, e si addatti il lor numero, e la lor lunghezza alla forza ed al vigor della pianta.

III. Si osservi se la pianta sia molto gagliarda, o mediocre, ovvero debole, e si addatti il numero, e la lunghezza de' rami alla forza, ed alla complessione della pianta; ch'essendo gagliarda, si lascino i rami in maggior numero, e più lunghi; ed essendo mediocre, si lascino in minor numero, e più corti, e molto meno essendo debole.

IV. Si osservino tutti quei rami, che dovriano fervire

vire per guarnire , e comporre la pianta , e si tenga sempre equilibrato , e ripartito in essi ugualmente il nutrimento , acciocchè un ramo non ingrossi mai più dell' altro : ciò che facilmente si ottiene con lasciare meno lunghezza a i rami grossi , e più a' piccoli ; perchè trovando il fugo la resistenza nel ramo grosso scortato , necessariamente si diverte da quello , e s'incammina , e s'innalza per il piccolo , dilatandosi forzatamente in questa maggior lunghezza . Si prattichi poi tutto il contrario ne' rami da frutto , lasciando sempre maggior lunghezza a' grossi , che a' piccoli ; perchè i grossi sono capaci di resistere molto più al numero ed al carico del frutto , senza rompersi ; perciò si cerchi aggiustatamente di addattare la quantità , e il peso de' frutti alla complessione , e robustezza de' rami .

V. Si osservi attentamente per ben conoscere , e lasciare anche nelle piante piccole , molti rami asciugati , che sono da frutto : purchè non sieno capaci di togliere , o di far male agli altri da legno .

VI. Si osservi se qualche ramo di buona complessione , fortito al di sotto contro l'ordine più comune della natura , fosse per altro situato in luogo , che potesse essere il caso per allevarne , o parte o tutta la pianta , si conservi , tagliandolo solamente alla lunghezza di quattro , o cinque occhj . Quell'ordine più comune della natura consiste generalmente , che in tutte le piante il primo ramo fortito all'estremità sia sempre il più grosso ; e l'altro secondo , che resta al disotto , sia più piccolo di quello , ma più grosso del terzo ; e così gradatamente tutti gli altri rami dovrebbero tenere questo buon ordine , nascendo in qualunque luogo della pianta .

VII. Si osservi quando si allevano i nuovi rami da legno , di farlo col divisato modo , ed arte ; acciò guarniscano , e riempiano tutte quelle parti , che resterebbero vote dopo tagliati i rami da frutto , perchè quelli , dopo che hanno fruttato tre , quattro , o cinque anni , sovente s'illanguidiscono , e restano come infermi , mezzi morti , e quasi affatto abbandonati dalla natura , e perciò è necessitato il Giardiniere a levarli : ond'è , che non avendo saputo provvederci per tempo , si trovano poi senza rimedio piante sguarnite , e vote affatto di rami , e di figura sconciissima .

VIII. Si osservi se la pianta avesse qualche ramo trop-

po gagliardo e bravo , che andasse molto in alto colla sua cima ; questo si tagli anche nel grosso , affinchè il fugo stia sempre riconcetrato , e ripartito ugualmente in tutte l'altre rame buone , prima che si raffreddino , e si profciughino , perchè altrimenti accaderà , che questo ramo rovinerà tutta la pianta .

IX. Si osservi se da qualche ramo sottile , e minuto ne fosse sortito altro più grosso della sua madrebranca ; questo si tagli subito intieramente , perchè di questa sorta di rami non è da farsi fondamento nessuno , nè per la figura , nè per il frutto .

X. Si osservi anche nelle piante giovani , se abbiano gettati alcuni rami , quali in vece di andare dritti , riguardino l'Orizzonte ; questi si lascino in numero competente , non perchè siano buoni , nè capaci di comporre e guarnire la pianta , che in verità non son tali ; ma perchè diventano ben presto da frutto . Egli è però da sapere , che quando sopra il dosso di detti rami orizzontali ne sortitiero altri di falso legno , da' quali non se ne caverà mai soccorlo alcuno , nè per la figura , nè per il frutto , questi si taglino intieramente ; altrimenti accaderà , che rovineranno la loro madrebranca . Perciò è necessario osservare bene nella Primavera , ovvero nella State alla loro nascita , e strapparli subito che si vedono .

XI. Si osservino tutte quelle piante , che ne' primi anni hanno sempre gettati i rami di una mediocre grossezza e complessione , quali non danno segno che di piante deboli , e di poca durata . Passati poi alcuni anni si vedono le medesime piante che gettano uno , due , tre , e forse di vantaggio rami di falso legno ; allora è che bisogna avvertire , e considerare se i medesimi rami sieno situati in modo , che possano essere capaci di contribuire per una nuova , bella e regolata figura ; che in questo caso ci fonderemo subito le nostre speranze , cominciandoli immediatamente a disciplinare col taglio ; e intanto si conservino , se non tutti , almeno una parte de' primi vecchi , e deboli , tanto quanto siano buoni per il frutto , scegliendo i migliori con intenzione di levarli quando non sian più buoni . Non si lasci pertanto di tagliare con avvedutezza sopra i detti rami nuovamente sortiti , perchè comincino a disporsi da per loro per comporre regolarmente tutte le rame , che possono

sono bisognare alle piante , senza mendicarne l' aiuto dalle rame vecchie . Se poi i predetti rami nuovi fossero fortiti in luogo sconcio , e mal situati , da non poterlene servire per uso di una nuova oisatura di rame ; in questo caso si tagliano tutti intieramente sul fondamento , che l' hanno venturo ne dovranno fortire de' nuovi più belli , e meglio situati , perchè a quest' ora si è già scoperto , e siamo assicurati , che la pianta va aumentando le forze per mezzo di nuove radici venute straordinariamente ; onde non sarebbe prudenza seguitar la pianta nè per mezzo de' primi soli rami deboli , di poca complessione , e affatto incapaci di ricevere e impiegare in se stessi tutto l' acquisto del nutrimento ; nè pure per mezzo de' nuovi , quando si vedono situati in cattiva positura . Adunque è necessario di fare un' esatissima riflessione per trovare il modo d' impiegare tutto il nuovo acquisto del nutrimento a beneficio della pianta per mezzo d' altri rami nuovamente fortiti , benchè di falso legno , e contro l' ordine naturale ; capacissimi questi di darci più anticipatamente tutto l' utile e il dilettevole .

XII. Si osservin tutt' i rami donde abbiano la loro origine , e di qual natura veramente sieno , e si taglino tutti quelli , che nati fossero contro l' ordine della natura , massime quelli che vanno al di dentro in falsi legni con pregiudizio dell' altre rame buone , a riserva di qualcheuno , che fosse sortito assai lontano dal luogo , ov' ebbe l' origine la sua madrebranca ; ovvero , come si è detto , da qualche parte troppo sguarnita . Questa sorta di rami , benchè di falso legno , tagliati alla lunghezza di quattro , o cinque occhi , e più e meno secondo la forza della pianta , e la complessione di detti rami ; possono i medesimi servire per il frutto , e nel medesimo tempo per aprire , e guarnire la pianta . Ma per ben mettere in pratica una sì difficile operazione , ci bisognano molte riflessioni , ed uomini , che abbiano della prattica , e molta e vera cognizione delle piante , affinchè sappiano distinguere e conoscere que' rami veramente capaci di esser buoni per il frutto , e per il legno , senza che possano esser di pregiudizio agli altri : perchè dandosi il caso che uno di questi rami , che si lascia con fine , ch' egli faccia del frutto , e guarnisca la parte vuota , fosse il medesimo sortito , com' è facile , e in qualche luogo ,
de-

dove faceva la maggior forza l'eluberanza del nutrimento della sua madrebranca, in questo caso, dico io, farebbe più mal fatto, poichè li renderebbe capace di attrarre, e tirare a sè la maggior parte della virtù vegetativa; perchè sempre viepiù crescendo il detto ramo, viene a dilatare la strada al sugo, che se ne scorra addrittura, quasi tutto per il medesimo ramo: dimodochè l'altre rame di questa pianta, sì malamente guidata, vengono a restar prive della maggior parte dalla loro facoltà vegetativa, ed abbandonate dalla natura; ne segue intanto, che il secondo, o terzo anno cominciano a ridursi languide, miserabili, senza forza, ed affatto incapaci di poterla riacquistare: perchè il nutrimento ha già presa altra strada, a guisa dell'acqua di un fiume, che battendo con maggior forza, più che in altri luoghi, in qualche tortuosità delli suoi argini, dove ha cominciata una piccola tortura, per la qual cominciavi a passar l'acqua, a poco a poco rode, consuma, e porta via l'argine, fino a tanto che l'apertura non si è resa grande, e capace di passarvi tutta l'acqua con facilità: di maniera ch'ella, per così dire, abbandona affatto il suo vero letto, e se ne va facendo a suo piacere un altro di nuovo per l'adiacente, e più bassa campagna. Il simile appunto fa il nutrimento delle piante in quei rami fortiti; dove il medesimo fa la sua maggior forza. Con questa differenza però, che l'acqua, uscita fuor del fiume assegnatole, riesce quasi sempre, a forza d'argini, o altri ripari di obbligarla a ritornarsene nel suo vecchio letto; ed ella essendo l'istessa, facilmente vi torna, perchè il fiume è sempre capace di riceverla: ma non è certamente così nelle piante, perchè quei rami che restano per due, e tre anni privi della maggior parte della loro facoltà vegetativa, è vero che non seccano, ma si riducono in uno stato di non essere mai più buoni, nè capaci di riacquistarla; perchè in tanto si prosciugano, assodano, e fermano i loro canali, e per conseguenza perdono tutta quella disposizione, e attività che avevano di ricevere facilmente il loro nutrimento, fattosi anche in maggior copia.

Per quello poi che riguarda il tempo di tagliare, io dico, ed assicuro ognuno sopra la mia esperienza di trentacinque e più anni, che levatane qualche stagione

ne di estremo freddo , si può tagliare di tutt' i tempi , senza pregiudizio delle piante ; essendo però vero che quelle per loro stesse deboli , ed altre che sono in terra sottile asciutta , e poco sostanziosa , farebbe bene portarle subito cadute le foglie ; e l'altre mediocri dalla metà di febbrajo alla metà di Marzo , e tutte quelle gagliarde dalla metà di Marzo sino a' primi giorni di Aprile , quando la molteplicità delle piante , e degli affari non permettano che si faccia più anticipatamente anche nelle piante gagliarde , che farebbe cosa molto più utile , e vantaggiosa .

Tutto ciò che ho qui sopra descritto , per quello riguarda il taglio , è necessario di praticarlo anche in tutte le piante degli Agrumi , per renderle sempre belle , durevoli , e molto fruttifere . Ma è da sapersi , che non in tutte le qualità delle piante de' Peri , si debbono praticare le medesime regole nel potarle , perchè una qualità di Pera richiede una potatura affatto diversa dall' altra ; il simile accade nelle piante degli Agrumi , essendovi in queste pure una differenza ben grande nella potatura che debbe farsi , per esempio alle piante de' Cedrati , da quella che debbe praticarsi alle piante de' Limoni , Aranci di Portogallo , Aranci dolci , forti , di fior doppio , Bergamotte , Mele rose , Limoncelli di Napoli , e molte altre qualità di una natura di rami affatto diversi , così richiedono e vogliono diverse le potature ; e di quì pure ne nasce , che per mancanza di cognizione , e di buona pratica de' Giardinieri che tagliano non solo a caso , ma sopra tutte le piante con la medesima regola , le ne vedono molte tanto di Peri che di Agrumi che fruttano ogn' anno pochissimo , benchè sane , e robuste , e gagliarde ; e quì è dove mi dispiace infinitamente forse più che in altri luoghi , di non poter fare una ricetta , e insegnare , come credo d' intendere , distintamente il vero e diverso modo di potarle , a seconda della diversità della loro natura , ec.

Vi farebbero moltissime altre osservazioni da spiegare : e per quelli che avessero genio di restarne pienamente informati , si contentino di leggere attentamente il nobilissimo , e gran trattato del taglio degli Alberi bassi , e fruttiferi del fu Monsù della Quintinè , ec.

*Del modo di coltivare, ed allevare le piante de' Peri,
che si mettono vicine alle muraglie, per tenerle a
Spalliera di nuova invenzione.*

Primieramente queste sorte di piante si mettano mezzo braccio incirca vicino alle muraglie, e non tanto accolte, come ho veduto praticare da molti; e piantate che siano, colle medesime regole dette nel Capitolo sesto per quelle che si piantano ne' Giardini, e nelle Coltivazioni, si tagli subito il loro fusto, in modo che resti alto meno d'un braccio sopra la superficie della terra. In Aprile poi quando fortiscono i primi germogli, due soli se ne scelgano per allevarli all'estremità, uno che guardi a destra, e l'altro a sinistra della muraglia; e dopo sei Mesi fatti vermene nel mese di Novembre si scalzino, tagliando tutte le barbe troppo alte, e governate col solito concime, si ricalzino della medesima terra. Indi si taglino le dette vermene alla lunghezza di quattro, cinque, o sei occhi, coll'avvertenza, che gli ultimi guardino al di fuori, e non al di dentro della pianta; e intanto s'allarghino, piegando le medesime vermene una a destra, e l'altra a sinistra, fermandole con semplice legatura, a due chiodi piantati nella muraglia, e da queste medesime vermene, e colla medesima regola si vada avanti, sciogliendo e allevando ogn'anno nuovi rami, tagliandoli in maniera, che uno non ingrossi mai più dell'altro: ciò che si esige facilmente, e con poca fatica dal taglio prattato saviamente, tenendo sempre il nutrimento equilibrato, e ripartito in tutte le rame, secondo la loro grossezza, e lunghezza; e in tanto a misura della forza, e del vigore che va ogn'anno aumentando, si crescano, e s'allonghino i rami ugualmente d' ambe le parti, fermandoli a chiodi fitti nella muraglia, ripartiti in giusta distanza, senza incrociarli, e parimente s'allevano ogn'anno spartitamente alcuni rametti da frutto. E fatta la prima ossatura alla muraglia, chiara, e poco piena di rami, sicomincino tosto ad allevare e conservare per il frutto le sortite, che nascano ogn'anno per il dosso de' ramigià obbligati alla muraglia; levando affatto le troppo grosse,

se, robuste, e gagliarde, spuntando le mediocri, e nulla toccando le deboli; nè mai se ne lascino molte insieme, ma ripartite in giusta distanza una dall'altra, acciò non facciano della confusione, e non chiamino il nutrimento più in un luogo che nell'altro; nè mai si accostino, nè si leghino queste seconde rame a' chiodi della muraglia, come malissimamente ho veduto praticare a molti; poichè in tal forma si cavano dalla loro dolce, e natural positura; onde restano forzate a guisa d'un arco teso; dal che ne segue, che il loro nutrimento non ha la dovuta facilità di circolarvi, e secondarle, di maniera che trovandosi così ristretto, necessariamente dà fuori in nuove sortite di succhioni, falsi legni, e d'altre numerose vermene, dalle quali ogn'anno egli è d'uopo, e forza, che alcune si taglino, obbligando l'altre alla muraglia, con pregiudizio delle prime rame, che avevano già il possesso d'un ottima disposizione di farsi grosse, complesse, e fruttifere; e intanto si soffermano, raffreddano, e prosciugansi, e di qui è che si vedono quelle male sorte di Spalliere di piante quasi affatto infruttifere, e piene continuamente d'un soverchio numero di rami languidi, inutili, e infermi; laddove guidate col taglio praticato saviamente, la virtù vegetativa circola, e ricircola più francamente nelle rame buone, senza che abbia occasione d'abbandonarle, e di sfogare in altre false sortite, mentre queste vanno crescendo ugualmente da tutte le parti, a seconda delle prime rame già obbligate alla muraglia, e si fanno in poco tempo sì sode di complessione, capaci non solo di sostenerli da per se stesse, ma capacissime ancora di reggere tutto il carico del frutto, senza tante legature, e tant'imbarazzi di pertichelle, di canne, di ferri e chiodi nelle muraglie, quali per verità non servono ad altro che per moltiplicare le spese, e gl'inecomodi, martirizzando, ed assassinando le piante.

Adunque col solo taglio, gli Uomini, che bene l'apprendono, con poca fatica guidano benissimo questa sorta di piante in maniera, che senza legature facciano vistosa spalliera da per se stesse le branchemadri, e da frutto, e da legno, ripartendosi queste ugualmente col taglio, in modo che nessuna di loro mai vada alla volta della muraglia, ma tutte colle loro cime sporgano in fuori dall'opposta parte; e sopra tutto che
non

non s'ergano tanto su dritte a cilindro, ma guardino bene l'Orizzonte. Ed ecco che tenutele, e guidatele in questa nuova moda, avremo spalliere assai più robuste, e più belle, nè meno durevoli, ma più feconde; e qui finalmente per sicurezza di tutti asserisco, che avendo in travagliato più volte in diverse vecchie spalliere, non solo di Peri, ma d'Agrumi ancora, estremamente obbligate con tante legature alle muraglie; l'ho affatto disarmate da ogni legame, e ridotte col solo taglio alla divisata moda, che ho detto, ho compiutamente ottenuto l'intento con sì buon esito in pratica, e tanto felicemente, che non si poteva desiderare d'avvantaggio.

C A P I T O L O X.

*Del tempo, e del modo di diradare i Fiori de' Peri
Buoncrisiani dall'Inverno, e dallo infaccamento
e altre diligenze da praticarsi.*

IL vero tempo di tagliare, e diradare i fiori de' sudetti Peri, egli è subito che si vedono sboccati, e ben fioriti, prima che annodino il frutto; tagliandoli tutti con forbicette, a riserva di un solo per polluzzola, sempre il migliore, e più bello, che si conosce dall'origine del suo gambo più grosso, e meglio situato, ed al suo colore vermiglio, rosselino, e più vivo degli altri. Siamo adunque in necessità di tagliare tutt' i superflui, perchè essendo molto delicati, ogni piccola nebbia, o altra intemperie dell'aria li fa assai spesso tutti cadere, e lasciarne solamente uno per polluzzola, questo resiste assai più all'ingurie del tempo, perchè acquista subito maggior complessione; nè lì si ferma addosso gran tempo nè pure con danno l'umidità, e la nebbia; poichè il medesimo fiore resta isolato, asciutto, e più dominato dall'aria, pigliando addirittura maggior quantità di nutrimento, senza che resti indebolito dagli altri usciti dal medesimo bottone che restando tutti uniti insieme, oltre al debilitarlo di nutrimento, vengono a formare come un mazzetto legato, vero ricettacolo, ove più facilmente si depongono le umidità delle nebbie, con tanto di pregiudizio, che le più volte tutti ne cadono. Essendo poi i frutti annodati; ovvero, in termine più comune di
Giat.

Giardinieri, legati, si sìa attenti a tutte le nuove sortite, in particolare a quelle che nascono sopra le cime delle polluzzole, e vicino a' gambi delle Pera: queste si taglino con forbicette, ovvero si pizzichino con unghie subito che si vedono; poichè lasciandovele, cominciano tosto a succhiare molta di quella virtù, che dovrebbe andare nelle Pera; e queste intanto languide, per mancanza di dovuto nutrimento, ad ogni piccola nebbia, o vampa di Sole, soffermansì, impallidiscono, e cadono, ancorchè sianò alquanto ingrossate. Si osservino in oltre l'altre sortite, tagliando tutte quelle che nate sono sopra ai dossi de' rami grossi, ovvero vicino al luogo, ove i medesimi rami ebbero la loro origine. Il simile a tutte l'altre mal situate, da non poterlene servire nè per il frutto, nè per il legno; acciò non sianò di pregiudizio nè alle rame buone, nè al frutto dell'anno imminente. E si comincino a fare le suddette osservazioni subito che si vedono le nuove sortite, seguitando fino alla metà d'Agosto a riceverle per il meno una volta la settimana, tagliando, o strappando forte tutte le sortite inutili e dannose. Si spuntino agl'ultimi di Maggio, ovvero al principio di Giugno anche tutte le nuove cime delle rame buone, affinchè il nutrimento resti sempre tutto impiegato, e riconcentrato a favore de' frutti già legati; e delle rame basse, che sono le più difficili a pigliare il nutrimento e mantenersi gagliarde, robuste, e fruttifere. Questa è un'operazione necessaria necessarissima; ed è pochissimo praticata, perchè niente intesa.

Si osservi anche dalla metà di Giugno alla metà d'Agosto: e se in questo tempo la stagione andasse molto asciutta, s'adaquino le suddette piante, una volta la settimana nel medesimo modo che ho insegnato per quello de' Fichi nel Capitolo 3. acciò le Pera si mantenghino tenere, e disposte a crescere, e non s'assodino, nè si soffermino troppo presto; ma seguitino a ingrossare senza nessuna occasione di trattenimento fino al tempo che cominciano a disporsi alla loro maturazione.

Giunti poi al principio del mese di Settembre, e vedute alcune Pera molto grosse, belle e stimabili, ma in luoghi troppo esposti al vento, dove corrino pericolo di cadere prima che sianò fatte, si piglino alcune sacchette fatte di spaghetto, ad uso di reti, mettendone

done ad ogni Pera una; e ferrata che sia la facchetta col suo spaghetto al gambo della Pera, si fermi, e s'assicuri col medesimo spaghetto a qualche ramo superiore in modo, che la Pera riposi totalmente sulla facchetta, e non altrimenti più sulla rama, che l'ha prodotta; affinchè restino difese, e assicurate da' venti; e perchè i loro rami non essendo più forzati dal peso, e levati dalla loro natural positura, possino più facilmente darli l'ultimo nutrimento; e in tanto le Pera si facciano più compiutamente grosse, e perfette.

CAPITOLO XI.

Del tempo di cogliere le Pera dal Verno, in particolare le Buoncristiane, e del modo più proprio di conservarle.

IL vero tempo di cogliere le Pera dall' Inverno, in particolare le Buoncristiane, non è limitato; perchè in alcuni Paesi si perfezionano più presto, ed in altri più tardi, come accade anche sopra una medesima pianta, dove molte volte alcune non si perfezionano, in modo che siano da cogliere prima che alla fine del mese d' Ottobre, ed altre alla metà di Novembre, e forse più tardi. Il simile accade in tutte le frutta tanto dalla state, che dall' utunno, colla differenza, che in queste il tempo si restringe a pochi giorni dal più al meno. Passati adunque cinque, o sei giorni del mese di Ottobre, venute che siano alcune rugiade fredde, si colgano immediatamente tutte quelle, che si osservano aver mutato il loro natio colore di verde ed oscuro, in più chiaro e lustro, ed altre che nel medesimo tempo divengono picchettate d' un colore quasi simile al giallo; essendo questi i due più veri e sicuri contrassegni, che le Pera sono giunte al tempo di doverli cogliere: poichè non pigliano più nutrimento dalla pianta; e perciò si colgano diligentemente con tutto il loro gambo, e in tempo che siano asciutte dalle guazze, o altre umidità. E per ben conservarle, si mettano per venticinque, o trenta giorni sopra le stoje in modo che non si tocchino una coll' altra in una stanza esposta a mezzogiorno, sana, asciutta, ed ariosa, colle vetriere, o incartate alle finestre, affinchè ne' tempi nebbiosi, e piovosi vi pene-

eri meno umidità che sia possibile, tenendole aperte nelle giornate belle e asciutte. Passato che sia il detto tempo, si mettino sopra le tavole in altra stanza alta, esposta all'aria di Tramontana; che abbia le finestre da due parti, affinchè sia ventilata, e possa girarvi l'aria; perchè stando ferma, tosto si appesta nel medesimo modo che s'impultrisce l'acqua stagnata, mettendo le reti di filo di ferro, o di spaghetto alle finestre, quali non si terrino che ne' tempi umidi, piovosi, nebbiosi, e tanto freddi e rigidi, che le Pera possino ghiacciare, perchè siccome il caldo, il vento Scirocco, l'umidità, la nebbia e l'aria rinchiusa, accelerano la maturità, così l'aria fredda, ventilata, e asciutta le porta avanti, trattenevole, che maturino più tardi. Si vadano poi a rivedere una volta, o due la settimana, secondo le qualità, e quantità, che ne abbiamo; e trovando che le meno perfette cominciano a marcire, si levino tosto, perchè non infettino l'altre, che lor sono appresso; nè cagionino altro cattivo odore alla stanza; e sappiasi, che il marcire della frutta dipende molto da non essere state bene appropriate le piante alla terra e al Clima, e altre volte dall'imperfezione delle medesime frutta, che hanno qualche parte piagata, poco sana, e talvolta dall'essere mature, e non conosciute a tempo dalle persone, che ne hanno la cura, e trovandone delle perfettamente mature, si mangino, o se ne faccia altro esito prima che degradino dalla loro bontà: perchè tutti i frutti vorrebbero essere mangiati quando sono sul vero perno della loro maturità; poichè passato questo lor termine, necessariamente degradano di perfezione, e cominciano a perdere quel loro odorifero e delicato sapore, diventando in poco tempo sì acquose, e tanto mezze, che poi ben presto marciscono affatto, ed altre avvizziscono, e si asciugano tanto, che non sono buone a nulla, in particolare quelle fatte in terre grasse, ed in paesi umidi, e non appropriate le qualità delle Pera a quelle della terra, e colte troppo presto dalle loro piante; queste, o per un verso, o per l'altro periscono prima che maturare perfettamente. Però si facciano tutte le divise osservazioni, per mangiarle in punto, ben mature, e non trasandate. Poichè in tutto, ma più ne' frutti di questa sorta, non si dà che efimera la permanenza.

178

TRATTATO DE' CASTAGNI.

Tanto per uso delle Selve, che de' Pollonetti.

CAPITOLO PRIMO.

Delle qualità della Terra più atta e propria per uso de' Vivaj di Castagni; e del tempo, e del modo di prepararla, per seminarvi le Castagne.

Sarebbe cosa molto propria, che la Terra, che debbe servire per uso de' Vivaj di Castagni, fosse già stata da qualche tempo lavorata, e travagliata ogn'anno, e di sua natura perfettamente sapiente per l'acque sotterranee, che superficiali; nè mai troppo leggiera, ma profonda, pastosa, grassa, pronta, attiva, ed esposta all'aria di Levante, e mezzogiorno, e non totalmente alla Tramontana; e per quanto sia possibile, nel comodo di poterla adacquare nella Estate; perchè il beneficio dell'acqua è cosa molto utile, e vantaggiosa, essendo verissimo, che non solo i Castagni, ma tutte le piante piccole fanno più proya in due anni, mentre sieno adacquate a tempo, di quel che facciano in quattro senza questo vaevole aiuto, perchè non viene mai interrotta la loro azione, nè si asciugano punto le loro già ubertose trachee per la troppa siccità della State, onde pigliano immediatamente un'ottima disposizione, che senza questo necessario principio, tutte le piante crescono sempre molto più adagio, e restano così languide, stentate, e miserabili, che non concludono mai che poco o nulla.

Caso poi che questa terra fosse viziosa per la soverchia umidità, originata dall'acque travegate, e rinchiuse; come accade sovente in molti luoghi di Paesi montuosi, e lontani dal domestico, si veda di sanarla perfettamente per il meno un anno prima di seminarvi le Castagne, per mezzo di fogne sotterranee, fatte stabilmente, con la sua stipa sopra, o altro frascome grossolano, ovvero di fosse aperte, fatte ad ogni corto

trat-

aratto, secondo che richiede il bisogno; ma è da sapere, che sono molto più lodevoli le prime delle seconde; e così asciugata e lanata si vanghi, o si zappi subito quattro o cinque palmi al fondo, mettendo il suolo in buona positura, riempiendo tutte le fosse già scavate per uso delle fogne, smuovendola, e sritolandola da per tutto ugualmente, acciò abbia tempo, e possa più facilmente risvegliarsi dal suo letargo, e ripigliare la sua perduta prontezza, e attività: perchè l'acque travenate, rinchiusa, e stagnata nella terra, tosto l'opprimono, e addormentano in maniera, che resta, per così dire, come un corpo morto, nè si risveglia così subito facilmente in poco tempo, mentre non sia prima smossa, sollevata, e sritolata per il meno due volte nella state, in tempo che sia asciutissimo.

Se poi fosse naturalmente sana, ma troppo ferrata e cozzipata insieme, per la ragione d'essere stata molto tempo sode, e senza lavorare, e perciò impigrita, addormentata, e perduta quasi affatto la sua dovuta natural prontezza, e attività, come accade in tutte le terre, che si lasciano per molto tempo sode, e senza lavorarle, diventando quasi subito affatto sterili, ed infecunde; questa ancora si vanghi, o zappi per il meno tre palmi al fondo nel mese di Maggio, sollevandola, sritolandola, e purgandola benissimo da tutte le spine, roghi, erbe, &c. acciò possa più validamente abbracciare; e approfittarli, non solo del calor del Sole, che la concuore, scioglie, e stagiona, ma anche degli altri benigni influssi celesti, che la fecondano.

Essendo adunque la terra così preparata, e giunta alla metà del mese di Novembre, ovvero all'incirca, o in tempo che non sia troppo bagnata, si vanghi, o si zappi di nuovo per il meno tre palmi al fondo, facendovi tosto i solchi con l'aratro; ed essendo luogo piccolo, vi si facciano col marrone a mano, in distanza di due palmi incirca uno dall'altro, e nella medesima distanza si facciano inderti solchi sterzatamente le buchette con la vanga, di grandezza capaci di una grossa gommella del nostro solito concime per ciascheduna, e coperto che sia immediatamente per l'altezza di due, o tre dita di terra, vi si mettano subito tre, o quattro castagne per buchetta, scelte perfettamente grane, in distanza di mezzo palmo in circa una dall'altra. Io

dico tre, o quattro per buchetta, benchè sieno più del bisogno, perchè non sempre tutte nascono, ed alre talvolta son guastate, e mangiate dagli animali: coprendole leggiermente per l'altezza di tre dita di terra benissimo stritolata, e senza pigliarla appianando da per tutto i solchi ugualmente col marrone, appunto come si pratica al formentone, faggina, legumi, simili, ec.

Giunti agli ultimigiorni del mese di Marzo, ovvero al principio di Aprile, subito l'anno dopo seminate le Castagne, tempo appunto, che cominciano a nascere, allorchè si vedono cresciute per l'altezza di un palmo, o poco meno, si puliscino benissimo da tutte l'erbe, sarchiando, e smuovendo da per tutto leggermente la superficie del suolo, ricalzando nel medesimo tempo i Castagni, acciò possino più facilmente pigliare un ottima disposizione di crescere anticipatamente con la dovuta vivezza, e celerità, seguitando non solo nella Primavera, ma anche nella State, e nell'Autunno, tenendoli sempre sarchiati, netti, e puliti dall'erbe; e veduto, che nei tempi di estremo caldo, dessero qualche semplice segno di voler patire per il troppo asciuttore, cosí si adacquino, introducendo placidamente l'acqua nel vivaio, dandogli tempo, che la terra possa benissimo inzupparsi da per tutto ugualmente, replicando più volte nella State questa adacquatura, sempre che si vede il bisogno, massimamente il primo anno, perchè essendo i Castagni così piccoli, e poco inoltrate, e internate le loro corte, e tenere barbe nella terra, sentono subito ogni semplice asciuttore, che interrompe, e sosferma il continuo della loro azione, e intanto perdono il principio, ed il possesso che già avevano dalla loro ottima disposizione che non possono mai riacquistarla così certa, e sicura, che con molta difficoltà, e con gran perdimento di tempo; e perciò si faccia il possibile per inumidire la terra, prima che sia troppo asciutta; e per levarle la superfluità dell'umido, allorchè si conosca troppo bagnata, non solo per l'acque travenute, e rinchiuse, ma dobbiamo anche stare avvertiti, per non adacquarla mai se non in tempo di vero bisogno; mentre è certissimo, che questi due estremi opprimono, e addormentano la terra, rendendola subito, come sopra si è detto, pigra, e quasi affatto sterile, ed infecunda.

Sap.

Sappiasi in oltre, che le Castagne si possono seminare con buon esito anche ne' mesi di Dicembre, Gennaio, Febbraio, e Marzo; ma ho veduto sempre pruove migliori in quelle seminate di Novembre; e intanto ci liberiamo dall'imbarazzo di doverle conservare: cosa che non riesce mai, senza che non se ne guastino molte, quantunque si prattichino tutte le diligenze; nè vi è da dubitare, come vien falsamente supposto, che quelle che si seminano nel mese di Novembre sieno sottoposte a esser guastate dalla rigidezza del ghiaccio, mentre abbiamo di sicuro, che non patiscono nulla affatto, quando non sieno seminate in terre viziose, oppresse, e addormentate, come già s'è detto per la soverchia umidità. Neppure vi è da temere che non facciano ragionevolmente bene, seminate anche in luoghi; dove non sia il comodo di poterle adacquare; ma è altrimenti verissimo, che fanno più adagio, nè possono così subito pigliare quella ottima disposizione, che credo totalmente necessaria in tutte le piante, non solo perchè sieno più robuste, e fruttifere; ma anche perchè creschino anticipatamente fino alla loro più dovuta possibil grossezza.

Finalmente è da sapersi, che i Vivai di Castagni, fatti e custoditi, come abbiamo già detto, sono da servirsi più per uso di Selve, che per farne Pollonetti, o, come altri dicono, Palaje, o Vernacchiaje, perchè in questo caso si possono seminare le castagne molto più spesso, per aver maggior quantità di castagni nel medesimo spazio di terreno, mentre non si debbono innestare, e si possono sbarbare dal Vivaio per il meno due anni più presto di quelli che s'innestano per uso delle selve, e piantarli nelle terre già preparate per uso di Pollonetti, come penso di dire ulteriormente in questo medesimo Trattato in un Capitolo a parte.

CAPITOLO II.

Del tempo, e del modo di coltivare, e allevare i Castagni piccoli nel vivaio il secondo anno dopo nati.

IL secondo anno dopo nati i Castagni, allorchè giunti circa agli ultimi giorni del mese d'Aprile, ovvero al principio di Maggio, in tempo che la terra non sia troppo bagnata, si puliscino benissimo da tutte

l'erbe, zappando minutamente il suolo più volte nella state, sempre che si vedono ritornare le nuove erbe, acciò la terra sia più disposta, ed atta a dargli immediatamente tutto il dovuto necessario incremento; è veduto che nella state più calda patissero l'asciuttore, s'adacquino, come già s'è detto nel Capitolo antecedente, con l'avvertenza, ch'essendo in quest'anno un poco più cresciuti, assicurati, e avanzati con le loro barbe nella terra, non patiscono così facilmente per ogni semplice asciuttore, onde non sono così subito in necessità d'essere adacquati tanto spesso, come l'anno passato.

Passando poi alla prima settimana di Giugno del medesimo anno; ciò che dipende non solo dalla stagione avanzata, o posticipata, ma anche dal Clima più o meno caldo, e dalle qualità della terra più, o meno pronta, e attiva, si osservino esattamente i Castagni, e allorchè si vedono per il dosso del fusto, massimè su vicino alla cima, sortiti, e allungati molti rametti laterali, si taglino tosto con ferro tagliente solamente tutti quelli, che facessero dubitare di voler troppo ingrossare con pregiudizio della vera cima, acciò venghino di fusto liscio, dritto, agguagliato, e unito di grossezza più che sia possibile, per poterli poi più validamente innestare, e alti e bassi appunto là dove il genio e il bisogno richiede; lasciando spartatamente tutti gli altri piccoli rametti orizzontali, come incapaci di minimo pregiudizio alla cima, e al fusto, e intanto facilitano la circolazione, l'ingrossamento, e la proporzione al medesimo fusto, chiamando in suo vantaggio il nutrimento.

Ne mai si prattichi di lasciarli crescere a loro arbitrio; perchè cominciando il nutrimento, e la virtù a diffondersi subito copiosamente; dilatandosi ne' rametti troppo grossi, venuti contro il buon ordine della natura, tosto abbandonan la cima maestosa con tanto di pregiudizio, che i castagni, così male allevati da principio, vengono tanto storti, brutti, confusi, e simili a tanti Frasconcelli, venuti a capriccio della natura; appunto come farebbero i virgulti, che risorgono dalle ceppaie de' Poltonetti; se non si comincia fino da principio a diradarli, levando affatto i più deboli e superflui, guidando gli altri su dritti col taglio praticato saviamente a tempo, tagliando tutte le rame venute lateralmente, capaci di far.

farli troppo grosse, e pervertire il bell'ordine della natura; ond'è che senza questo mezzo non si otterrebbero da Pollonetti così facilmente non solo anticipati, e bellissimi pali, ma anche grosse, dritte, pulite, e lunghe pertiche, per uso di cerchi, con altri ottimi, e bellissimi legnami per servizio delle fabbriche.

CAPITOLO III.

Del tempo, e del modo di scegliere, e destinare le mazze domestiche per innestare i Castagni nel Vivaio.

PARLANDO del tempo, e del modo di scegliere, e destinare preventivamente le mazze domestiche per innestare i Castagni nel Vivaio, è da sapersi da tutti quelli che vogliono fare un grosso numero d'innesti, come ho fatto io più volte in diversi luoghi, ch'è cosa molto utile e necessaria di pensarci per il meno un anno prima del tempo dell'innestatura, per non averle poi a mendicare, e pigliarle a caso, come da molti vien praticato, con pregiudizio notabilissimo dell'annee rendite delle loro Selve; perchè oramai sono assicurato, che non tutte le qualità di Castagni riescono ugualmente fruttiferi in un medesimo terreno; ond'è necessario scegliere le mazze di diverse specie, e fare gl'innesti separatamente, per poter poi riconoscerli, e addattarli con la dovuta necessaria proprietà alle diverse qualità del Clima, e del suolo; nè mai riportarsi totalmente a' Contadini; nè ad altre persone di corta vista, che non valutano queste cose che poco o nulla, se pure non le disprezzino.

Prima dunque d'arrivare al mese di Marzo, nell'anno avanti, che si vogliono fare gl'innesti, si scelghino alcuni robusti pedali di Castagni di diverse qualità, come farebbero i Marroni, benchè alquanto fallaci, sono la miglior qualità di Castagne di tutte l'altre, non solo per mangiarle in diverse maniere, ma anche per farne farina; essendo questa la perfettissima tanto per la delicatezza, bianchezza, sapore, e odore; non essendovi nessun'altra qualità di farina di Castagne, che possa starle a fronte; ma è altresì verissimo, che sono molto soggette ad esser rubate da' Confinanti, e molto più da quelle medesime persone, che ne hanno la cura; perchè oltre a quelle, che mangiano continuamente

re in più modi, ne vendono molte, e forse anche contro la loro volontà; per la ragione delle frequenti richieste, ed altre ne regalano a' parenti, agli amici, e ad altre persone, ec. di manieracchè, se si potesse, starei quasi per dire, che non possono far di meno, perchè vengono troppo ricercate da tutte le qualità di persone. E quì è dove tocca ai Padroni, e alle persone, che soprintendono a pensare, come possono andar le cose, riguardo all' interesse, facendo bene i conti, per vedere se possa essere più utile il piantare di questa sorta di Castagni, o di altre qualità. Vi sono le Carraresi, o come altri dicono Carpinesi, che sono una buonissima qualità di castagne, perchè ne fanno moltissime, e raffermano quasi ogn' anno; e seccate, pulite, stagionate che sieno, riescono le più pesanti di tutte l' altre; ma invecchiandosi la loro farina, piglia facilmente di grasso; e queste pure sono alquanto ricercate, per mangiarsi fresche, ma non da tutte le qualità di persone, come i Marroni. Essendovi anche le castagne chiamate Mogliane, molto stimabili non solo per la loro buona qualità di farina, ma molto più perchè fruttano copiosamente ogni anno, allorchè sieno piantati i Castagni nelle colline basse in luoghi domestici, e non soggetti all' alciatore eccessivo, e guardati più che sia possibile dalla tramontana, ne sono molto ricercate per mangiarsi fresche, e vengono presto alberi molto guarniti di rami fruttiferi, durevoli, e di smisurata grossezza. Nè sono da dispregiarsi le Pastinesi, e montanine, perchè fruttano queste ancora quasi ogn' anno copiosamente, mentre sieno piantati i castagni in luoghi propri, e vi abbiamo subito il vantaggio, che sono meno ricercate dell' altre, perchè hanno cattiva vendita, mentre sono poco buone a mangiarsi fresche.

Scelti ch'avremo questi pedali di castagni, non avendo altro modo di trovare tutta quella qualità di mazze, che bisogneranno per fare i nostri innesti, si taglino nel grosso i rami de' medesimi castagni, non mai troppo vicini al centro, acciò possano gettare più facilmente un grosso numero di nuove, lisce, e belle sortite di vermene, per servirsene poi nel mese d' Aprile dell' anno venturo, per cavarne gli anelletti, e fare gl' innesti di quella razza, che possono essere più fruttiferi, per la qualità del clima e del suolo delle nostre

selva

selve: essendo verissimo, che non avendo pensato per tempo a trovare, e destinare le mazze domestiche di buona razza, come sopra s'è detto, faremo poi al tempo dell'innestatura molto imbarazzati, e per necessità obbligati a pigliarle come si trovano, e non come si vorrebbero, con pregiudizio notabilissimo delle nostre annue rendite.

CAPITOLO IV.

Del tempo, e del modo d'innestare i Castagni del Vivaio il terz' anno dopo nati.

IL tempo d'innestare i castagni non si può appunto limitare, perchè dipende dalla Stagione, dal clima, e dalla qualità della terra, più o meno pronta, e attiva, ma ordinariamente ne' Paesi non molto freddi egli è da venti, fino a trenta del mese d'Aprile, allorchè si vedano entrati bene in azione, cosa che si conosce dallo staccarsi facilmente la buccia dal fusto; allora si tagliano immediatamente le mazze domestiche, facendo tosto gl'innesti a anelletto, o, come altri dicono, a bocciuolo, con l'avvertenza di non pigliar mai gl'anelletti nel più delle mazze, nè vicini alla cima, ma solamente quelli di mezzo, che sono li più ubertosi, e facili ad attaccarsi validamente, mentre hanno gli occhj più compiutamente perfetti, e disposti alla pollulazione, staccandoli, e cavandoli destramente dalle mazzette, in maniera che non crepine, nè si lacerino i loro occhj, e con altrettanta avvedutezza si mettono nel fusto selvatico, allentata che sia la buccia, spaccata, e divisa in tre, o quattro parti, spingendoli tanto abbasso, fino che l'abbraccino giustamente, praticandosi altre osservazioni, e diligenze, che ho più minutamente descritte, e insegnate per l'innestature de' Gelsi, e degli Ulivi, la prima nel Capitolo terzo del Trattato de' Gelsi, e la seconda nel Capitolo terzo del Trattato degli Ulivi, facendoli sempre, per quanto sia possibile, in belle giornate, e sopra tutto, che non sieno piovose.

Nè mai si lasci il bell'ordine di ripartire i castagni nel Vivaio, facendo tre, quattro, e cinque filari d'innesti, tutti di marroni uniti insieme, ed altrettanti di Carrarese o sieno Carpinei, Mogliane, Passinesi, ec.
e più,

e più, e meno secondo la quantità de' Castagni selvatici, ed il bisogno che abbiamo, per le diverse qualità delle terre delle nostre selve. Ne mai si facciano a caso, nè alla rinfusa, senza separare gli assortimenti uno dall'altro, per poter poi conoscere di che razza sieno, per bene appropriarli al Clima, e al suolo: cosa che a mio giudizio è di somma importanza; quantunque sia pochissimo praticata.

Giunti poi circa alla prima settimana del mese di Giugno, dopo innestati, si rivedino esattamente, ed a tutti quelli bene attaccati, si levino le nuove fortite, venute per il fusto selvatico, affinchè non sieno di pregiudizio agl'innesti: ed essendovene alcuni non attaccati, come suole accadere, massime quando sono fatti per mano di persone, ch'operano a caso, a questi si lasci crescere solamente una fortita selvatica la più vicina all'estremità, per poterli di nuovo innestare nell'anno venturo; e nel medesimo tempo si zappi da per tutto il suolo, non solo per pulirlo dall'erbe, ma anche per risvegliarlo, e metterlo in maggiore attività; e veduto che nella State patissero per il troppo asciuttore, si adacquino, come già si è detto antecedentemente nel secondo Capitolo; tenendo continuamente levate le fortite selvatiche, che nascono di quando in quando per il fusto; nè si lasci mai coprire il terreno dall'erbe: che facilmente vi nascono, per la ragione dell'acqua datagli nella State; e resti ognun persuaso, che il tenere spesso smossa, sollevata, e pulita la terra dall'erbe, serve di non ordinario, e anticipato vantaggio a tutte le piante, ed a tutte le ortaglie.

Indi passando al mese di Maggio dell'anno susseguente, in tempo che la terra non sia troppo bagnata, si zappi al solito per tenerla smossa, e pulita dall'erbe, e nel medesimo tempo si dia un'occhiata agl'Innesti; e veduto che i rami minacciaessero della confusione, e non venissero secondo l'ordine il più comune, che tiene la natura nella produzione de' branchi, tosto si tagliano affatto tutti quelli che mostrassero di voler pervertire questo bell'ordine, acciò i Castagni venghino più belli, e anticipati, che sia possibile: assicurando ognuno, allorchè giunti al mese di Novembre del medesimo anno, saranno così belli, grossi, e capaci, da po-

potersi cominciare a trapiantare nelle selve, come vado a insegnare nel seguente Capitolo.

CAPITOLO V.

Del tempo, e del modo di piantare Castagni nelle Selve, con altre utili, e necessarie considerazioni da praticarsi.

PARLANDO in primo luogo del tempo di piantare i Castagni nelle Selve; è da sapersi ch'è fuor di ogni dubbio, che nelle sponde basse, in quei luoghi esposti all'aria di Levante, e mezzo giorno, e composti di terra sana, e leggiera, egli è dalla metà di Novembre alla metà di Dicembre; laddove nelle terre forti, esposte all'aria di Tramontana, ove più difficilmente si sciolgano i ghiacci, è dal principio fino a tutto il mese di Marzo; e nelle Colline alte, più soggette alla rigidità del freddo dal principio fino a' 29. del mese d'Aprile col dovuto riguardo, che nelle terre sane, leggieri, e bene esposte all'aria di Mezzogiorno, anche in questi luoghi alti si può un poco anticipare; e farebbe cosa molto utile, e vantaggiosa, che le fosse, o buche dove si vogliano piantare i Castagni, fossero già fatte da uno, o due anni avanti, massime nelle Terre forti, e poco sane; acciò il caldo della State, e il ghiaccio dell'Inverno avessero tempo di concuocere, sciogliere, e stagionare quella sorta di Terre, per renderle più pronte, e atte ad abbracciar le piante, e dargli tosto in maggior copia il dovuto necessario incremento. In quanto alla profondità, e grandezza delle buche nelle terre forti, molto legate, e costipate insieme, si facciano larghe tre braccia per tutti i versi, e due profonde; e nelle sottili, leggieri, e di sua natura sciolte, si facciano due braccia larghe, e due profonde, e forse meno, secondo la loro qualità; che in questo pure ci vuol cognizione, per non far delle spese superflue, come accade sovente in tutti quei lavori guidati dalle Persone poco pratiche, che non fanno, nè possono distinguere la qualità, nè la positura del suolo, che sono due cose di somma importanza; poichè dovendosi piantare i Castagni in luoghi elevati, dove naturalmente l'acque piovane portano via della terra, onde sempre si ab-

bassa la superficie del suolo . In questi luoghi si facciano le buche più profonde , e si piantino un poco più al fondo i Castagni : nè si lasci , per quanto sia possibile , di regger la terra per mezzo di rattegni , e di fosse fatte in luoghi propri , affinchè rompino il corso dell' acque ; e facciano quelle il deposito della terra . Tutto il contrario in alcune piccole vallicelle , e luoghi naturalmente bassi , dove facilmente vi scende della terra portatavi dalle medesime acque piovane ; qui vi si facciano le buche meno profonde , e si piantino più a galla i Castagni , per la ragione che sempre si va alzandovi la terra .

Veniamo adesso al modo di piantarli , allorchè sieno sbarbati diligentemente dal Vivaio con tutte quante le loro barbe sane , e senza alcuna lacerazione . Io dico così , perchè siccome è prima massima di ogni architetto , che ami di fabbricare all' eternità , cercare stabilità nella base , e sodezza nel fondamento , così appunto in quelle piante , che non si attaccano senza barbe , come sono i Castagni , di cui parliamo , si cerchi sopra di ogni altra cosa che sieno ben guerniti di sane , e robuste barbe , essendo questa la base fondamentale di tutte le piante , poichè da queste dipende l' anticipato e valido attaccamento , la celerità del crescere , la stabilità della salute , e la loro lunga durata , e per conseguenza l' abbondanza delle loro annue rendite .

Sbarbati che sieno dal Vivaio , si taglino immediatamente tutte le loro rame sopra l' innestatura , all' altezza di più di tre braccia , e imbrattate le barbe con lo stanco vaccino , o pecorino sfatto con acque , affinchè più facilmente si attacchino , e si uniscino con la terra , facendosela subito propria , e messa della slipa , o altro frascone verde nelle buche in tempo che la terra non sia troppo bagnata , si piantino i Castagni in maniera che non restino al fondo più di mezzo braccio , considerato l' abbassamento di più di un palmo , che fanno alle prime piogge , per la ragione della terra smossa , sollevata di fresco ; si stendino diligentemente le barbe per il loro verso naturale , mettendogli intorno della terra scelta più leggiera , e attiva che sia possibile , senza pigliarla niente affatto , dando a ciascheduno uno stajo di concime sostanzioso , e bene smaltito .

Nè

Nè si dica che il governare i Castagni sia una cosa di più quando abbiamo di sicuro, che rendano quella spesa più che a ragione di cento per cento, perchè, subito attaccati, si approfittano di quel governo datogli a tempo, pigliando immediatamente un'anticipata, e ottima disposizione per crescere con la maggior celerità, e farsi tosto robusti, e fruttiferi. Ond' è che senza questo valevole aiuto molti s'indeboliscono, e prosciugansi in maniera che non concludono mai nulla, appunto come fanno i Figliuoli di quei Padri, che per mancanza di comodo, ovvero (siam permeso il dirlo) per spender poco, gli allattano, gli sostentano, e nutrono malissimo; e questi poi son quali uomini così miserabili, e infelici, nel personale, che non possono mai aver robustezza, nè attività, nè forze capaci di resistere che a fatiche leggere, e cose di poco conto, e servono al mondo, e a se medesimi più d'incomodo, che di sollievo. Così, e non altrimenti succede nella maggior parte di quei Castagni, che si piantano senza alcuna sorta di governo, volendo che la sola virtù della terra serva anche da principio a quelle piccole piante, come le fossero grosse, ben dilatate, e già assicurate con le loro barbe. E per meglio persuaderci del vantaggio considerabile del governo necessario in particolare alle piante giovani, osserviamolo in pratica in tutti quei Castagni, Ulivi, Fichi, Gelsi, Viti, e simili altre piante, che sono intorno ai Cortili delle Case dei Contadini, e vedremo la differenza ben grande, che passa da queste a quelle piante, che sono nelle selve, e nelle coltivazioni lontane dalle case, non solo nella loro grossezza e robustezza ma quel che più importa, nella maggior quantità del frutto, che rendono ogni anno; e pure non vi è altra ragione che quella delle terre più ingrastrate per la vicinanza delle case, delle stalle, e de' concimi.

Nè si finiscano di riempire affatto le buche prima del principio del mese di Luglio, acciò le barbe possano sentire più anticipatamente il caldo della Primavera, per mezzo del quale si risvegliano, si attaccano, agiscono, e crescono con maggior celerità, facendo nella parte più bassa un taglio nella sponda della buca, onde possino subito scolare, e andarlene l'acque piovane; perchè restano così subito troppo coperte dalla

dalla terra, sentono molto più tardi il caldo, e intanto restano oppresse, e s'illanguidiscono per la soverchia umidità, e perdono la loro buona, naturale, e sana disposizione, massimamente quando s'incontra la primavera fredda, e piovola; onde ne segue che quelle piante messe troppo al fondo, si attaccano così lentamente, che vi vogliono molti anni prima che ripiglino un poco di forza, e di robustezza, e la maggior parte non si rimettono mai in stato di prometterci nè pure medietarie speranze; e di qui è, che si vedono per le selve piantati moltissimi Castagni, e la maggior parte per essere attaccati solamente in apparenza, a poco a poco si perdono affatto; altri restano così piccioli, deboli, e miserabili, che non rendono mai nè pure la quarta parte di quel frutto, che dovrebbero; e qualche duni, ma pochi, pochissimi son quelli che per accidente si vedano venire in maniera, che promettono sicure, e anticipate speranze: è certo, che se faremo bene i conti, osserveremo, per esempio, che di un centinaio di Castagni piantati con la sola assistenza de' Contadini, ve ne faranno solamente dieci, o dodici, e forse meno ragionevolmente buoni, e tutti gli altri in stato di farne pochissimo, o nulla di capitale.

Io considero moltissimo quegli uomini, che fanno una coltivazione di qualche grosso numero di piante, che si attaccano tutte francamente, e crescono altresì ugualmente in maniera, che pajano tutte sorelle di un medesimo tempo, e difficilmente si distinguono una dall'altra come accade quali in tutt' i parti gemelli. Questa sorta di coltivazione di piante tutte uniformi, robuste, veggenti belle, agguagliate, e fruttifere, fanno subito conoscere, che non sono state fatte a caso, ma da persone capaci, pratiche, e intendenti, e rendono anticipatamente tutto il frutto possibile, fanno un bellissimo vedere, e danno a i Padroni nel medesimo tempo molto piacere, e animo per coltivare.

Resta adesso ch'io dica altre necessarie, e utili considerazioni da farsi, e praticarsi quando si piantano i Castagni, per ben appropriare le loro qualità al Clima, e al suolo, acciò rendano il frutto più perfetto, e in maggior quantità. Sappiasi dunque in primo luogo, che le Castagne chiamate marroni, e molliane,

vogliono le sponde basse, calderne, e bene esposte all'aria di Levante, e Mezzogiorno, e composte di terra pastosa, grassa, profonda, e attiva, poco atta a pigliare eccessivo il caldo, come sono le terre forti, che per il caldo facilmente si aprono, e altre chiamate galestre, o calastrine, molto soggette al troppo asciutto-re, queste ancora sono impropriissime per le suddette due qualità di Castagni. Le Carraresi, o, come altri dicono, Cardaresi, o Carpinesi fanno molto bene tanto nelle Colline alte, che nelle sponde basse, purchè sieno in terre sane, pastose, e leggiere, ancorchè vi sia mescolata della sabbia; ma vorrebbero le sponde volte all'aria di Levante e Mezzogiorno, benchè facciano ragionevolmente anche all'aria di Tramontana; essendo queste le più fruttifere di tutte l'altre, e facili a rafferma- re ogni anno una copiosa raccolta. Parlando delle Pastineli, Montanine, selvatiche, e di altre qualità meno stimabili, queste resistono un poco più dell'altre anche ne' luoghi esposti all'aria di Tramontana, e nelle terre forti, e atte a pigliare eccessivo il caldo; siccome in quelle chiamate galestro, o calastrino, e in altre terre giglie, e gialle, molto forti ancorchè sieno un poco viziose: ma è altresì vero, che fanno molto meglio all'aria di Levante, e Mezzogiorno, e nelle terre sane, pastose, e profonde.

Parlando in ultimo delle considerazioni da farsi, quando si visitano le selve per dissegnare le fosse, o buche ne' luoghi mancanti di castagni; è da sapersi non esser questa una cosa da fidarsi totalmente a i Contadini, che non fanno riflettere, nè considerare giustamente; onde le piantano a caso, dove così spesso che in pochi anni si contrastano insieme, e dove tanto lontani uno dall'altro, che si vede poi in pratica che ve ne mancano più della metà, perchè quei Contadini, o altri lavoratori non hanno avuto in vista altro che la facilità della lavorazione; e quel ch'è peggio, ne piantan molti in luoghi così impropri, che in breve tempo restano scalzatti, e affatto perduti. E poi si dice facilmente, come ho sentito più volte da molti Signori: io posleggo una gran quantità di Paese di Selve, vi ho piantati moltissimi Castagni con grosse spese, e ne cavo pochissimo frutto, come se il nome di Selve, e di spese mal fatte dovessero empire i Magazzini di
fa-

farina; onde bisogna pigliar maggior lume, distinguersi, e credere, che per raccoglierne molta, è vero che vogliono esser Selve, ma piene di castagni robusti, e fruttiferi, e non con pochissimi, miserabili, cattivi, e poco appropriati al clima, e al suolo, come ne ho vedute più volte in occasione di visite, spogliate quasi affatto di castagni, benchè fossero luoghi propri tanto per la positura, che per la qualità del suolo, quantunque in quei Paesi fosse già passato in giudicato, e considerato quei terreni come propri, miserabili, e cattivi.

Le Selve, che ordinariamente restano mal provvedute di castagni, la maggior parte sono in luoghi lontani, e per le stessi incomodi: e quei Contadini, che ne hanno la cura; le visitano pochissime volte l'anno, e quasi sempre ne' giorni festivi, come per una loro usanza, e consuetudine, molto meno quelli che soprintendono, e quasi mai i Padroni; e quelle poche visite, le fanno sempre in tempo vicino al cader delle castagne, senza uscir dalle strade più comode, dando una semplice occhiata all'imminente raccolta, voltandole frettolosamente le spalle; nè i Padroni (siami lecito il dirlo) ci si fissan gran cosa, o sia per il poco genio, o perchè considerano questa loro entrata come una cosa di più, quando andrebbe considerata forse più dell'altre, mentre viene in casa con minor spesa, e con minori incomodi. Io parlo così, perchè sono amante della verità, e della ragione, e non del genio, e del contragenio, che facilmente ingannano, e confondono.

CAPITOLO VI.

Del tempo, e del modo di coltivare, e allevare i Castagni piccoli ne' primi anni dopo piantati; e di pulire, e potare i grossi, con altre cose necessarie da praticarsi per la buona condotta delle Selve.

PER bene allevare, e coltivare i castagni piccoli, si riconoschino tutti esattamente subito nel primo mese di Novembre dell'anno dopo piantati; osservando tutte le nuove rame fortite su all'estremità, lasciandone solamente due per pianta le più robuste, e meglio situate, ch'è quanto dire una da una parte, e una dall'altra in giusta, e debita lontananza, acciò comincino
su

subito a disporli con buon ordine, e sempre mai lontane dal gran inconveniente della confusione; e caso che fossero venute tutte da una medesima parte, che suol qualche volta accadere, se ne lasci solamente una, la più robusta, e migliore, tagliandola tosto in maniera, che non possano facilmente sortire d' ambe le parti altre rame necessarie per comporre la pianta col medesimo ordine sopra descritto; e così si continui successivamente per tre, o quattro anni, levandogli tutti quei rami venuti contro l'ordine della natura, e altri che minacciassero della confusione, tenendogli più chiari, e aperti che sia possibile, e in maniera, che vengano ugualmente guerniti da tutte le parti di rami robusti, e fruttiferi, di sorte che datogli subito questo buon ordine, si possano più liberamente lasciar crescere a seconda della natura; perchè avendo già ripartito, e diviso ne' rami buoni il nutrimento, con ordine di giusto equilibrio, più difficilmente si diverte da quella sua natura, e giusta incanalatura, producendogli a drittura tutti ugualmente grossi, e fruttiferi tanto d' una parte che dall' altra con bella, e buona ordinanza. Nè voglio a questo proposito diffondermi di vantaggio, parendomi che tanto possa bastare per un ragionevole avviamento, mentre si tratta di piante ordinarie, che fanno sempre tutto il loro frutto nelle vere cime delle rame.

In quanto alla condotta da praticarsi riguardo alla potatura necessaria per i Castagni grossi, è da sapersi, che tutti quei Contadini, che hanno delle selve commesse alla loro cura, dovrebbero dividerle in tre partite, e potarne ogni anno la terza parte subito cadute le Castagne, ovvero nel mese di Marzo susseguente, di maniera che ogni tre anni restino puliti, e potati tutt' i Castagni; e compito il turno si seguiti successivamente con questo medesimo ordine, levando affatto tutt' i virgulti selvatici, che nati fossero intorno a' Castagni già sopra alle loro coppaje, e per il dosso del fusto, con tutte le rame false, languide, inferme, e morte; acciò non si perda inutilmente niente di nutrimento. Io son più che persuaso della disapprovazione di queste cose, massime dalle persone di corto intendimento, che disprezzano subito alla cieca l' applicazione, parendogli cosa difficilissima a conoscersi le diverse qualità delle

delle rame, e quasi impossibile a praticarsi; quando in fatti è tutto il contrario; perchè quelle persone, che hanno poco di cognizione, e di pratica, con una semplice occhiata le distinguono, e le praticano con altrettanta facilità, e con pochissimo perdimento di tempo. Questo modo di poterli ogni tre anni, fa subito, che sieno molto più belli e aggradibili alla vista, e che rendino ogni anno più sicure, e abbondanti le loro raccolte.

Io ho vedute più volte in occasione di visite fatte nel Modanese, moltissime, e bellissime selve, dove quei mezzadri puliscono, e potano ogni tre anni con somma avvedutezza tutti i loro Castagni, appunto come fanno agli Ulivi i Contadini delle vicinanze di Firenze; e per verità tengono così bene quei Castagni, che non vi si vedono che le sole rame da frutto, e da legno, addattate con tutta proprietà alla forza, e al vigor delle piante; ma è altresì vero, che quelle Selve rendono molto più delle nostre, per essere da per tutto ugualmente piene di buoni, e robusti Castagni, benissimo appropriate le qualità al Clima, e al suolo, e molto meglio tenui di quelli delle Selve dello Stato Pistoiense, Lucchese, Pesciatino, ed altri luoghi della Toscana.

Parlando finalmente delle cose più importanti, e necessarie da praticare per la buona condotta del suolo, affinchè l'acque delle grosse piogge non portino via molta terra, si divertano per mezzo di fossette fatte ad ogni corto tratto in luoghi propri, perchè non si può fare una ricetta, e descrivere appunto dove sia il bisogno, riguardo alla diversità delle figure, che fa la positura del suolo; ond'è necessario di passeggiarlo, e riconoscerlo minutamente, e osservare con attenzione dove si uniscono molte acque insieme, per cominciarvi dalle corrosioni, e piccole scanalature, che in breve si fanno grandi e profonde, e più difficilmente si rimediano. Veduti adunque questi cattivi principj vi si pongano tosto gli opportuni rimedj, con farvi de' rattegni, e delle fossette, che divertino le acque per più versi, in maniera che se ne uniscano insieme sempre meno che sia possibile, e in modo che facciano ne' luoghi più bassi il deposito della terra; essendo verissimo che le acque ben divertite, e prese con dolcezza migliorano moltissimo le condizioni del suolo, non solamente nelle selve, nelle

nelle boscaglie, e in tutti gli altri luoghi montuosi, ma molto più nelle pianure basse, dove in poco tempo fanno che il suolo muti totalmente natura, e cresce molto di prezzo. Laddove lasciate scorrere capricciosamente a seconda della cattiva politura del suolo, senza tenerle rivedute, diverte, e guidate, impegnate che sieno, fanno in breve tempo Forre, o come altri dicono, Borri, o canali così grandi, e profondi, che passano torrenti, massimamente nelle terre leggere, e di sua natura sciolte; onde cagionano grosse smosse al terreno adiacente, e rovinano sì fattamente i beni, che difficilmente si possono rimediare senza soffrire l'inconmodo del lucro cessante, e del danno emergente.

Si facciano dunque ne' luoghi più sodi e più stretti de' detti canali delle grosse terre, o sieno rattegni di muri a secco, fatti stabilmente con buoni sassi ben commessi, e legati insieme a guisa di lunette, con la centina, e la terra in dentro, opposta al corso, e alla violenza dell'acque, e al pelo della terra, che necessariamente vi depongono le medesime acque in occasione di piogge, e cominciata questa depozizione, vi si piantino immediatamente dentro alle terre, a' suoi propri, e rispettivi tempi, delle Pianta di Nocelle, Salci, Vetrice, Ontani, Alberelli, e simili, che vi si attaccano facilmente, e crescono prestissimo, e interrompono il corso delle acque, e facilitano la depozizione, che ferma subito le smosse, e assicura i Beni, e le Pianta, e se ne cavano utili ragionevoli da' luoghi non solo affatto perduti per se medesimi, ma sempre più allargandoli, e profundandosi i suddetti canali, servivano di maggior incentivo alle smosse, e alla rovina delle Selve, e di tutti gli altri Beni adiacenti, in particolare a quelli composti di terre per se medesime leggere, sciolte, e situate in posatura scolcesa e dirupata.

CAPITOLO VII.

Del tempo, e del modo di preparare la Terra per seminarvi le Castagne per uso de' Pollonetti, ovvero per piantarvi i Castagni piccoli sbarbati dal Vivajo.

IL più vero tempo di preparare la terra per seminarevi le Castagne per uso de' Pollonetti, ovvero per

pianarvi i Castagni piccoli, sbarbati dal Vivaio, egli è dal mese di Novembre in tempo, che non sia troppo bagnata, scalfandola, e come altridicono, diveltandola andatamente per il meno quattro palmi al fondo, mettendo la superficie del suolo in positura tale, che non possa esser portata via facilmente dall'acque piovane, facendovi ad ogni corto tratto i suoi necessari regni, e fossette, che ricorrono, e si uniscano una con l'altra per dove possano scolare, e andarsene l'acque superficiali col dovuto riguardo; ma in quei luoghi situati in positura molto scolcesa, si facciano un poco più vicine una all'altra, affinchè si uniscano insieme meno acque, che sia possibile, facendole sempre sopra la terra soda, e non diveltata, perchè l'acque vi facciano meno corrosione: e perchè i ripartimenti del suolo rieschino fatti in luoghi propri, e possano andarsene felicemente l'acque piovane, ch'è cosa di somma importanza, secondo me si riduce a necessità di pensarvi preventivamente, pigliarne le opportune misure, e fissare i luoghi, perchè facendo i lavori a caso, è accidentente, che riescano bene, e non si moltiplichino le spese.

Diveltata che sia la terra, e fatti i ripartimenti con le divelte regole, si puliscano esattamente da tutte le radici, e sritolate le zolle e appianato il suolo, vi si mettano subito le Castagne perfettamente granate, lontane circa un palmo una dall'altra coprendole per l'altezza di quattro dita di terra, governate che sieno con una piccola porzione di concime sostanzioso, e bene smaltito; e cresciuti un poco i Castagni, si tenga pulito il suolo dall'erbe, spine, roghi ec. che facilmente vi nascono; e passati tre, o quattro anni si sbarbino diligentemente tutt' i superflui, piantandoli in altri luoghi di terra preparata, come sopra si è detto, per uso di nuovi Pollonetti.

Nella medesima maniera sopra descritta si possono fare i Pollonetti con buonissimo esito anche ne' mesi di Febbraio, Marzo, e al principio d' Aprile, purchè le Castagne sieno state ben conservate, nè abbiano patito. Ma è da sapersi, che sarebbe molto bene seminarle subito diveltato il terreno, o pochi giorni dopo, perchè accostandosi a poco a poco la terra diveltata, e sollevata di fresco, nel serrarsi, e unirsi che fa dolcemen-

se insieme con le medesima, si fa subito vera madre seconda, onde nascono più facilmente, e le barbe agiscono tosto con maggior attività.

Parlando in ultimo del modo, e del tempo di fare i Pollonetti per mezzo di Castagni piccoli, allorchè sieno stati tre, o quattro anni nel Vivaio si sbarbino diligentemente con tutte quante le loro barbe sane, e senza lacerazione, e subito diveltata, e preparata la terra, come sopra, in tempo che non sia troppo bagnata, vi si piantino i Castagni lontani quattro palmi in circa per tutt' i versi uno dall' altro, e in maniera, che non restino al fondo più di mezzo braccio, tagliandoli prima i loro fusti all' altezza di quattro, o cinque palmi, e più, e meno, secondo la loro grossezza, e robustezza, affinchè non sieno agitati, nè sbattuti da' venti, e possano attaccarsi più validamente; e sappiasi, che nelle terre leggiere, e forti, e asciutte sarebbe bene piantarli nel mese di Novembre; e nelle forti, umide, e grasse nel mese di Marzo, e al principio d' Aprile, sempre col dovuto necessario riguardo, che non sieno troppo bagnate.

Il modo di fare immediatamente i Pollonetti con i Castagni piccoli di tre, quattro, e cinque anni, ho veduto più volte in pratica, che riesce più sicuro e più utile, che seminarvi le Castagne, mentre si possono seminare in qualche partita di terra scelta, grassa, profonda, e attiva, dove sia il comodo dell' acqua che in tre o quattr' anni vengono così belli, anticipati, e robusti, da poterli trapiantare ne' Pollonetti con esito felicissimo; essendo cosa certa, che quella prova, che fanno in tre o quattr' anni in un Vivaio di terra scelta, non possono mai farla neppure per la metà in quelle terre destinate per i Pollonetti, che sono sempre più rozze, e pigre, nè vi è il beneficio dell' acqua; onde torna molto meglio piantarvi subito i Castagni allevati nel Vivaio, già fatti robusti, e ben guarniti di pronte, e attive barbe. Piantati che sieno diligentemente in tempo proprio nella coltivazione già preparata per i Pollonetti, si attaccano, e crescono immediatamente, e sono meno soggetti ad essere danneggiati, e guasti da' Bestiami. Passati due, o tre anni dopo piantati, si taglino diligentemente i loro fusti nel

mele di febbrajo al pari della superficie del suolo , e saremo sicuri , che alla prima stagione ne risorgeranno dello loro ceppaje vermene bellissime , ed avremo già fatti , e assicurati i Polionetti . Laddove seminandovi le castagne , non siamo così subito sicuri del buon elito , perchè nascono più difficilmente che nel Vivajo , e crescono altresì più stentatamente , e adagio , oltre dall' esser poi dopo nate quelle piccole , e tenere piante , particolarmente il primo anno , molto soggette all' ingiurie dell' asciuttore della State , che facilmente l' interrompe , e sosferma l' azione , e talvolta molte se ne perdono affatto : leccandosi , quando non si faccia un divetto andantemente profondo più di due braccia , perchè la lavorazione fatta profondamente , massime nelle terre leggieri , ho veduto in pratica , che serve di non ordinario , e anticipato vantaggio non solo alle piante , ma allo seme ancora ; essendo verissimo , che la siccità della State , ch'è quanto dire il caldo eccessivo , è il maggior nemico , ch'abbiano le piante nelle loro barbe , perchè asciugandosi la terra , resta subito affatto sterile e infecunda . *Terra sine aqua . In Psalm. 142.*



TRATTATO¹⁹⁹ DE' CIRIEGI.

Del tempo, e del modo di fare i Vivaj di Semi, o, come altri dicono, di Noccioli di Ciriegi.

CAPITOLO PRIMO.

Quantunque si trovino facilmente per i Cigli de' Beni coltivati, ed in altri luoghi della Campagna, quantità di Ciriegi piccoli mediocrement, buoni per trapiantare stabilmente nelle coltivazioni, nati dalle Ceppale, e dalle barbe superficiali de' Ciriegi grossi, e talvolta dal seme delle Ciriege, non ostante credo cosa utilissima, e quasi necessaria di dover consigliare, come so, ognuno che voglia far negozio di questa sorta di Piante, e di frutti, a fare apposta i Vivaj di semi nella maniera che vado insegnando nel presente Capitolo; essendo questi senza paragonarli migliori mentre vengon subito per tutt'i versi, naturalmente guerniti di sane e più attive barbe, che sono, come altrove ho detto, il sostegno, e la base fondamentale di tutte le piante, e per conseguenza più vegete, e capaci di migliore e più anticipata riuscita; massime quando il terreno scelto per i Vivaj, sia in luogo, che possa godere il beneficio dell'acqua nella State; perchè ormai assicurato dall'esperienza, che tutte le piante, che vengono dal seme, loro vero, e unico principio, sono indubitatamente le più ubertose, le più fruttifere, e le più durabili; e certo, per chi avesse l'occhio ben fino, e di sottilissima vista, riconoscerebbe agevolmente nel seme tutto l'ordine della Pianta, ch'è quanto dire la copiosità, e attività delle barbe, la grandezza del tronco, la vastità de' rami, la molteplicità delle frondi, la vaghezza de' Fiori, l'ubertà de' Frutti, il contorno, e la gloria di tutto l'Albero, contenuto a parte a parte distintamente nel seme come in virtù.

Dunque per fare i Vivaj di piante di Semi, o vogliam dire, di Noccioli, si scelgano dalle Ciriege selvatiche perfettamente mature; che sono i più attivi,

e migliori; eccettuati quelli delle Ciriege Marasche, o, come altri dicono, Marine, da' quali ne vengono sempre piante piccole, e poco robuste, perchè sono una specie affatto diversa da tutti gli altri Ciriegi, quasi niente atti per innestarvi altre qualità di Ciriegie Rimabili; e dopo asciugati, si conservino sino al più vero tempo di seminarli, che vale a dire dal principio del mese di Ottobre fino a tutto Novembre. In questo medesimo tempo si scelga una partita di terra naturalmente, e perfettamente sana, leggiera, pronta, attiva, di buonissimo fondo, esposta più che sia possibile all'aria di Levante, e Mezzogiorno, e vangata, zappata non meno di tre palmi al fondo, vi si facciano i solchi col marrone distanti poco più d'un palmo uno dall'altro, e governati ragionevolmente con una qualità di concime veramente sostanzioso, trito, e affato smaltito, vi si mettano i Semi delle ciriege in giusta distanza, coprendoli leggermente, per l'altezza di quattro dita di terra in tempo che non sia troppo bagnata.

Venendo poi la Primavera, ch'è quanto dire circa alla metà del mese d'Aprile, pochi giorni prima, o dopo, secondo la qualità del suolo, del Clima, e della stagione più o meno anticipata, o posticipata, allorchè si vedono cominciare a nascere, si pulisca subito esattamente il terreno dall'erbe, sarchiandolo, e smuovendolo con avvedutezza, per metterlo in maggiore attività, senza pregiudicare alle piante, e impedire al possibile la nascita delle nuove erbe, molto pregiudiziali. Indi cresciute all'altezza d'un palmo, si ricalzinno diligentemente con la Terra che resta fra un solco e l'altro, tenendola spesso sarchiata, e pulita, continuando fino al terz'anno: ed allora avremo sicuramente Vivai di Ciriegi così belli e robusti, da trapiantarli stabilmente nelle coltivazioni, con sicurezza che facciano più prova questi in quattro o cinque anni, di quel che possano mai fare in dieci quelli venuti dalle Ceppaje e dalle barbe de' Ciriegi grossi, ovvero nati per la campareccia casualmente dal seme, per la ragione chiarissima, e di sommo peso, d'essersi già prosciugati, illanguiditi, e perduta la loro attività; ond'è che difficilmente, per non dire impossibile, senza gran perdimento di tempo, e senza una sollecita e distinta col-

tura, non potranno mai farsi piante grosse, robuste, e fruttifere, come fanno in breve tempo quelle che si cavano dal Vivaio, già ubertose, e con tutte quante le loro barbe, sane e senza lacerazione; e di què, che più facilmente abbracciano, e si fanno subito propria quella terra, ove si trapiantano, attraendo immediatamente tutto il dovuto necessario incremento, facendosi sempre vieppiù robuste e fruttifere, senza un minimo perdimento di tempo, o interruzione di azione.

CAPITOLO II.

Delle qualità del clima, e della Terra più atta, e propria per i Ciriegi che si piantano stabilmente nelle Coltivazioni.

LA Terra più atta, e propria per uso de' Ciriegi che si piantano stabilmente nelle Coltivazioni, è necessario che sia in paese calderno, e non totalmente esposto all'aria di Tramontana, per avere le piante, ed i frutti più anticipati, e meno imperfetti; altrimenti sono pochissimo stimabili, poichè avanzandosi la stagione si trovano facilmente quasi dappertutto, e quel ch'è peggio, mentre non sieno bene appropriate al clima, e al suolo le qualità delle ciriege, è, che più facilmente sono imperfette, e generano in se stesse i vermi.

Sappiasi dunque, che la terra più atta, e propria per le ciriege Marchiane, Napolitane, Brancoline, Duracini, Falombine, Corniole, e simili di razza dura, è necessario che sia perfettamente sana, per l'acque interne, attiva, sottile, leggiera, e un poco arenosa, o sabbionosa, e di buonissimo fondo, nè mai troppo grossolana, pesante, e viziosa per la soverchia umidità dell'acque interne, ed il clima ventilato, e salubre, altrimenti questa sorta di piante vengono sempre languide, stentate, e poco durabili, e producono minor quantità di frutti, più tardi, più imperfetti, e di cattivo sapore. Vi sono altre diverse qualità di Terre atte, e proprie per le ciriege chiamate S. Giovanni, S. Piere, Imperiali, Rose, Moscadelle, Visciole, e simili di razza più delicata. Dissi altre qualità di Terre tonde, ch'è quanto dire, mediocrement grossolane, di più e di versi colori, come rossiccie, gialle, scure, cenerine,

ed

ed altre quasi di color d'aria, e di ruggine, nelle quali, benchè alquanto grossolane, e pesanti; purchè non sieno viziose, oppresse, e addormentate per l'acque rinchiusite, e stagnate, vi fanno ragionevolmente bene questa sorta di piante, ma un poco più adagio, e non di quella grossezza che fanno nell'altre terre più attive, e leggiere, che sopra si è detto; e fanno altresì le Ciriege forte più piccole, e non così anticipate, ma più sane, e di miglior sapore, ma è da sapersi che neppure in questo non si può fare appunto una ricetta, e descrivere esattamente le diverse qualità della terra, ed altre utili considerazioni, che dipendono, più che d'altro, dalla cognizione, e dalla pratica che dovrebbero aver gli Uomini, che soprintendono alla Campagna nelle cose appartenenti alla condotta della buona Agricoltura.

Ho fatto solamente menzione di alcune poche qualità di Ciriege le più stimabili, pervenute a mia notizia, ed ho passate sotto silenzio molte altre qualità, come selvatiche, miserabili, e di cattivo sapore, considerate, e ricercate unicamente dalle persone di corta vista,

CAPITOLO VIII.

Del tempo, e del modo di piantare i Ciriegi stabilmente nelle Coltivazioni.

IL più vero tempo di sbarbare i Ciriegi del Vivajo, e piantarli stabilmente nelle Coltivazioni, è da sapersi, che ne' paesi caldi, e composti di Terre più attive, leggiere, e di poco corpo, egli è dal principio fino a tutto il mese di Novembre; laddove in altri paesi meno caldi e di terre più grossolane, e pesanti, ritengono in se stesse maggiore umidità, perlocchè nella rigidezza del Verno stanno più facilmente oppresse, e addormentate, e più difficilmente nella Primavera ripigliano la loro necessaria dovuta attività. In questa sorta di Terre si piantino i Ciriegi dal principio del Mese di Marzo fino alla metà d'Aprile, allorchè si vedono le stagioni belle, e delle Terre asciutte in maniera da potersi travagliare senza apportarle minimo pregiudizio.

In quanto al modo di piantarli: Sbarbati che sono diligentemente dal Vivajo con tutte quante le loro bar-

be,

be, e fatte le fosse più di due braccia larghe, e due profonde, con la dovuta distinzione, che nelle Terre serrate, e collimate, dove si trova il pancone sodo, sono necessarie più larghe, più profonde, e sanate perfettamente dall'umidità per mezzo diogne sotterranee, altrimenti i Ciriegi presto patiscono; dove che nelle terre naturalmente sciolte, o per esser già state travagliate, o per le deposizioni fattevi dall'acque (che sono le migliori per questa sorta di piante) non è punto necessario che le fosse sieno così larghe, e profonde, per la ragione che quella sorta di Terre sono già in attività, e più facilmente trabevono, e passano la superfluità dell'umido.

Fatte dunque che sieno, e messavi dappertutto andatamente una ragionevole quantità di stipa, o altro frasame verde, col dovuto riguardo, che in tutti quei luoghi appunto ove si debbono mettere i Ciriegi, per lo spazio di due, o tre braccia in circa vi si metta il doppio più di stipa per maggiormente facilitare il passaggio, e lo scolo dell'acque piovane ne' primi anni. Indi si riempiano colla Terra già scavata, mettendo sempre la migliore, e più attiva in quei luoghi destinati per i Ciriegi; e messavi sopra una giusta porzione di concime sostanzioso, e mescolato che sia un poco con la Terra, si piantino i Ciriegi in maniera che non restino al fondo nulla più di due palmi, senza pigliare nè calpestare niente affatto la Terra, allargando tutte le barbe per il loro verso naturale, affinchè più facilmente comincino ad agire con la dovuta vivezza, e celerità.

Circa poi alla lontananza dall'una dall'altra pianta, farebbe bene che fosse per lo meno venti, o ventiquattro braccia, mettendo delle viti ne' mezzi, per tenerle ad uso di bronche, o in altra maniera creduta più propria; poichè i Ciriegi vengono notabilmente grossi, e apportano non ordinario pregiudizio alle sementi con le barbe, con l'ombra, e tal volta con le Ciriege, mentre si colgono non solamente da' Padroni, ma furtivamente ancora d'altre persone considerate, senz'alcuna sorta di riguardo, in tempo appunto che le robe sono avanzate in maniera che passeggiandovi sopra si guastano quasi affatto.

Nè voglio lasciare d'avvertire, come so, ad ogn'uno, che mentre pianta Ciriegi, veda di metterli vicini

cini alle Case, ed in altri luoghi poco atti per le sementi, come, per esempio, in vicinanza di Canali, Cortili, redole, terre prative, accanto alle vie pubbliche, e simili; che ve ne sono moltissimi in tutte le Possessioni, nè mai, per quanto sia possibile, in luoghi che possano adombrare i Beni seminativi per l'aria di Levante, e Mezzogiorno, per approfittarli, e godere l'utile di questi frutti, con meno pregiudizio che sia possibile.

Nè si lasci mai di scalzarli per lo meno una volta l'anno ne' mesi di febbrajo, o di Marzo, tagliandoli tutte le barbe che sortite fossero fra le due terre, con tutti i virgulti, che sogliono facilmente pullulare all'intorno, per obbligare le principali barbe a fare tutta la loro azione più al fondo che sia possibile; altrimenti questa sorta di piante, per un certo naturale, cominciano subito a fare, ed dilatare su a fior di Terra una grossa, folta, e intricata Geppaja di barbe, dalle quali ne nascono tosto quantità di virgulti, onde riempiono sì fattamente il suolo con pregiudizio notabile delle sementi, nelle Viti, ed altre Piante, che lor sono appresso, talvolta di se medesime, che più facilmente periscono,

CAPITOLO IV.

Del tempo, e del modo d'innestare i Ciriegi; e della maniera di regolarli col taglio.

IL secondo, o terzo anno dopo piantati nelle coltivazioni, allorchè si vedono assicurati, di robustezza, e grossi più che un manico di vanga, s'innestino addirittura in luogo proprio, o più alti che sia possibile, nelle seguenti stagioni, cioè, dalla metà d'Ottobre alla metà di Novembre, ovvero dalla metà di febbrajo alla metà di Marzo, che sono i tempi più propri per l'innestatura di queste Piante. Dissi più alti che sia possibile, lasciandogli ancora qualche piccola sortita sotto l'innestatura, perchè tagliandogli basso affatto tutto il fusto, senza lasciarvi nessuna sorta d'uscita, o di sfogo, si opprime, e addormenta di molto la sorgente; ond'è che fissandosi la virtù vegetativa, accade che in molti si perdono subito affatto i Pedali, o pure s'illanguidiscono in maniera che periscono poi l'anno dopo, o l'altro susseguente, come ho osservato più volte in prat-

prattica. S'innestino dunque, come sopra si è detto, spaccando nel vero mezzo il fusto, per incastrarvi, e insinuarvi validamente due mazzette domestiche, una per parte, con gli occhi che guardino al di fuori, di quella razza che più si desidera, e eredita più propria, e confacente alle qualità del suolo, e del clima, per aver le ciriegie di miglior perfezione. Indi si leghino con tiglie di Canapa pettinata, o altro legame proprio, còprendoli con la solita mistura da Innessi; e giunti circa alla metà del mese di Maggio susseguente, si sciolgano, affinchè possano più liberamente agire, e crescere con maggior comodo.

Toccante poi lo stradamento da darsegli col taglio, è da sapersi, come nel mese di Novembre del secondo anno dopo innestati; ovvero dalla metà di febbrajo, alla metà di Marzo, si rivedano esattamente, tagliando con diligenza tutte quelle fortite che andassero al di dentro minacciando confusione; ed altre, che dessero certo segno di volersi troppo ingrossare, e pervertire l'ordine, il più comune, che suol tener la natura de' vegetabili nella produzione de' bronchi; affinchè il nutrimento resti più facilmente equilibrato; e intanto le piante comincino a guernirsi ugualmente per ogni verso di rami robusti, e fruttiferi: cosa che ne' Ciriegi accade quasi naturalmente per la ragione che la natura è più regolata, e meno capricciosa che in molte altre Piante; e così si seguiti successivamente, tenendoli sempre puliti, netti, e disimbarazzati da tutte le rame inutili, inferme, morte, e rotte nell'atto di cogliere le Ciriegie (ch'è uno de' grossi mali che accade in queste piante) massime alle mani di Donne, ragazzi, ed altre persone disavvedute, che non hanno altro in vista che di tirare a sè il Frutto.

Uno de' motivi, per cui mi son indotto a fare questo breve trattato de' Ciriegi, è, perchè ho veduto in pratica l'utile molto abbondante che rendono, nè fallirebbero mai se la loro fioritura, (che fanno ogni anno copiosissima) fosse meno delicata, e non tanto anticipata, per lo che si rende qualche volta soggetta alle ingiurie della stagione di Primavera; ma contuttociò non potrà mai negarsi che non rendino ragguagliatamente ogn'anno un'utile assai considerabile, e per la quantità, e per la stagione, in cui matura, appunto-

punto in tempo , che suol dirsi comunemente , fra la nuova , e la vecchia raccolta , che la maggior parte de' Contadini si trova in necessità . E quel che forse non è meno considerabile , è che con un poco di avvedutezza , queste rendite si possono esiggere da' terreni , se non affatto perduti , almeno poco considerati ; nè aggravano punto i Padroni di maggior servitù , nè di Magazzini , nè di vasi , nè d'altre spese per conservarle , mentre vengono subito in contante effettivo ; e ne' paesi un poco caldi , in meno di due mesi ritirate , e assicurate dalle Gragnuole , e d'altre disgrazie , a cui restano sottoposte molte altre rendite , per il maggior tempo che stanno a maturarsi sopra il suolo , e sopra le Piante . Nè si mendica mai l'esito , quantunque sieno annate abbondanti , e paesi ben provveduti ; mentre non vi sono altre Frutta , ricercate da tutte le qualità di persone , come le Ciriegie , e perchè vengono in un tempo che ve ne sono poche altre qualità .



TRATTATO DEGLI AGRUMI.

Del modo, e del tempo di preparare il terreno, e i vasi per seminarvi i semi degli Aranci forti, e del modo di coltivarli ne' primi due anni.

CAPITOLO PRIMO.

SI scelga in primo luogo una pezza di terra sana, leggerosa, pronta, attiva, e in luogo calderno, esposta all'aria di Mezzogiorno a qualche ridosso di muraglia, dove vi sia il comodo di poterla adacquare; e dalla metà di febbrajo alla metà di Marzo, vangata che sia più di due palmi al fondo, sritolata e pulita dall'erbe, si governi da per tutto spartatamente a sufficienza col nostro solito concime bene smaltito, trito, e sostanzioso, zappato, e mescolato colla terra, e accomodata in piccole porche larghe circa tre palmi, vi si mettano i semi graniti perfettamente, cavati di fresco dagli aranci forti, che sono i migliori, in distanza di meno d'un palmo uno dall'altro; coprendoli per l'altezza d'un dito di terra renosa, leggiera e sottile, acciò possino facilmente nascere.

Per quelli poi che non hanno la terra in luogo approposito, e col comodo di poterla adacquare, pigliano de' vasi di terra ben condotta, forati in più luoghi nel fondo, mettendovi alcuni pezzi di tegoli, o altri rottami d'embrici, o stoviglie, e sopra di questi vi si metta della sipa, o altro legname verde, e minuto: cose tutte che servono per facilitare lo scolo necessarissimo alla superfluità dell'acqua. S'empiano poi i predetti vasi metà del solito concime, e metà di terra scelta, mescolata col medesimo concime senza pigliarla, come ho insegnato nel Capitolo ottavo del trattato delle piante de' Peri, mettendovi i semi degli aranci forti dalla metà di febbrajo alla metà di Marzo, lontani mezzo palmo in circa uno dall'altro, coprendoli per l'altezza d'un dito di terra, come sopra si è detto, dandoli subito una spruzzata d'acqua, acciò la terra s'unisca mag-

gior.

giornamente a' semi. Si mettano poi li detti vasi in luogo calderno esposto al Sole, e all'aria di Mezzogiorno, acciò non sentano la Tramontana, e in tanti s'osservi, se la stagione andasse molto ventosa e asciutta, s'adacquino leggermente una volta o due la settimana, secondo che porta il bisogno facendolo con la dovuta diligenza, acciò l'acqua nell'atto d'infonderla nel vaso non smuova nè sollevi la terra, e se al contrario la stagione andasse troppo umida e piovosa, si mettano i vasi al coperto, in luogo asciutto, esposto al Sole, e all'aria di Mezzogiorno, perchè la troppa umidità raffredda, e addormenta la terra; ond'è che il seme non nasce con tutto il dovuto vigore, poichè le barbe in quella terra così addormentata, si tratten-
gono, e intanto s'illanguidiscono, traggono, e consumano tutta la vivezza e lo spirito al seme, che pure s'infaciassero; nè dilatandosi quelle colla necessaria celerità per la terra resi pigra, non può mai risolversi a pullulare sollecitamente colla dovuta necessaria attività nel proprio rampollo: difetto da guardarsene in tutte le piante, ma particolarmente nelle piccole e tenere. Procurasi adunque, che sino da principio prendano una vera e sana disposizione, ch'è quanto deve desiderarsi nelle piante di quell'età.

Nati poi che siano i semi, si adacquino sempre che ne hanno bisogno quelle piccole e tenere piante, ed a misura del crescimento delle giornate e del caldo, che fattosi molto eccessivo, massime nelli mesi di Luglio, e Agosto, in tempi di estremo asciuttore, si adacquino due volte il giorno, cioè la mattina a buonora, e la sera dall'ore ventidue addietro. Ma in altri tempi meno caldi, e meno asciutti si faccia una volta il giorno, ovvero ogni due giorni, o due volte la settimana, secondo che porta il bisogno; che pure in queste ci vuol cognizione, pratica, e avvedutezza.

Passando poi al secondo anno ne' mesi di Giugno e Luglio, si taglino con forbicette, o temperino affilato tutt' i rametti, a riserva della cima maestra, acciò non facciano bivio, nè si perda inutilmente niente di nutrimento; tenendo continuamente la terra sarchiata, e pulita dall'erbe; adacquandola sempre che si vede il bisogno, acciò le piante non patiscano mai l'asciutto-
re,

re, che le priva tosto del dovuto nutrimento; e intanto si soffermano, e prosciugansi in maniera, che difficilmente ripigliano la loro perduta attività.

CAPITOLO II.

Del modo, e del tempo di coltivare le piante degli Agrumi selvatici; il terzo, e quarto anno dopo seminate.

PAssati due anni dopo che siano nate le suddette piante, e giunti al principio del mese d'Aprile, si levino dal suo primo terreno, o vaso in modo che non si stacchi la terra dalle loro piccole e tenere barbe, e si ripiantino lontane mezzo braccio in circa una dall'altra in altri terreni, o vasi più grandi, preparati che siano con le medesime regole descritte nel Capitolo antecedente; e tosto si adacquino, affinchè la terra s'accosti e s'unisca maggiormente alle barbe. Indi si metrano in luogo calderno, esposto all'aria di Mezzogiorno, e quivi s'adacquino ogni volta che ne hanno bisogno, pigliando l'acqua non molto fredda, nè cruda, ma crassa e corsiva, o riscaldata dal Sole, cominciando col darne adagio adagio una brocca al primo vaso, e al secondo, terzo, quarto, quinto, ec. ritornando poi al primo, seguitando col medesimo ordine a tutti gli altri, acciò vi penetri a poco a poco, e in maniera che abbiano tempo di pigliarla, e inzupparsi benissimo, replicando fino che non si veda uscire per i fori del fondo; ed in questo modo siamo assicurati, che restano inzuppati abbastanza, e che il caldo ben grande d'un'intera giornata non potrà mai asciugarli in modo, che le piante patiscano; di sorte che cominciano subito nella Primavera a godere, seguitando tutta la State, e la maggior parte dell'Autunno, stando in una continua, uguale, e gagliarda azione, non mai interrotta, nè trattenuta dall'asciuttore, nemico capitalissimo da guardarsene con molta avvedutezza, massimamente nella state; onde ne siegue per necessità, che le medesime piante con tal principio e mezzo, si fanno subito di un'ottima disposizione, per venire anticipatamente grosse, robuste, e durevoli.

Si sia poi attenti a tutte le nuove fortite troppo grosse, che vengono per il fusto, tagliandole immediatamente, acciò non siano di pregiudizio alla cima

maestra. E veduto, che questa eccedesse troppo in altezza, si spunti un palmo in circa sopra al luogo, dove si vuole innestare, affinchè non si dilunghi soverchiamente, nè si perda inutilmente niente di nutrimento, obbligandolo a star sempre riconcentrato in giusta lontananza, acciò più facilmente circoli, e ricircoli ben d'appresso, e a vicenda dal pedale alle barbe.

Passando poi agli ultimi giorni del mese di Novembre, si mettono per tutto l'Inverno, e parte della Primavera nelle stanze sane, asciutte, ed ariose, che abbiano le finestre grandi, voltate all'aria di mezzogiorno, dove si adacquino qualche volta anche nell'Inverno, ma sempre in tempo dolce, e piovoso. E vedranno i Giardinieri in capo a quattro soli anni di tempo le suddette piante tutte uguali, belle, vegete, robuste, e tanto grosse, da potersi francamente innestare; laddove seminate, e coltivate secondo la solita loro erronea usanza, si vedono la maggior parte crescere tanto adagio, illanguidire, e venire così stentate, che finalmente vengono a fastidio; e non potendosi più soffrire, si piglia per espediente di buttarle.

Restino adunque persuasi i Giardinieri, che la maggior parte di questo disordine deriva dall'adacquare alla peggio, dandoli ordinariamente una brocca d'acqua per vaso molto in furia, facendola traboccare a proposito, senza che abbiano tempo di poterla pigliare, e inzupparsi bene dappertutto; dimanieracchè restano solamente adatte in apparenza, ma non in sostanza; e a far de' conti giusti, è sicuro, che nella state è più il tempo, che penurino d'acqua, patiscono, e stanno vizze, che non è altro, in cui godono, si ricreano, e crescono; ovvero le adacquano troppo, marcendoli facilmente le barbe, massime a quelle mutate e messe ne' vasi con poca avvedutezza; dove i Giardinieri ordinariamente ferrano e pigliano molto più del dovere il concime e la terra, quando l'esperienza insegna, che vorrebbero essere, il primo scelto sostanzioso, bene smaltito, trito e ridotto in minutissime particelle; e la seconda spiritosa, leggiera, pronta, attiva e nulla affatto pigliata; acciò la superfluità dell'acqua possa liberamente, e immediatamente passare, poichè fermandosi e trattenendosi troppo, è cosa certissima in pratica, che opprime e addormenta il concime e la

la terra in maniera che perdono subito la loro naturas le attività con tanto pregiudizio delle barbe delle piante, che facilmente s'illanguidiscono tanto, che non concludono mai nulla, quando non periscino affatto.

Passati poi due, o tre anni dopo coltivate, e allévate, come sopra si è detto, si spiantino; e si ripiantino in altri vasi, dove si dovranno innestare; come dirò nel seguente Capitolo.

CAPITOLO III.

Del tempo, e del modo di coltivare, ed innestare le piante degli Agrumi selvatici.

QUando le divolate piante avranno tre, o quattro anni già trapiantate dal primo nel secondo vaso, si spiantino con tutto il suo pane della terra attaccato alle barbe, e si ripiantino di nuovo al principio del mese d'Aprile, una sola per vaso, già preparate colla solita terra scelta, e concime benissimo trito, e smaltico, senza pigliarlo, e all'usato modo s'adacquino subito fermate, e poste, perchè il concime, e la nuova terra s'accostino, e s'uniscano più facilmente alle barbe. Indi si mettano in luogo calderno guardato dalla Tramontana, adacquandole, e coltivandole collè dovute necessarie regole prescritte nel Capitolo antecedente; e giunti al principio fino alla metà del mese di Settembre del medesimo anno dopo piantate, ovvero al principio del mese di Maggio dell'anno venturo, che sono le due stagioni più sicure, e più proprie per innestare gli Agrumi, si facciano addirittura di quella razza, che più si desidera, facendo l'innestatura in luogo di buccia liscia, e pulita, alta più di tre palmi sopra la terra alla pianta da tenersi in vasi; ed essendo Cedrati da piantarsi in Boschetti, o altre piante destinate in piana terra, s'innestino alte quattro palmi e mezzo in circa; poichè i Giardinieri in questo modo possono liberamente scalzarle, e governarle, e zappare, o vangare la terra all'intorno; e farli tutte l'altre necessarie faccende, senza che si guastino nè rame, nè fiori, nè frutti.

In quanto poi al modo più sicuro, e convenevole per innestar queste piante, tra le molte e varie maniere, che si praticano, tre sole a mio giudizio sono le più sicure,

ture, e migliori. La prima a scudetto col suo legno attaccato alla buccia; la seconda a penna, o coronetta; e la terza a spacco, o fessolo.

Per quelli adunque, che si vogliono fare a scudetto, si scelga una mazza, venuta dall'anno avanti, che abbia l'occhio compiutamente pieno, grosso e rilevato, non valutando nulla, che abbia lo spuntuncello; perchè questi ancora si attaccano, e mettono francamente forse meglio degli altri per la ragione della maggior quantità del nutrimento, chiamato, e impegnato nell'occhio del medesimo spuntuncello, purchè questo non sia tanto grosso e lungo, che abbia pregiudicato all'occhio resolo piccolo, e troppo imprigionato: cosa da me osservata chiaramente più volte in pratica; si faccia lo scudetto lungo circa alla grossezza di due dita, lasciando alquanto legno attaccato alla buccia dalla parte dell'occhio scarnito in maniera, che dalla parte che dee restare al di sotto finisca in nulla, votandolo rotondamente col temperino tagliente, ch'abbia il petto rotondo, e rilevato; che faciliti molto, acciò commetta, e abbracci validamente il fusto selvatico, al quale tagli un poco la buccia per il traverso; ed un altro taglio più corto dello scudetto si faccia per il lungo del fusto, di modo che i due tagli facciano la figura d'un T, staccando, e alzando d'ambe le parti un poco la buccia dal fusto, servendosi per aiuto d'una piccola flecca d'osso bene schiacciata, stretta, sottile, e tagliente; mettendovi poi destramente lo scudetto con l'occhio voltato all'insù, spingendolo a basso tanto, ch'entri sotto al primo taglio fatto per il traverso; e se la buccia selvatica fosse tanto grossa, che coprisse l'occhio dello scudetto, se ne levi tanta, che resti ben scoperto, affinchè possa uscirne felicemente la sortita senza niuna sorta d'impedimento.

Per quelli, che si vogliono fare a penna, o coronetta, si scelgano le mazzette domestiche, come sopra si è detto, facendole con un solo occhio; e s'appuntino, tagliandole solamente da una parte in maniera, che facciano quasi la figura d'una penna temperata. Si tagli poi per il lungo un poco la buccia del fusto selvatico, dove si metta subito la mazzetta, con l'occhio al di fuori, e più basso che sia possibile, e scernita in maniera che commetta e abbracci validamente il selvatico.

E per

E per quelli, che si vogliono fare a spacco, o fello-
lo; spaccato che sia il fusto, si facciano le mazzette
domestiche come un solo occhio, e s'appuntino, taglian-
dole da due parti in modo, che messe nella spaccatura,
l'occhio resti al di fuori e più vicino che sia possibile
all'estremità del fusto; e accomodate che siano in ma-
niera che le buccie commettino, e s'uniscano bene in-
sieme, si leghino ben ferrati tanto questi, che gli altri
fatti a scudetto o a penna, con fila di canapa pettina-
ta; e finalmente si prattichino le molte altre diligenze,
che ho più minutamente descritte per gl'innesti de' Peri.

Passando poi agli ultimi giorni del mese di Maggio,
ovvero al principio di Giugno, ciò che dipende dal cli-
ma e dalla stagione più o meno calda, si riconoschino
esattamente tanto quelli innesti di Settembre, che gli
altri fatti al principio di Maggio, sciogliendo a tutta la
legatura, ed essendovene de' non attaccati, s'innestino
rosso di nuovo un poco più bassi; e intanto si stia ar-
renti, tagliando tutte le nuove sortite che nascono per
il dosso del fusto selvatico, affinchè il nutrimento co-
minci fino da principio a far tutta la sua forza verso
l'occhio dell'innesto, acciò possa sollecitamente, e vi-
gorosamente risolvere, e dilatare i suoi pori, e dar
maggior complessione alle fibre, facendo più amplii ca-
nali, e le trachee capaci di ricevere non solo tutto il
nutrimento e virtù, che lor tramandano le poche bar-
be dell'anno presente; ma quel ch'io più considero, è,
che si dispongono, e non si fanno capacissimi di rice-
vere andantemente l'altro, che in maggior copia li
tramanderanno le molte grosse, e più attive barbe dell'
anno avvenire.

Attaccati poi che siano gl'Innesti, e vedute le nuo-
ve sortite domestiche lunghe circa a mezzo braccio,
due sole se ne lascino, e le più robuste, e meglio si-
tuate, purchè guardino una a destra, e l'altra a sini-
stra; nè mai ambedue dalla medesima parte; e perciò
s'abbiano i dovuti necessari riguardi quando si fanno
gl'innesti, di mettere gli scudetti, e le mazzette ben
ripartite in giusta lontananza una dall'altra, massima-
mente sopra ai fusti grossi, dove si sogliono mettere
per il meno due scudetti, e due mazzette.

Cresciute poi le suddette nuove sortite domestiche,
circa a tre palmi, si spuntino tal volta anche il pri-

mo anno all'altezza d'un palmo e mezzo, e più e meno secondo la forza della pianta, l'altezza del suo fusto, e la robustezza delle medesime fortite, col dovuto riguardo, che gli ultimi occhj guardino quest'ancora uno a destra e l'altro a sinistra; acciò non faccia-
no della confusione, e se ne possa successivamente cavare ogni anno con bello, e buon ordine le necessarie rame e da legno, e da frutto; ed ecco appunto ciò che vado a trattare nel seguente Capitolo.

CAPITOLO IV.

Del tempo, e del modo di coltivare le piante degli Agrumi passato il primo anno dopo innestate, fino che non avranno dieci, o dodici anni.

Subito passato il prim' anno dopo innestate le piante degli Agrumi, nel mese d' Aprile, veduta la stagione rimessa, e dati i più veri contrassegni d'una sicura e bella Primavera, si cavino dagli stanzioni, mettendoli ne' Giardini, o in altri luoghi per loro destinati in tempo di state; scalzandole bene all'intorno, e al fondo, più che sia possibile, senza cavarlo dal vaso, e senza offenderli nè lacerarli le barbe; indi si governino, riempiendo tutto il vuoto dalla scalzatura col divisato come benissimo smaltito, trito, sostanzioso, e poco o niente pigliato, facendo con altro concime più grossolano un orlo all'intorno della pianta, che sopravanzi quello del vaso; e messe ai loro posti, s'adacquino subito, seguendo poi tutta la state, come ho insegnato nel Capitolo secondo; coll'avvertenza, che non patiscano mai l'asciuttore, nè la superflua umidità, perchè tutti gli estremi son viziosi, e cattivi. Essendo adunque queste piante così trattate, e ben coltivate, siamo sicuri, che facciano ogni anno gettate bellissime.

Staremo adunque bene attenti, e avvertiti per destinarli preventivamente, alla qualità, e al numero delle rame, quelle che più si stimano necessarie, e proprie per comporre saviamente la pianta; e queste sole si lasciano tanto da legno, che da frutto, tagliando sovente tutte l'altre superflue, mal situate, inutili, e dannose; e intanto si raccorcino dottamente le rame buone da legno ad una giusta, e ragionevole altezza, acciò si fac-

facciano anticipatamente, e proporzionatamente robuste, raccolte, fruttifere, e non eccedano, nè si dilunghino troppo dal centro, ch'è il vero mezzo del tronco.

Finalmente si osservi, che le piante non abbiano mai Branchemadri nè da legno, nè da frutto, più di quelle, che giustamente può comportare, e sostenere la loro robustezza, e complessione; e queste si tengano col taglio ugualmente corte, raccolte, e riconcentrate da tutte le parti, ciascheduna a misura della sua forza. Nè pure si lascino nè troppo piene, nè troppo vuote di rami, acciò sieno villose, e composte di rame robuste, e fruttifere, e non come molte ne ho osservate con dispiacere, in diversi Giardini, di figura gobba, scomposta, villana, e piene d'un soverchio, confuso, intricato numero di rame inutili, e dannose; e quel ch'è peggio, quasi infruttifere affatto.

Si mettano poi ogn'anno le dette piante negli stanzioni circa alla metà del mese di Novembre, sempre in belle giornate ed in tempo, che le piante siano asciutte, adacquandole leggermente subito messe alli loro posti, facendolo qualche volta anche nell'inverno. ma sempre in tempo dolce, e piovoso, e che non vi sia pericolo del ghiaccio.

Passati che siano tre anni dopo innestate, si mutino, cavandole dal vaso con tutto quanto il suo pane attaccato alle barbe; ciò che dovrà farsi ogni tre, o quattro anni, rifacendo loro nuova fogna cogli usati rottami di tegoli, stoviglie, ec. colla solita stipa, o altro legname minuto, mettendovi sopra il divisato concime a sufficienza senza pigliarlo; purchè resti nel mezzo del vaso tanto di vuoto da potervi rimettere la pianta, in maniera che resti altresì collocata nel vero mezzo, nè troppo al fondo, nè troppo a galla, considerato l'abbassamento di più d'un palmo, che fanno dopo mutate, e rimesse ne' vasi. Ma prima di ripiantarle si spuntino delicatamente le barbe, sollevandoli d'ogni intorno le laterali, le superficiali, nè mai si tocchino le maestre, o le complesse, particolarmente quelle di fondo, che in questa maniera si rende di figura bislunga il barbicone, ch'è di non ordinario vantaggio, per l'agire delle piante. Non si taglino mai le barbe grosse, nè si allentino dalla terra, o concime, come malissimamente

vien praticato da molti Giardinieri, che non riflettono al grave danno e sconcerto, ch'è per le piante, tagliando loro le barbe grosse, con colpi alla peggio, e con ferri poco taglienti, che strappano, smuovono, e scompaginano affatto tutto il pane, restando le barbe tutte smosse, e staccate dalla terra; ond'è che rimesse poi ne' loro vasi così strappazzate nelle barbe, ci vogliono quasi due anni prima che ripiglino forza, e vigore; di maniera che tornando il terzo, o quarto anno a maltarle ella peggio, se faranno bene i conti, confesseranno anche i Giardinieri con tutta giustizia, che da questo pessimo modo, più che da qualsivoglia altra cosa dipende che le piante soffermanfi, rendendosi languide, vizze, e senza frutti, poichè in vece d'agire colla dovuta prontezza e celerità, su tramandando alle rame copioso il necessario spiritoso liquore, acciò spuntino fuori per tempo dalle seconde gemme i fiori, si trattengono per rilasciare se medesime; e intanto, o non fioriscono, o sono sì languidi, e difettosi, che non s'allegano, o se pure si annodano i frutti, sovente cadono prima di stabilirsi perfettamente; e quei pochi serotini, così giovani, teneri, e delicati, restano alla discrezione dell'Inverno.

CAPITOLO V.

Del tempo, e del modo di coltivare le piante degli Agrumi, passato che avranno l'età di dieci, o dodici anni fino a che durano.

QUando le piante degli Agrumi così tenute, come abbiamo detto, avranno passata l'età di dieci, o dodici anni, si mutino pure al solito nel mese d'Aprile ogni tre, o quattro anni, senza toccar loro punto le barbe grosse di fondo, e pochissimo le laterali; anzi di tutte facendo gran capitale, massimamente passati che siano i primi tre anni, a fatica si spuntino, lasciandole liberamente, e a suo talento crescere, e dilatarsi per ogni verso, poichè ogni sette anni (ciocchè suppongo necessarissimo, e francamente prescrivo siccome vedremo in questo tempo cresciuto notabilmente il tronco, il barbicone, e il pane: così dovremo darli proporzionalmente un vaso alquanto maggiore, capace di dare ampiezza alle barbe, e proporzionalità alle rame. Per me-

meglio spiegarmi e per facilitare questa bella pratica, dico, che si prenda la pianta di dodici anni, cavandola diligentemente dal vaso, e messovi il solito concime, si ripianti all'usato modo nel medesimo vaso, sollevandole alquanto le piccole barbe laterali, e delicatamente spuntate, si lasci quivi agire per tre anni, e dopo si ricavi; e senza toccar punto le barbe, nè pure le laterali, si ripianti per l'ultima volta nell'istesso vaso, messovi prima il solito concime sostanzioso, benissimo smaltito; lasciandola poi per quattro anni in questo medesimo vaso, di modo che in questo tempo fattasi piena, ben guernita di barbe, e cominciato il ventesimo anno, merita per le ragioni suddette, un vaso alquanto più grande, e maggiore; e così successivamente, dopo il solito compito turno di sette anni, ch'è quanto dire il ventesimo ottavo anno, avrà bisogno di nuovo vaso, e maggiore; e così si faccia a tutte fin che durano.

E quì prima d'insegnare ciò che ulteriormente bisogna alle rame, stimo bene di dire qualche cosa di alcuni, che troppo arditi, o confusi, sfatano vanamente ciò che abbiamo prescritto e fermato, per ingrandire con sicurezza, e celerità le nostre piante; nè punto vogliono considerarlo, giudicandolo tosto arbitrariamente, se non del tutto impossibile, almeno impraticabile affatto, incapaci, ed ostinati, come credo, di mantenere sane; e poco fruttifere le loro piante, ciò che pur troppo riesci gli con quel taglio spopositato, che ogni tre anni forzosamente le fanno nelle barbe, e nel pane, continuandole sempre nel medesimo vaso, quando le mutano: impauriti poi di non trovare terra approposito, nè fornaci da fabbricarne, e cuocere i vasi sì grandi; imbrogliandosi inoltre per la difficoltà del trasporto, e vie più sgomentandosi per gli stanziamenti, e molte altre difficoltà sognate per negar tutto, e non far nulla ch'abbia garbo: e intanto restano colle solite stentate piante ordinarie dell'Avo, e Bisavo, et ali le lasciano ancora ai figli, ai Nipoti, e ai discendenti. Lo dico ancor io, che grav'è la spesa, non minore la briga, e che forse non torni a conto che i privati Cavalieri debbano andare in cerca, e pretendano di avere tutte le loro piante simili agli smisurati cedri del Libano, risabbricare gli stanziamenti, indebitarsi; ma io dico solamente parlando di

di proposiro a quelli, che veramente vogliono, e possono agevolmente farlo, non fo se non lodarli, e promettero loro con sienza, che avranno effettivamente e vasi, e fornaci, e trasporti, e stanzioni, e finalmente piante che metteranno in gioja e contento i Padroni, in ammirazione, ed in voglia, se non in invidia, chiunque le mira. Si sono pur vedute poco fuor di Firenze, alle Panche, Villa de' Signori da Verrazzano, le sei famosissime annose piante di Limoni, grosse, ed alte quanto un comodo Ulivo, sopra i cui rami abbracciavansi francamente i Giardinieri, o per potarle, o per coglierne i frutti di mezzo; e solamente rispetto ai vasi che non precipitano, servirli delle scale per coglier quelli di fuori alle prode; tenevansi pure queste ne' vasi di terra a proposito cotti nelle fornaci, capacissimi di sostenere, e alimentare quelle grossissime piante, le quali pur nell' Inverno trasportavansi con sicurezza, per riguardarle da' ghiacci, negli stanzioni adagiati per riceverle, e ben custodirle. Si vedono pure tra Firenze e Prato a Travalle, in delizioso ampio giardino alla moda de' Signori Conti Zefferini, sebbene non tanto avanzate di grossezza e grandezza, di numero però maggiore, giovani, belle, agguagliate, robuste, e veggenti, capaci pure i loro rami di reggere un uomo, poste anch' esse ne' vasi di terra cotta ben cerchiati, o per meglio dire, legati col condino di ferro, tanto grandi, che tre uomini non arrivano ad abbracciarli. Ma quando non si troverà più modo di poterli far maggiori, ciò che finalmente ha da succedere, vogliam noi dire, che metta conto a quei Padroni abbandonarle sul meglio, guastandole nei rami, e nelle barbe, ordinando ai Giardinieri di digrossarli alla peggio il pane delle barbe, perchè non entrano ne' sottili vasi o stanzioni? Dovremo dunque consigliarli a qualche simile sproposito?

In quanto a me, è tanta la stima, ch' io fo di simili piante, che in vece di traccheggiarle col solito raggio, di abbandonarle, o in altro modo disfarle, loro persuaderò più tosto a tenerne più conto che mai, come di singolarissima cosa, e da farsi anche presto quasi unica; avanzandomi a prometter loro due maniere sicure per ajutarle, e vieppiù condurle alla loro più possibil grandezza, e quasi dissi perpetuarle. L'una
 si è

si è di fabbricar tanti robusti vasi di legname di Quercia ben purgato, capacissimi di sostenere, ed alimentare per molti anni così eccelse piante, venute oramai sì magnifiche, sì adorne di grossi rami, e sì copiose di buone barbe, che disordine farebbe a guastarle, cerchiandoli stabilmente di ferro, e mastiettandoli, in modo, che quando si vogliono ogni quattro anni mutare, s'aprano con tutta facilità, come si fa alle gabbie, in cui si stringe il vino, e l'aceto: vi si facciano in fondo i suoi necessari scoli, fognandoli all'usato modo, sì stipino con più sodezza, si concimino più copiosamente, ec.

L'altra maniera sarà di prepararli capacissimo ricettacolo nel terreno, scegliendo un sito a qualche ridosso di muraglia, guardato dalla Tromontana, esposto all'aria di Mezzogiorno, spazioso otto braccia di larghezza, e di lunghezza quanto comporta il numero delle piante; mettendole sette in otto braccia lontane una dall'altra; ridico di terra grassa, pastosa, e attiva, scavandolo tutto andatamente quattro braccia al fondo, dove si facciano stabilmente due fogne con grossi e buoni sassi, che abbiano il dovuto esito; riempiendo con sassi più piccoli i vani restati fra una fogna e l'altra, acciò continuamente sgrondino la superflua umidità dell'acque; mettendovi sopra stipa grossa tagliata di fresco, o altro frasciname verde e grossolano dappertutto andatamente per l'altezza d'un braccio. Dipoi si riempia per l'altezza d'un altro braccio con tritume di calcinacci smurati, e renosi, mescolandovi ceneracci avanzati da' bucati, e carbonella trita e cenerosa avanzata dalle fornaci. E per l'altezza d'un altro braccio dappertutto andatamente si riempia con terra leggierosa, sottile, sciolta e attiva, mescolandovi corna bovine o pecorine, agnelli di tutte le sorte, ritagli di calzolari, concime buono, e sostanzioso per un terzo almeno, mescolato il tutto alla rinfusa. E l'ultimo braccio si riempia di terra scelta, ma più sostanziosa della prima, mescolandovi da per tutto, per un terzo almeno, de' concimi più sottili e spiritosi, già preparati e smaltiti di qualche tempo.

Adunque nel vero mezzo, alquanto a galla, nel mese d'Aprile si ripiantino con tutto il rispetto sì degue piante, lontane sette in otto braccia una dall'altra;

sollevandole con piacevolezza d'ogn'intorno le piccole barbe, ajutandole ad abbracciare, e farsi proprio quel terreno spartato, dove faranno vote naturalmente nell'atto di collocarvele, acciò possino da per se stesse agire liberamente, dilatandosi a dirittura ciascheduna per il suo vaso, valendosi di tutto quel sito e luogo, che vi sarà sotto, ed intorno; e in capo all'anno ci diranno chiaramente le rame ciò che abbisognili, e più cel diranno gli anni avvenire, mostrandosi a suo tempo distintamente quali franche, quali troppo robuste, e ridotte quasi contro l'ordine della natura, e tutte queste dovremo opportunamente, e saggiamente scortare o levare affatto: dando campo a tutte l'altre di buona speranza e complessione, e sopra il tutto si tenga conto de' vecchi robusti rami, e de' nuovi vigorosi ben situati getti, e rampolli, che presto presto arricchiranno, mentando per ogni verso, e in tutte le sue parti vie più salde, robuste, e fruttifere queste fortunatissime piante. Da tutto questo, che pure stabilmente si regge da per se stesso, onde non stimo di più minutamente giustificarlo, vado altresì persuaso, che le persone sensate, e avvedute possano meco volentieri concorrere, concludendo di doverli trattare assai prodigamente le barbe, e saviamente le rame da legno, e da frutto; e proporzionatamente allevarli il suo tronco, o pedale, ridendosi di coloro, che nel travasare le piante, e più nel fabbricare i nuovi giardini o boschetti di cedrati, vanno in certa di restringerli in tutte le sue parti, come se dovessero capivoltare una corta mazza di fico, o d'altro frutto, per averlo sempre nano in un piccolo vaso, in cambio di dilatarli come dovrebbero, almeno quattro braccia per ogni verso, tanto sotto terra, che sopra; dandosi in questa forma il dovuto campo alle barbe che agiscano liberamente con tutta vivezza, ed un simile spazio alle rame, acciò si stendano agiatamente, e gradatamente, senza confondersi e contrastarsi insieme; sostenendosi gagliardamente da per se stesse sopra il suo saldo tronco, o pedale, alto da terra circa due braccia; diradandoli subito allegati i troppo numerosi frutti, lasciandovi solamente i primogeniti, i più ben formati, e veggenti; poichè è cosa chiarissima in pratica, che chi lascia da primo sulle deboli ramette tutt'i frutti allegati per averne molti, a raccolta resta

resta troppo ingannato, non ottenendone in fatti che pochi e cattivi; laddove chi presto ne lascia un solo per polluzzola, tutti si salvano, e vengono più belli, e di maggior perfezione.

Ma è tempo oramai di tornar d'onde partimmo, dicendo, come abbiamo promesso, ciò che abbisogni alle rame delle nostre piante, che avremo mutate, ogni sette anni, e quelle pure a suo tempo dovremo tagliare, o che faranno restate troppo asciugate, o indebolite dal molto frutto, o storte, o confuse, o che diano segno di troppo addormentato letargo, tenendo continuamente col taglio aperte, e sfogate tutte le piante, particolarmente nel mezzo. E quì mi avvedo che tornerai a ridire ciò che ho detto abbondantemente in più luoghi e competentemente a questo proposito, nel trattato degli Ulivi, e più propriamente in quello de' Peri.

Non mi resta altro da suggerire in questo Capitolo, ed a questo proposito; se non che si scarichino sovente, ed a suo tempo, massimamente prima di riporre negli stanzioni, l'affaticate piante dal soverchio frutto dell'anno precedente, pregiudicandoli molto quel pelo, e mantenimento; ond'è ch'io detesto coloro, che non levano lor subito maturari tutti gli allegati di Maggio, a riserva di alcuni pochi Settembrini attaccati a rami grossi, e robusti, che tuttavia danno segno di aumentarsi; e consigliandoli piuttosto a tener conto delle rame, acciò possano, così scariche e riposate, germogliare poi ne' primi tempi, e fecondarsi sicuramente.

TRATTATO DEGL' INNESTI.

E delle Stagioni più proprie per innestare.

CAPITOLO PRIMO.

NON è da porsi in dubbio; che gl' Innessi non s' attacchino di tutt' i tempi, e di tutte le stagioni, che vale a dire nella Primavera, nella State, nell' Autunno, e nell' Inverno, ma è altresì verissimo, che in questi tempi vi sono delle stagioni più, e meno proprie, secondo la qualità delle piante.

Parlando dunque in primo luogo delle piante de' Peri, Meli, Susini, Miliachi, o Albicocchi, Peri Cetoagni, Nespoli, Razzeruoli bianchi e rossi, Ulivi, che s' innestano a fessolo, ec. per questa sorta di piante, benchè alcune mettino più presto, ed altre più tardi, le migliori, e più sicure stagioni si stringono a due; la prima da' venti d' Ottobre sino a' dieci di Novembre; la seconda da' quindici sino a' trenta di Marzo; e prima e dopo, avuto riguardo a' paesi più caldi e più freddi, è alle correnti stagioni anticipate, o posticipate; dimandate tacchè non si può descrivere, e limitare appunto il tempo. Ma è da sapersi, che la prima è assai migliore e più utile della seconda; poichè le mazzette domestiche innestate nella prima stagione hanno tempo tutto l' Inverno, e intanto si attaccano stabilmente, disponendosi alla vegetazione, in modo che venuta la Primavera cominciano subito a mettere, come se non fossero nè pure state tagliate dalle loro madrebranche, facendo tosto il primo anno risolutissime, robuste, e belle gettate. E caso che qualche innesto non s' attacchi (cosa che non dovrebbe accadere) vi è subito il vantaggio di poterlo innestare più basso nella seconda stagione di Primavera: laddove gli altri fatti di questa medesima stagione non risolvono subito così francamente; e restano senza attaccarsi, non si possono altrimenti innestare in quell' anno con esito tanto felice, e vantaggioso.

Parlando poi degli Agrumi, la vera, e sicura stagione

hè

ne per innestarli è dal principio fino alla metà di Settembre; ovvero dagli ultimi giorni d'Aprile fino alla metà di Maggio, come si è detto nel Capitolo terzo del trattato degli Agrumi; e se parliamo de' Gelsi è da' 10. fino a' 20. d'Aprile. Per i Fichi e Castagni da' 20. d'Aprile fino a' 10. di Maggio; e per i Persichi, noti Persichi, Ceragi Persichi, e simili, dal principio fino alla metà di Settembre, facendoli a scudetto col suo legno attaccato alla buccia, come si è detto per gli Agrumi; che in questo pure bisogna dipendere dal Clima, e dalle stagioni. E assicurati che siano attaccati validamente, si tagli con destrezza al principio del mese di Gennaio tutta la parte superiore per la grossezza di due dita più alta dell'innesto; e veduto che le legature stringano troppo, e recidano la buccia, come suole accadere ne' Persichi per ragione della loro attività e prontezza di crescere e ingrossare più presto dell'altre piante, si sciolgano immediatamente. Si osservi finalmente, quando si fanno gl'innesti, che le giornate non siano piovose, m'alcutte, dolci, e temperate; e sarebbe bene farli nel declinare del Sole, e del giorno: e resti ognun persuaso, che quelli che non si attaccano, e altri che attaccati non vengano bene, non vi è altra ragione, che quella d'esser fatti male, e con poca avvedutezza.

CAPITOLO II.

Dell'osservazioni da praticarsi nell'atto di scegliere delle piante domestiche le mazzette per innestare.

L E mazzette, che si scelgono dalle piante domestiche per innestare, è necessario primieramente, che siano di quelle sortite nell'anno precedente, che sono le migliori, tagliandosi dalle rami più fruttifere, che ne' Peri massimamente sono quelle col bottone dal fiore in punta, che restano al di fuori delle piante, particolarmente dalle parti d'Oriente, e Mezzogiorno; poichè queste sono prima dell'altre dominate dal Sole, che le seconda, e alcuiuga più presto dalle guazze, e dall'altre umidità della notte; concorrendo anche le barbe a tramandarli maggior quantità di nutrimento, e perciò sono le più sane ubertose, robuste, e fruttifere dell'altre; S'osservino inoltre quando si scelgono le dette maz-



mazzette, se la pianta è molto vigorosa e gagliarda, di prenderle dalle rame deboli, acciò siano più sisse, consolidate, e atte alla vegetazione, perchè scegliendole dalle rame troppo gagliarde, dove la maggior parte delle mazzette sono troppo sflosce, hanno gli occhj piccoli e imprigionati, e si attaccano e risolvono più difficilmente. Al contrario, dalle piante deboli, e di poco vigore, si scelgano dalle rame più gagliarde, perchè pigliandole dalle rame deboli di questa sorta di piante, le mazzette sono così languide, poco robuste e attive, e s'attaccano così debolmente, che concludo poco o nulla; e di quì è che si vedono molti innesti che attaccano, e non risolvono che sortite sottili e miserabili, da farne pochissimo o nulla di capitale. Si osservi ancora di non pigliare le mazzette sortite sopra il dosso di alcuni rami grossi e gagliardi; essendo queste venute contro il buon ordine della natura, e conseguentemente di falso legno, e poco o niente fruttifere; chiamate comunemente dai Giardinieri, e dai Contadini *dannosi succbioni*, ovvero *inutili puppajoni*.

CAPITOLO III.

Dell' osservazioni da praticarsi, quando si scelgono gli occhj dalle mazzette domestiche per fare gl' Innesti.

QUANDO si scelgono gli occhj dalle mazzette domestiche per fare gl' innesti, si pigliano solamente quelli di mezzo; perchè quelli di cima sono la maggior parte cattivi; per esser le mazzette in quella parte troppo tenere, e non consolidate, nè ben formati i loro occhj; e gli altri vicini alla madrebranca delle mazzette, ch' è quanto dire nel piè delle medesime, sono questi così piccolini, poco rilevati, e tanto imprigionati, che possono chiamare quasi ciechi, e affatto sterili ed infecondi; avendolo io veduto molte volte coll' esperienza, fatta anche apposta, che le mazzette innestate con questa sorta di occhj non risolvono, nè fanno mai gettate, che siano buone a nulla, con tutto che si attacchino felicemente. E la ragione è chiarissima, perchè non avendo il nutrimento dove fare liberamente la sua uscita, è l'istesso che far l'innesto con

con un pezzo di mazzetta senza occhj. Si trovano però molte volte, massime sopra le rame più grosse, e più gagliarde delle piante deboli, alcune mazzette non molto lunghe, che hanno la cima piuttosto grossa, chionfa e consolidata, dove sono gli occhj ben formati, fecondi, capaci, e buoni per fare gl' innesti anche quelli della vera cima; ma non è così nel più delle mazzette, dove non vi è mai neppure un occhio, che non sia imprigionato, e quasi affatto cieco, e incapace di ben vegetare.

CAPITOLO IV.

Dell' osservazioni da praticarsi quando si fanno gl' Innesti sopra le piante domestiche, per renderle più fruttifere, ovvero per migliorarne il frutto.

Prima di fare gl' Innesti sopra le piante domestiche per renderle più fruttifere; ovvero per migliorarne i frutti, essendo difettosi, si esaminino minutamente di dove possa derivare la causa, per poterla opportunamente rimuovere; e sappiasi in primo luogo, che le piante domestiche poco fruttifere, si vedono ordinariamente più ne' frutti dall' Inverno, che in quelli dalla state, e dall' Autunno. S' innestino adunque sopra di queste piante poco fruttifere altre pere dalla state, e dall' Autunno, che fruttano felicemente quasi ogni anno; come sono le Giugnoline, che maturano al principio di Giugno; Moscadelle tonde e lunghe, che maturano passata la metà di Giugno; Giugnolone, che maturano la metà di Giugno; Zuccherine, che maturano al principio di Luglio; Bugiarde, che maturano prima della metà d' Agosto; Santa Maria, che maturano pochi giorni dopo le bugiarde; Angeliche, e Garofanine, che maturano al principio d' Ottobre; simili, ec. Per l' altre piante poi non bene appropriate al Clima, e al suolo, che fanno come accade facilmente, le pera imperfette, e di cattivo sapore, cioè troppo sciapite, acquose, e poco durevoli s' innestino d' altre razze più dure, e meno sugose; e facendole troppo legnose, nodose, asciutte ed aspre, s' innestino di qualità più umide, e delicate, per emendare e correggere, se non in tutto, almeno in parte, e più che sia possibile i difetti tanto del suolo, che delle pera non bene appropriate. E restino persuasi tanto i Padroni,

P

che

che i Giardinieri, che ho più volte trovate delle piante di diversi frutti avanzate con l'età, robuste, sane, gagliarde, e non facevano neppure un frutto; e dopo innestate d'altre razze più proprie, hanno fruttato copiosamente quasi ogni anno; siccome ne ho trovate altre, che facevano i frutti così inspidi e di cattivo sapore, che non erano buoni a nulla; e dopo innestate d'altre qualità, hanno fatti i frutti di tutta perfezione: essendo verissimo, che la buona cognizione, e l'arte pratica saviamente, suppliscono a molto in tutte le cose.

CAPITOLO V.

Del tempo, e del modo d'innestare le Viti.

IL più vero tempo d'innestare le Viti, è da' venti del mese di Febbrajo, fino a' dieci di Marzo, avuto riguardo alle stagioni anticipate, o posticipate, a' paesi più caldi, e più freddi, e alle terre più o meno leggiere e attive, dove le Viti mettono più presto di quel che facciano ne' paesi freddi, e nelle terre forti; siccome mettono più anticipatamente le Viti deboli, ed altre di diverse uve che fanno i capi sottili, e maturano presto, di manieracchè bisogna dipendere dallo stagioni, dal Clima, dalle qualità delle terre, e de' Vitami, e fare gl'Innesti prima che le Viti entrino gagliardamente in azione. Si scelgano adunque i Vitami di buona razza, che siano propri per il Clima, e per il suolo, scegliendo i Sermenti di mediocre grossezza, sodi, e ben formati, che abbiano gli occhi spessi, grossi, e rilevati, facendosi gl'innesti a spacco o fessolo; mettendo il sermento nella spaccatura, scarnito in maniera che commetta benissimo d'ambe le parti, che abbia un occhio solo voltato al di fuori, nel medesimo modo già descritto per le piante de' Peri, e degl'Agrumi; praticandosi tutte l'altre diligenze sopradette: e attaccati che siano, si potino, e si coltivino come l'altre Viti nella maniera, che si stima più utile, e propria.

TRAT-

TRATTATO²²⁷

DI ARARE, E SEMINARE LE TERRE.

*Del tempo, e del modo di arare le terre, dove
ha da seminarfi il Grano, Vecciato, e
Segalato.*

CAPITOLO PRIMO.

IL vero tempo di arare le terre, dove si dee seminare il grano, il vecciato, ed il segalato, in particolare nelle nostre pianure di Toscana, dove ogni anno si semina nel medesimo terreno, egli è subito segato il grano, ch'è quanto dire alla fine del mese di Giugno, ovvero al principio di Luglio. Questa lavorazione, chiamata comunemente dai Contadini fendere, o rompere le terre, si faccia sempre in tempi asciutti, acciò secchino più facilmente tutte le barbe dell'erbe; facendo coll' aratro ben grande un solco nel vero mezzo della porca, più al fondo, e più dritto che sia possibile, acciocchè la terra resti bene, ed ugualmente tutta rotta, smossa, e sollevata d' ambe le parti della porca; poichè non arandosi dritto, e nel vero mezzo, nelle tortuosità, che restano, non si smuove, nè si solleva la terra; e restando sode, non può godere nè dell'aria, che la purga e stagiona, nè del Sole, che la cuoce e scioglie, mettendola in maggiore attività, oltre al feccare le barbe dell'erbe; nè può approfittarsi delle rugiade, o guazze, che la fecondano. Si procuri adunque di arare, o fendere la terra col solco più al fondo e più dritto che sia possibile, per le ragioni sopra accennate.

Passati poi venti, o venticinque giorni incirca dopo arata, e rotta la terra come sopra, si erpichino i campi sempre per lo traverso con l' Erpice grave e pesante, ch'abbia i denti lunghi, e vicini un palmò l' uno all' altro, appianando e sritolando minutamente le mezzane e grosse zolle della terra, acciò si distaccino, e secchino tutte le barbe dell'erbe; capace poi così sritolata, di ricevere più facilmente tutto il beneficio possibile dell'aria, del Sole, delle guazze, ec.

Si torni poi di nuovo a lavorare questo medesimo Terreno circa alla metà del mese di Agosto, facendosi col solito aratro grande due solchi per porca, cioè uno per costa, o, come altri vogliono, uno fra il solco nuovo e il vecchio, più al fondo e più dritto che sia possibile, ciò che i Contadini chiamano costeggiare, e incigliare.

Indi si feminino in ogni coltra di terra sempre sopra il lembo più grosso quattro staja di lupini almeno, chiamati comunemente rovelci, che servono poi per governo del grano. Seminati adunque questi lupini sopra il divistato lembo più grosso, ch'è quello, che resta sopra il solco vecchio, dove dovrà essere appunto il vero mezzo della nuova porca; acciò questa resti ogn'anno mutata di sito, nè mai sempre nell'istesso luogo. Si spranzi poi subito seminati i lupini il sopradetto lembo col farchio, o colla marra, formandone la nuova porca; sritolando tutte le grosse e mezzane zolle, appianando la medesima porca dalle inuguaglianze, ed altre scabrosità, in modo ch'ella resti altresì rotonda, colma, e rilevata in mezzo; e nel medesimo tempo si adbrizzi pure col farchio, o colla marra l'altro lembo, che resta in piedi chiamato nuovo, da tutte le tortuosità, ed altre inuguaglianze; acciò il medesimo lembo resti più sottile, e aguagliato, e dritto, che sia possibile; poichè dovendo in suo luogo tornarvi il solco per uso dell'acque superficiali, dopo seminato il grano, ne segue, che le porche restano più larghe, ed agguagliate; di maniera ch'essendo così ben fatte, e appianate, seminandovisi sopra il grano, questo resta appunto in luogo, ove cade dalla mano di chi lo semina, e nascono poi i grani in giusta, e debita lontananza uno dall'altro; ond'è che tutte le fila vengono comodamente, e agiatamente a perfezione, conducendo francamente tutto il loro saldo, e copioso frutto; laddove nelle terre lavorate alla peggio, e poco appianate, resta il terreno in alcuni luoghi quasi affatto voto di fila, ed in altri troppo pieno, attribuendo ciò la maggior parte de' Contadini alle formiche, e ad altri animalletti, i quali per verità sono quasi sempre innocenti; non volendo persuadersi, che nelle terre poco appianate, il grano non può far di meno di non nascere a mucchietti; perchè sopra le zolle, ed altre scabrosità della terra non vi si possono

no mai fermare i grani del seme; calando immediatamente nel più basso, e nelle bucherelle, massimamente nelle terre grosse e forti, mentre i Contadini non vi abbiano tutta la necessaria avvertenza in bene ed ugualmente appianarle, sritolando minutamente le zolle.

Adunque il grano, che nasce a mucchietti, oltre al gran pregiudizio di non poter godere tutte le fila agiatamente il beneficio delle guazze, e del Sole, nè pur le barbe possono approfittarsi del terreno, e del sugo, per esser quasi tutte in un gruppo troppo serrate, ristrette, ed intrigate insieme; ne segue intanto, che molte di quelle fila, che nascono nelle bucherelle, marciscono dalla troppa umidità, che ivi si ferma, ovvero se non marciscono, non possono almeno subito cominciare colle loro barbe ad agire colla dovuta vivezza, e celerità; e se pur cominciano per il beneficio dell' asciutta stagione, quale poi cambiata in troppo umida e piovosa, ne segue, che fermandosi più che altrove, l'acqua, e superflua umidità nelle bucherelle, le fila del grano, che ivi ritrovanti, si raffreddano, s'illanguidiscono, e soffermansì tosto, e non cominciano che nella Primavera, molto più tardi dell'altre veramente sane, a ripigliare, ma adaggio, e lentamente qualche poca di vivezza, e di spirito: e intanto avvicinandosi il tempo, che debbono fiorire, allegare, e condurre il suo frutto, esseudo così languide, e troppo serrate insieme, il caldo della stagione in pochi giorni forzatamente le stringe, e le secca, senza che abbiamo tempo di condurre a perfezione il loro, benchè pochissimo, frutto, restando poco granito, poco pesante, e facile a guastarsi.

Si conclude adunque, che le terre vogliono essere molto ben pulite e nette da tutte le barbe dell'erbe, lavorate al fondo a' tempi propri, benissimo appianate prima di seminarvi il grano, governate prodigamente nell'atto di seminarle, oltre ai lupini chiamati rovesci, con altri concimi sottili, e sostanziosi; non rilavati dall'acque, nè spolpati dal calore del Sole, ch'è uno de' grossi mali che possono patire i concimi; ed allora resteranno per tutto ugualmente piene di fila di grano, nè troppo rade, nè troppo spesse, approfittandosi tutte della terra, del sugo, dell'aria, del Sole, e delle guazze; e saremo certi, che renderanno quasi ogn'anno sicure,

sollecito, perfette, e copiose raccolte: essendo verissimo, che le tanto scarse e miserabili, non si vedono che alle mani delle persone trascurate.

CAPITOLO II.

Delle qualità che dee avere il seme del grano; e del modo più proprio di conservarlo.

Primieramente è da sapersi, che non solo il seme del grano, ma molti altri semi, è bene che sieno nuovi, ch'è quanto dire del medesimo anno, perchè son più sani, pronti, attivi, e fecondi, e nascono con maggiore attività e sollecitudine quasi tutti in un medesimo tempo, purchè sia scelto, ben granito, pesante, e fatto in terre non frigide, nè troppo umide, nè adombrate, e vangate del medesimo anno, chiamate comunemente da' Contadini terre novali, o rinnovate. Ed in altri paesi più vasti, d'aria cattiva, e spopolati, dove per mancanza d'uomini non possonsi seminare ogni anno le medesime terre, nè vangarle ogni tre anni una volta, come andrebbe fatto; in questi paesi dico, si scelga il seme del grano fatto nelle terre smaggesate, chiamato grano di maggesi; essendo questo pure buonissimo, pesante, e sano forse più dell'altro fatto nelle suddette terre novali; non perchè venga da una terra stata due o tre anni senza lavorarla, e senza seminarla, perchè lasciandola così loda, invece di ripolarla, come vien creduto comunemente, è cosa certissima, che si stracca, si opprime, s'addormenta, e perde la sua attività, non potendo approfittarsi degl'indulgenti celesti; e intanto s'empie di diverse erbe, roghi, spine, ec. che la sfruttano, e indeboliscono molto; non potendo farle strappazzo maggiore che lasciarla loda senza lavorare, siccome non le si può fare il maggior beneficio, che lavorarla spesso profondamente, tenendola smossa, sollevata, e pulita dall'erbe, spine, ec. Ma questa suddetta terra smaggesata fa il grano molto buono, solo perch'essendo più volte ben lavorata e smossa coll'aratro ne' mesi di Aprile, Maggio, e Giugno, (cioè che vuol dire smaggesare,) e poco, o niente adombrata dagli alberi, gode o s'approfitta validamente con tutto il comodo del gran beneficio dell'aria, del Sole, delle piogge, e delle se-
con-

condissime guazze d'Aprile, Maggio, e Giugno: e questa è l'unica ragione, che il grano seminato nelle terre smaggefatte, rende più sicura, e più copiosa la raccolta, ed è molto migliore, e più perfetto dell'altro che viene dalla terra, che si semina ogni anno; non potendo quella godere il suddetto vantaggio, mentre non si può cominciare a lavorare, che dopo legato, e levato il grano, che vale a dire alla fine del mese di Giugno, ovvero al principio di Luglio; e perciò il grano non è così pesante e perfetto, come quello che viene dalle terre smaggefatte, massimamente quando è fatto in terre poco adombrate dagli alberi, e vangate di due anni.

In oltre sarebbe molto bene, che i grani venuti anche da questa sorta di terre così sane, ben lavorate, e pulite dall'erbe, dalle radici, ec. fossero scelti, come sarebbe per esempio: se in quel tempo, dove si è già destinato il grano per seme, vi fosse qualche pezza di terra molto adombrata, frigida, e viziosa; il grano, che ivi farà, non si mescoli coll'altro destinato per seme; essendo questo di sua natura molto imperfetto, e poco fruttifero. Si scelga adunque, anche dalle terre novali, e smaggefatte, solamente il grano delle spighe più alte e gagliarde, ch'è il più sano, il più attivo, ed il più fruttifero, e facile a conservarsi bene. Essendo anche cosa molto utile, e vantaggiosa il mutarla ogni due o tre anni almeno, da un luogo all'altro, purchè si migliorino le condizioni del seme, scegliendolo sempre da terre sane, ariose, e ben lavorate, come sopra si è detto, avuto riguardo, che le qualità de' semi siano conformi, e proprie alle diverse qualità del suolo, e del Clima. Parlando adunque di alcune diverse qualità di grani, che sono a mia notizia, dico in primo luogo che vi sono alcuni grani, chiamati grossi, com'è quello colla resta nera, Ravanese grosso senza resta, Bianchetto, Mazzocchio, Mazzocchino, e Civitello, tutti colla resta. Questi suddetti grani grossi vogliono esser seminati anticipatamente; amano il Clima non molto freddo; la terra grossa, e forte, ben lavorata e governata; perchè altrimenti fanno raccolte molto scarse e miserabili, e talvolta in alcuni luoghi la maggior parte non fanno nè pure la spiga; attribuendolo poi i Contadini alle nebbie, alle brinate, e ad altre lor solite cose soggette.

te. Questi suddetti grani servono solamente per uso di pane ordinario, mentre non siano mescolati con altrettanti grani gentili; che in questo caso fanno il pane molto migliore. Il grano duro, bianco e rosso con la resta, ch'è buono solamente per uso di Paste, vuol' esser seminato anticipatamente, ama il Clima, e la terra come sopra. Vi sono poi altri grani gentili, com'è il Tosetto bianco senza resta, e la cascola bianca con la resta; questi vogliono esser seminati presto; amano il Clima caldo, la terra di buonissimo fondo, mediocrementemente sottile, pafosa, grassa, ben governata con lupini cotti, e concimi sostanziosi, vangata profondamente del medesimo anno, le vogliamo ricavarne copiose e abbondanti raccolte, di una qualità di grani bellissimi e molto pesanti, da servirsene più per uso di paste, che di pane, quando non siano mescolati con altri grani, che facciano buona lega; che in questo caso fanno il pane buonissimo. Il Tosetto rosso senza resta vuol' esser seminato presto; ama il Clima caldo, la terra mediocrementemente sottile, ben lavorata, e governata. Questo è una qualità di grano molto pesante, bello e buono per farne. Il grano rosso, e la cascola rossa con la resta, vogliono il Clima caldo, la terra leggerosa e sottile, e fanno ragionevolmente bene, quando anche non sia vangata dell'anno avanti, e tanto governata; ma è da sapersi, che fanno sempre meglio mentre sia ben lavorata, e governata. Queste sono due qualità di grani buonissimi per uso di pane, facendolo molto rilevato, leggieroso, o saporito. Il grano gentile dalla resta, chiamato montanino alpigiano, ch'è il migliore di tutti per uso di pane; vuol' esser seminato presto ma il Clima non molto caldo, il terreno piuttosto sottile e leggeroso, ben lavorato e governato.

In quanto poi al modo più proprio di conservare il seme del grano, primieramente è necessario ch'egli sia benissimo secco, e stagionato, netto e pulito dalla polvere più che sia possibile, messo in luogo fresco ed asciutto, ed ivi conservarlo fino al tempo della sementa, con rivederlo, e rivoltarlo sovente; ed essendo sicuri, che non riscaldi (cosa che procede solamente dall'esser poco secco, e stagionato, ovvero dall'esser stato segato troppo presto, che più difficilmente si secca e stagiona,)

si met-

si metta in arche, o in altri vasi, coprendolo con la rena asciutta per l'altezza di un sesto di braccio.

Arrivati finalmente al tempo della sementa, prima di seminarlo, si crivelli diligentemente col crivello a mano, levando tutt' i grani imperfetti, che vengono facilmente a galla, cioè al disopra dell' altro nell' atto di crivellarlo, acciò il seme resti veramente pulito, tutto sano e perfetto; e si faccia il possibile per bene e sicuramente appropriarlo al suolo, e al Clima: e siamo certi di vederne poi effettivamente in pratica raccolte quasi sempre sicure, e abbondanti di grano veramente sano, perfetto e durevole, che farà il pane non solamente in maggior quantità, ma più sostanzioso, rilevato, saporito, e forse più salutare.

CAPITOLO III.

Del tempo, e del modo di seminare il grano, vecciato, e segalato.

IL più vero tempo di seminare il grano, parlando generalmente delle nostre pianure di Toscana, egli è dalli 15. del mese d'Ottobre fino alli 10. di Novembre: nè vale a dire, che sia necessaria l'aspettare fino a tanto, che sia piovuto, in modo che la terra resti bene inzuppata dopo lavorata l'ultima volta, acciò siano nate tutte l'erbe. Io non dico, che l'esser nate l'erbe prima di seminare, non possa esser utile per il grano; ma dico altresì non esser tanto necessario l'aspettare, che giova prima di seminare, per non impegnarsi a far poi la sementa troppo tardi, la quale in sostanza riesce sempre poco fruttifera. Il nascere dell'erbe, che vengono da alcuni semi, dipende assolutamente dalla pioggia, a riserva di altri, che non nascono mai fino alla Primavera. Dipende pure dalla pioggia il risorgere le nuove erbe dalle loro barbe; ma quando la State va molto calda e asciutta, e che le terre sieno state ben lavorate nelle proprie stagioni, le barbe seccano tutte quasi affatto, onde non possono l'erbe nuovamente risorgere; e se la State va umida e piovosa, risorgono dalle barbe, e nascono dai semi molto prima del tempo della sementa; e andando calda, non torna mai conto d'impegnarsi ad aspettare che piovva, perchè nascono solamente i semi dell'erbe: poi-

poichè la maggior parte non nascono prima che ne' mesi di Marzo e di Aprile, e queste non sono così nocive come l'altre, che nascono subito seminato il grano; perchè essendo il medesimo già impoessato con le barbe, ed assai grandicello, comincia tosto a crescere con tutta vivezza, ateso il beneficio della calda Stagione; e intanto l'erbe nate di Marzo e di Aprile restano superate, e per così dire, affogate dalle fila del grano, senza che abbiano tempo di poter crescere ugualmente in sua compagnia. Adunque si faccia tutto il possibile per seminar presto, che vale a dire nella propria stagione, con tutto che la terra sia tanto asciutta che spolveri; poichè è cosa certissima in pratica, che il seminar presto, non inganna quasi mai; ed il seminar tardi può produrre una raccolta fallace, chechè dicano in contrario i Contadini inesperti. E le ragioni per le quali le semente fatte anticipatamente in tempi propri sono sempre le più sicure, e più fruttifere, sono in primo luogo: che non essendo anche l'aria fredda, vi è subito da considerarsi il vantaggio, che nel medesimo terreno meno quantità di seme basta; ed in secondo luogo è da valutarsi molto il nascere, che fa tutto il seme facilmente in pochissimi giorni; cominciando immediatamente ad agire con le barbe, che in breve si fanno grosse; allungandosi, e internandosi nella terra; e in tanto il grano fa cesto, moltiplicando la figliuolanza delle fila, che tosto si assodano, facendosi complesse e robuste in modo, che venendo poi il freddo eccessivo, e le soverchie umidità, resistono più francamente; e passando alla Primavera, risolvono molto più presto, cominciando vivamente ad agire e crescere in maniera, che venendo il caldo e l'alsciuttore, le fila sono così avanzate e assodate, e le spighe sono tanto avanti, che più facilmente si difendono dalle nebbie, dalle vampe del Sole, dalla ruggine, ec. Laddove l'altre fatte troppo tardi, sopraggiugnendo il freddo, stentano, e stanno molto a nascere, oltre la semente, che si perde, e intanto il tempo fugge, e le barbe (che sono la base fondamentale delle raccolte più o meno abbondanti) non agiscono; nè si fanno proprio il terreno; di modo che venendo la Primavera, ed essendo state le barbe così piccole, e delicate già oppresse, addormentate, e trattenute dalla

dalla rigidezza del ghiaccio, e dalla soverchia umidità, risolvono molto più tardi, e così freddamente, che fanno un solo filo debole, emiserabile, languido, e affatto incapace di resistere, e difendersi dalle nebbie, dalle vampe del Sole, dalle ruggine, ec. cose tutte da me sempre osservate, e vedute ogn'anno accadere molto più nelle sementi fatte male e tardi, che nell'altre fatte bene, e in tempi proprij, ec.

Si cerchi in oltre di appropriare le qualità del seme del grano vecciato, segalato, ed altre robe, al suolo, e al clima, essendo certo, che quando il caso portasse, che vi fossero de' Padroni, o altri soprintendenti, che avessero poca pratica, possono far poc' altro che riportarsi a qualche Contadino più intendente, già abitante da qualche tempo nel paese, e pratico delle possessioni; perchè in questo ho veduto coll'esperienza, che se ne trovano qualcheduni, che a forza di pratica fanno bene appropriare al clima, e al suolo le qualità del seme. Ne si semini mai quando la terra è troppo bagnata, nè in giornate piovose, essendo questo ancora, a mio giudizio, uno de' maggiori disordini, che possa farsi in questo genere.

In quanto poi al modo più proprio di seminare, io dico esser cosa molto necessaria, che l'uomo che semina, sia sbrigato, e pratico, e lo faccia in maniera, che uscendoli dalla mano il seme, vada un poco in alto, acciò cada in terra a piombo, poichè in questo modo si allontanano più giustamente l'uno dall'altro i grani, e più facilmente si fermano subito tutti in terra appunto nel luogo, ove cadono, in più giusta debita lontananza uno dall'altro.

Seminato che sia il seme del grano, si copra subito benissimo con la terra, particolarmente nelle terre leggere, sottili, asciutte, e situate in positura scoscesa, e non tanto leggermente, come malamente vien praticato; poichè essendo questa sorta di terra più soggetta dell'altra ad esser portata via dall'acque piovane, restano poi le barbe del grano quasi affatto isolate e scoperte, ed oltre al pregiudizio di non potere approfittarsi validamente della terra, restano maggiormente esposte a' rigori del ghiaccio, e del caldo; e massime il grano, che resta nelle coste, o alle sponde, perchè questo si vede molte volte quasi affatto staccato della terra. Quin-

di si vedono poi spighe di più forte, cioè grosse, lunghe, mezzane, ed altre tanto piccole e miserabili, che fanno quasi nulla affatto.

Facciasi adunque tutto il possibile per seminar sempre in tempo di propria stagione, benchè la terra sia asciutissima; nè si consideri oramai tanto necessario l'aspettare che nalcano l'erbe per mezzo delle pioggie: si praticchi piuttosto di seminar più presto, e più spesso ne' paesi freddi, e nelle terre forti, umide, frigide, ed ombrose; e si adatti la qualità del seme alla proprietà del clima, e del suolo; seminando in modo, che i grani restino in giusta lontananza, coprendoli subito benissimo con la terra, massime ne' paesi ove ella è fertile, è situata in positura sciolta. E resti ognun persuaso, che i grani non faranno tanto soggetti alle nebbie, alle brinate, alle ruggini, ec. e renderanno quasi sempre sicure, copiose, e abbondanti raccolte: essendo verissimo, che questa sorta di disgrazie vengono solamente alle sementi fatte male, tardi.

CAPITOLO IV.

Del tempo di mietere, o segare; e del modo di abicare, o abbarcare il grano, ed altre robbe.

IN quanto al tempo di segare, o mietere il grano, ec. questo non è limitato, perchè in alcuni paesi secca, e si perfeziona più presto; ed in altri più tardi, ciò che accade talvolta anche in un medesimo Campo; e perciò avanti di legarlo vadano persone pratiche a visitarlo, e riconoscerlo esattamente, affinchè non venga mai segato prima che non sia secco, e ben fatto; il che si conosce facilmente dalla mutazione del colore, che fa la sua paglia, quale di gialla diventa bianca; e dalle spighe che si torgono molto più acutamente nel collo, piegandosi colle cime all'ingiu' a guisa di uncini: ambedue veri, e sicuri contrassegni, che il grano è giunto alla sua perfezione ed allora si seghi colla maggiore sollecitudine; mettendolo di mano in mano, che si sega, con buon ordine disteso, ed allargato in terra per il traverlo, e sopra il solco, acciò si asciughino, e si stagionino ugualmente presto tanto le spighe, che la paglia.

Io dico che non si segghi mai il grano, nè altra roba prima che non sia compiutamente fatta; perchè segandosi prima, quando è in latte, o, come altri dicono, in cera, resta sempre meno pelante, vizzo, grinzoso, ed imperfetto, e difficile a seccarsi, e stagionarsi bene, di modo che facilmente poi riscalda, si vuota, e va a male.

Adunque, dopo segato, e disteso in terra, come abbiamo detto, ed alquanto secco, stagionate le spighe, e la paglia, si legghi in piccole manne, o, come altri dicono mannelli, o covoncelli, facendo subito le barche, ovvero biche tonde, sode, e ben serrate, colle spighe voltate tutte al di dentro, in maniera che pioviendo, non possa mai penetrarvi l'acqua, nè altra umidità; affinchè il grano, e la paglia possano maggiormente stagionarsi bene. Nè mai si faccia, come malamente vien praticato in alcuni paesi, dove in vece di fare le buche tonde, fanno le reste lunghe, mettendo le manne del grano per dritto col calcio della paglia in terra, voltate le spighe all'insù in maniera che s'incrociano quelle di una manna con l'altra; e così seguitando, appoggiano sempre per dritto una manna all'altra, facendo queste reste di figura molto lunga; lasciandole poi ne' campi allo scoperto fino al tempo della battitura; e intanto restano tutte le spighe colla maggior parte della paglia, esposte per tutto quel tempo, non solo alle guazze della notte, ma all'estremo caldo del giorno; e quel ch'è peggio, tal volta alle piogge; di modo che la paglia perde molto del suo sapore, e natural sua bianchezza, e parimente il grano con quell'inumidirsi, ed asciugarsi sovente, perde il suo bel chiaro e lustro naturale, diventando più oscuro, e di brutto colore. Laddove l'altro bene abicato, o abbarcato strettamente, si conserva più chiaro, lucente, sano, perfetto, e durevole; e bianca, salda, odorosa, e saporita la paglia. Cose tutte che più chiaramente dimostra la sola pratica.

TRATTATO DE' COCOMERI.

Della qualità della Terra atta, e propria per li Cocomeri.

CAPITOLO PRIMO.

LA terra per uso de' Cocomeri veramente stimabili, come fanno nella nostra pianura di Pistoja, vuol essere in pianure di paesi caldi, e di campagne aperte, dominate dall'aria, e dal Sole, sana, di buonissimo fondo, grassa, pastosa, leggierosa, che stritoli, pronta, e attiva, purchè non sia troppo arenosa, nè tanto forte, che nella State per il gran caldo si ferri, e s'unisca tanto insieme, che faccia dell'apertura, e col modo di poterla adacquare; e che la superficie del suolo sia in positura tale, ch'abbia per più versi un poco di declive, per il dovuto, e necessario scolo dell'acque superficiali.

CAPITOLO II.

Del tempo, e del modo di vangare la terra per uso de' Cocomeri, e del modo di seminarli.

IL più vero tempo di vangare la terra per uso de' Cocomeri, egli è dal principio fino a' venti del Mele d'Aprile; purchè sia tanto asciutta da potersi facilmente travagliare; vangando, e smuovendo minutamente tutto il suolo tre palmi al fondo per il meno; cavando benissimo tutta la gramigna, radiche, ed altre erbe, che suol facilmente produrre questa sorta di terra. Si costituisca la superficie del suolo, quando di sua natura non fosse in positura tale ch'abbia un poco di declive per più versi, acciò possano scolare, e andarsene superficialmente l'acque piovane, e la terra sia in maggiore attività, nè mai addormentata dalla soverchia umidità. Passati poi due o tre giorni dopo vangata, e pulita dall'erbe, radiche, ec. s'erpichi replicatamente tutta per più versi, tanto che restino bene stritolate, e disfatte tutte le grosse, mezzane e minute zolle.

Dopo

Dopo vangata , erpicata , e pulita la terra , giunti circa a' ventiquattro , o venticinque del mese d' Aprile , che ne' paesi un poco caldi , è il vero tempo di seminare i Cocomeri si lavori coll' aratro grande , che faccia il solco largo due palmi e mezzo all' incirca , comprefoci il lembo , o sia ciglio , facendo i solchi che vadano , per quanto sia possibile , per l' aria di Mezzogiorno , e tramontana , mettendo subito arata due solchi insieme , tirando col marrone un lembo , o come altri dicono , un ciglio addosso , e per meglio dire appoggiato all' altro , in maniera che vengano a formare una sola porca , o sia passata , larga cinque palmi all' incirca , in modo che dalla parte di Levante resti bassa al pari del fondo del solco già fattovi con l' aratro ; e dalla parte di Ponente resti alta quasi quanto l' altezza del lembo : cosa che serve non solo per facilitare maggiormente lo scolo dell' acque piovane ; ma anche perchè i semi de' Cocomeri (che di questa stagione tuttavia un poco fredda sono piuttosto difficili a nascere) possano godere più facilmente il beneficio dell' aria e del Sole , che mette la terra in maggior attività , facilitando , e accelerando la nascita ai medesimi semi , che tosto s' internano , e s' assicurano colle loro barbe nella terra .

Subito preparate le porche , o passate , come sopra s' è detto , si facciano con la vanga , in mezzo di ciascheduna porca , le buche , due palmi , e mezzo all' incirca larghe per tutt' i versi , e due profonde , acciò siano capaci di staja uno e mezzo di concime per ciascheduna , e lontane dodici palmi pure all' incirca una dall' altra ; avuto riguardo , che non si riscontrino immediatamente , ma vengano sterzate per tutt' i versi , o come altri dicono , in quincunce , mettendovi poi il concime nella quantità sopra accennata , sempre pigliarlo , per non diminuirli la sua attività ; tirandovi poi sopra la terra , benissimo stritolata , senza pigliarla niente affatto ; facendo appunto sopra il concime per il lungo della porca coll' occhio del marrone un piccolo solchetto , chiamato comunemente occhiello , profondo per la grossezza di due dita , e lungo circa a un palmo ; coll' avvertenza che sopra il concime vi resti per l' altezza di quattro dita di terra per lo meno ; mettendo poi spartatamente in ciascheduno occhiello otto , o diciase-
mi

mi di Cocomero stati prima per tre o quattro giorni a rinvenire nell'acqua dolce, coprendoli tosto leggermente con terra sottile, benissimo stritolata, e un poco arenosa, acciò pioviendo non faccia crosta, e impedisca la nascita: Nè si faccia mai questa faccenda, mentre la terra sia troppo bagnata; indugiando più tosto a seminarli qualche giorno più tardi, eziandio che si dovesse aspettare anche a' primi giorni di Maggio. Non potendo nè pure in questo fare una ricetta, attesa l'incertezza della stagione, dalla quale bisogna dipendere onninamente.

CAPITOLO III.

Del tempo di cominciare a preparare i concimi per li Cocomeri, e delle sue necessarie qualità.

IL tempo di cominciare a preparare, e mettere all'ordine i sughi, o siano concimi per li Cocomeri, egli è subito terminato il mese d'Ottobre, tosto che si cominciano a cavare le vinacce dalle Tine, mescolandole con l'altro concime, o sia letame di Cavalli biadati, e di pecore, in tanta quantità, che siano metà concime di Cavalli, e l'altra metà tra concime di pecore, e vinacce; mettendolo subito in luogo, dove non possa piovere, mescolandolo, e stritolandolo benissimo ogni quindici o venti giorni una volta, acciò si venga a smaltire, e farsi tutto d'una medesima qualità; e caso che restasse troppo asciutto, come suole accadere, e che per questa causa non potesse fermentare, nè pigliare il suo calore per smaltirsi, e tritarsi; in questo caso vi si metta sopra tanta quantità d'acqua, che lo renda un poco bagnato da per tutto, facendo questo subito mescolato, acciocchè l'acqua possa più facilmente penetrarvi, e allargarsi da per tutto, tenendolo sempre ammassato, e unito strettamente insieme. Giunti poi al principio del mese di Marzo, si consideri la quantità del suddetto concime, e si pigli per la quinta parte all'incirca del sterco di colombi, e di polli, ed un'altra quinta parte di lupini scottati in caldaja, mescolando ogni cosa minutamente con la massa dell'altro concime: nè si lasci per quanto sia possibile di pigliare un'altra quinta parte per lo meno di cessino, e siano materie grosse, che si ca-

si cavano dalle cloache delle case, mescolandole col medesimo concime, quale poi si mescoli per due, o tre volte, tenendolo sempre ammassato strettamente insieme. Venuto poi il tempo di seminare i Cocomeri, si metta nelle buche, fatte come sopra si è detto, nella quantità di staja uno e mezzo per ciascheduna; e faremo sicuri di Cocomeri molto grossi, di buccia soda, bella, nera morata, e di una pasta molto rossa, calda, odorosa, e saporita; purchè il seme sia di buona razza; perchè ve ne sono di moltissime qualità, ma è da sapersi, che i migliori sono quelli, che fanno la buccia liscia, nera morata, e il gambo lungo, coll'attaccatura rabescata, e di circonferenza grande più di un mezzo toloero, ed il fiore retondo, e grande quasi come un tellone; essendo questi ordinariamente i migliori, i più pesanti, e i più durevoli; ma dall'altro canto maturano un poco più tardi degli altri; e la maggior parte sogliono essere di seme nero, o capellino, benchè ve ne siano anche di seme bigio, ma pochissimi se ne trovano di seme rosso. Assicurando ognuno, che la grossezza, bellezza, e bontà de' Cocomeri, dipende in primo luogo dalla razza del seme, e molto dalla qualità del suolo, e de' concimi.

CAPITOLO IV.

Del tempo, e del modo di coltivare le piante de' Cocomeri.

IL tempo di cominciare a coltivare le piante de' Cocomeri non si può appunto limitare, poichè dipende dalla stagione, e conseguentemente dalla nascita anticipata, o posticipata.

Sappiasi adunque, che dieci, o dodici giorni dopo nati, vedendo che siano bene assicurati, e di buono e vivo colore da poterli distinguere i migliori, se ne lascino soli due gambi per buca, sempre i più belli, purchè siano un poco lontani uno dall'altro; sbarbando immediatamente tutti gli altri più inferiori, e languidi. Cresciuti poi tanto ch'abbiano tre o quattro foglie, si zappi, e si smuova da per tutto il campo ugualmente la terra, sollevandola diligentemente all'intorno delle piante, rialzandole con avvedutezza il gambo fin all'

Q

altezza.

altezza delle foglie, senza pigliarla, nè serrarla niente affatto, pulendola benissimo da tutte l'erbe, che vi fossero nate, appianando un poco le porche per la parte dell'aria di Ponente, in maniera che cominciano a fare la figura tanto da una parte che dall'altra, affinchè le piante de' Cocomeri restino sul più alto della porca.

Cresciute poi tanto ch'abbiano circa a un palmo e mezzo di tralcio, si zappi, si muova, e si pulisca nuovamente tutto il suolo della terra, appianandola ugualmente, massime intorno alle piante, ricalzandole con avvedutezza, voltando le punte de' tralci sterzatamente per tutt'i versi del campo, acciò lo riempino, e comprino da per tutto ugualmente; lasciando due stradelle che s'incrocino, dove s'impedisca che non vadano i tralci, tenendoli spesso voltati colle punte al di dentro del campo, affinchè si possa liberamente palleggiare senza offendere, nè calpestare i medesimi tralci, tenendoli guidati, e sterzati in maniera che non vi resti niente di terreno scoperto.

Cominciando poi a fiorire, e conseguentemente ad annodare i Cocomeri; di mano in mano che se ne vedono de' grossi, che pesino due, o tre libbre, si piglino destramente per il gambo, posandoli in terra dalla parte del fiore, acciò possino crescere con maggior comodo, venendo poi più grossi, più tondi, e di migliore e più bella figura, tagliando i tralci più piccoli, che nati fossero da' tralci grossi e maestri, che hanno già prodotti Cocomeri, e questi si spuntino lontani più d'un braccio da' medesimi Cocomeri. Ma è da saperli, che in questa tagliatura e spuntatura di tralci, o, come altri dicono, potatura, bisogna farla per mezzo di persone pratiche e intendenti, altrimenti si corre rischio troppo manifesto di fare un grosso male, essendo cosa molto facile di tagliare i tralci buoni, e lasciare i cattivi, ovvero spuntarli troppo corti, e intanto perder molto frutto; di modo che non avendo persone pratiche, io tengo per cosa certa, che possa essere più utile il lasciarli scorrere liberamente senza tagliarli, nè spuntar li tralci di sorta alcuna, più tosto che farlo per mezzo di persone, che non abbiano nè pratica, nè cognizione.

Avanzandosi poi la stagione sempre più calda, e giunti circa alli venti del mese di Luglio, e forse prima; e

Veduto che le piante de' Cocomeri patifchino per il troppo asciuttore, s'adacquino immediatamente prima ch'abbiano cominciato a patire e soffrirarli, facendo entrare placidamente l'acqua per il campo tanto che la copra quasi da per tutto; tenendolo così coperto per una notte intiera ovvero per cinque o sei ore da mattina, acciò la terra abbia tempo d'inzupparsi da per tutto ugualmente. Levata poi l'acqua, si sta per qualche giorno tanto che la terra sia un poco assodata, senza passeggiare il campo. Praticando poi le medesime diligenze di rivedere spesso i Cocomeri, addirizzandoli, come sopra si è detto; poichè una sola adacquatura fattali copiosamente in tempo opportuno, è capace di condurre perfettamente i Cocomeri alla dovuta maturità.



244
T R A T T A T O

De' lavori, semente, potature ed altre cose, che accadono mese per mese.

CAPITOLO PRIMO.

De' lavori, semente, ed altre cose da farsi nel mese di Gennaio.

IN questo mese si seminano le Fave marzuole, la Scandella, l'Orzo, le Vecce, i Ceci rossi, le fave Napolitane negli Orti; ed in altri luoghi; si seminano i mochi, le Cicerchie, i Cavoli di più e diverse qualità, i semi delle Pera, Mela, ed altri frutti.

Si fanno i vivai di puppole, o come altri dicono Uovoli d'Ulivo, i vivai d'Uliva strelli selvatici, che nascono dal seme, i vivai di Gelsi, i vivai di Peri, Meli, Sufini selvatici, pruni bianchi, ed altro.

Si fanno le sottomesse, o siano propaggini di Viti di buona razza, i Cannai, o come altri dicono Canneti, le fosse da Ulivi, Viti, ed altre piante.

Si piantano gli Ulivi di tutte le sorte, i magliuoli delle Viti, i Gelsi di tutte le sorte, i frutti di diverse sorte, le Rose, i Noci, i Nocelli, o siano Nocciuoli, gli Ontani, le Vetrice, ed altre piante simili negli Argini de' Fiumi; ed in altri luoghi, per difesa de' beni; si piantino i Melagrani, le Cipolle, massime le bianche, e gli Agli.

Si governano gli Ulivi, magliuoli, Gelsi, ed altre piante piantate del medesimo anno, quando non si sia potuto farlo di Novembre, e Dicembre, che sono i mesi molto più propri per queste facende; si governano gli Ulivi, le Viti, ed altre piante vecchie.

Si potano gli Ulivi, ed altre piante; le Viti, mentre non siano giornate troppo fredde, e rigide; si potano i Peri, Meli, ed altre piante di frutti.

Si tagliano i legnami da segare per farne travi, ed altri diversi lavori, le legna per il fuoco; si tagliano, e s'appuntano i pali, e le Calochie, essendo questa la più vera, e la più sicura stagione, perchè resistono molto più.

Si

Si rivedono, e s'accomodano i canali e le fosse, che servono per li scoli dell'acque, acciò queste portino via meno terra che sia possibile, massime nelle Colline, ed in altri luoghi montuosi, e scoscesi, dove sogliono far danni, che portano seco pessime conseguenze, benchè a prima faccia pajano di poca considerazione.

Si rivoltano, e si mescolano più volte i concimi.

Si ammazzano i Majali, salando i presciutti, e la carne.

Si radunano, e si stagionano i semi di tutte quelle frutta che marciscono, e che si mangiano alle tavole.

Si rivedono più volte l'Uve, e le frutta, esitando sempre quelle più fatte.

Si sentono, e si mutano quei Vini, che ne hanno bisogno, esitando sempre i più fatti e viziosi.

Si riempiono più volte le Botti, particolarmente ne' tempi umidi, e piovoli.

Si rivedono i Bestiami, che tengono alle stalle i Contadini, massimamente le Pecore, pigliando nota di tutte quelle che hanno figliato, e che devono figliare.

Si cominciano a scuotere, raccogliere, e stagionare le Ulive; si tagliano le Canne; si legano le cime dell'insalate per farle bianchire.

Si rivedono esattamente le possessioni, tenendo risvegliati i Contadini, acciò facciano le dovute, e necessarie faccende; si rivedono le case che abitano i Contadini, osservando se vi siano travi, o altre cose, che minaccino rovina, per rimediarle sempre colla minore spesa; si rivedono i Grani, ed altre robe, esitando sempre le più imperfette; si rivedono minutamente i Boschi, e le vernacchiate, o siano palaje, o pollonetti, particolarmente di questa stagione, in cui i medesimi Contadini sogliono far molti danni; si rivedono i concimi, fieni, paglie, ed altri strami, che hanno i Contadini, acciò siano con qualche timore, e li vendino più difficilmente.

Si tengono ben ferrati, e caldi gli Ollari, o siano coppaje, o magazzini, acciò non s'accagli mai l'olio.

CAPITOLO II.

De' lavori, semente, potature, ed altre cose da farsi nel mese di febbrajo.

IN questo mese si seminano le Fave marzuole, la scandella, l'Orzo, e le Vecce, i Ceci rossi, le Fave napolitane negli Orti, ed in altri luoghi; si seminano i mochi, le Cicerchie, i Piselli, il Grano marzuolo, li Noccioli dell'Ulive, li Noccioli delle Persiche, li Noccioli delle Prune o siano Susine, li Noccioli delle Ciriege, o siano Ciliege, i semi delle Pera e delle Mela, le Noci, e le Nocelle, il seme de' Cipressi, il seme degli Aranci forti, che sono i migliori, il seme degli Sparagi, si seminano molti e diversi semi d'erbaggi da Orti, le mandole, il seme del fieno nelle terre prattive, ed in altri luoghi.

Si fanno i vivai d'Uovoli d'Ulivo, i vivai d'Uliva-strelli selvatici, che nascono dal seme, i vivai di Gelfini, i vivai di Peri Meli, Susinelli selvatici, Pruni bianchi, e altro, &c.

Si fanno le sottopesse, o siano propaggini di Viti di buona razza, si fanno le fosse da Ulivi, Viti, e altre piante.

Si piantano i Canneti, i frutti di più e diverse sorte, gli Ulivi, i Gelsi, i magliuoli delle Viti, gli Alberelli, e come altri dicono, pioppetti, le saliche, le mazze de' falci, le mazze delle Pera cotogne, i Melagrani, gli Ontani, le Vetrice, ed altre piante simili, negli Argini de' Fiumi, ed in altri luoghi per difesa de' beni; si piantano le mazze del rosmarino, i rami della Salvia, gli Agli, e le cipolle, i Cavoli di diverse sorti, ed altri erbaggi; si piantano i Castagnuoli nelle Selve, e le radici degli Sparagi, le Fraule, le Flambuese, o come altri dicono, lampioni, e le piante del Rebes.

Si cominciano a fare gl'Innesti di quelle piante, che cominciano a muovere, e mettere più anticipatamente.

Si tagliano le capne, i legnami da segare per farne travi, ed altri diversi lavori, quando non si sia fatto al principio d'Gennajo, ch'è la stagione più propria. Si tagliano, e s'appuntano i pali, ma questo pure anderebbe fatto del mese di Gennajo; e si tagliano le legna per il fuoco.

Si

Si potano, e si cominciano a legare, e piegar le Viti. Si potano gli Ulivi, gli Agrumi di tutte le sorte, le piante de' frutti di tutte le sorti.

Si governano le piante di tutte le sorte, i prati, e i canneti.

Si riempiono più volte le botti; si sentono i Vini, esitando sempre i più fatti, e viziosi.

Si rivedono più volte l'Uve, e le frutta, esitandosi sempre quelle più fatte.

Si raccattano, e si stagionano i semi di tutte quelle frutta, che si mangiano, e marciscono.

Si rivedono i Grani, ed altre robe, esitando le più imperfette.

Si rivedono al solito i canali, e le fosse che servono per i scoli dell'acque, si rivedono i Boschi, e le palizzate, acciò i Contadini facciano meno danni che sia possibile; si rivedono minutamente le Vigne, ed i filari delle Viti, obbligando i Contadini a riempire i luoghi vuoti con propagini, o con magliuoli di buona razza; e si fanno gl'innesti delle Viti.

Si pulischino dall'erbe le porche degli Sparagi.

Si mescolino più volte i concimi.

Si proibiscano i Bestiami dalle praterie, che sono in luoghi caldi, e conducano presso il fieno.

CAPITOLO III.

De' lavori, sementa, potature, ed altre cose da farsi nel mese di Marzo.

IN questo mese si semina il Grano marzuolo, il Lino marzuolo, la Scandella, le Vecce, l'Orzo, le Fave marzuole, le Zucche nere; avvertendo che tutte le suddette robe si seminano al principio del mese. Si semina la Canapa, i Cetrioli, il Basilico, il seme della lattuga dall'Estate, il seme delle more di Gelfo, il seme delle Pastinache, il seme delle Bietole, il seme de' Carcioffi, il seme di diversi erbaggi per insalate, e per odori. Si semina ancora il seme de' Capperi, de' Porri, de' Cavoli neri di diverse sorti, i semi degli Aranci forci, il seme di diverse qualità di fiori, il seme de' Cipressi. Si seminano le mandorle, le noci, le nocelle, i semi delle pera, e delle mele, e il seme del fieno nelle terre prative, ed in altri luoghi.

Si piantano gli Ulivi, i Magliuoli, i Gelsi; trami di Fichi, le piante de' frutti di diverse sorte, a riserva di alcune che mettono anticipatamente, come farebbero Mandorli, Persichi, Nocelli, e simili frutti da osso. Si piantano gli Alberelli, le Saliche, gli Ontani, e le Vetrice negli argini de' Fiumi; ma sarebbe meglio farlo ne' mesi di Novembre, o di febbrajo. Si piantano le mazze de' Salci ne' canali, ed in altri luoghi. Si piantano le piante degli Agrumi, le mazze di Rosmarino, le rame della Salvia, diverse qualità d'erbe per insalate, e per odori. Si piantano le mazze de' Peri, o siano Meli corogni, i Cavoli cappucci, i Cavoli piacentini, o, come altri dicono, Veizotti, o lombardelli, i Cavoli neri, le Fraule, le Cipolle, e diverse qualità d'insalate.

Si terminano di potare, piegare, e legare tutte le Viti. Si fanno le sottomesse, o siano propaggini di Viti di buona razza.

Si potano le piante de' frutti di tutte le sorte, le piante degli Agrumi, gli Ulivi, i Capperi, i Gellomini di tutte le sorte.

Si piantano i Canneti,

Si fanno i vivai di Gelsini, i vivai d'Uovoli d'Ulivio, d'Ulivastrelli selvatici, che nascono dal seme; i vivai di Peri, Meli, Susinelli, Pruni bianchi, e simili, ec.

Si fanno gl'innesti di più e diverse sorte di frutti.

Si scalzano, e si governano gli Ulivi, e le Viti, i Gelsi, frutti, ed altre piante; ma è sempre più utile e vantaggioso farlo ne' mesi passati.

Si riconoscono i Canali, e le fosse, che servono per li scoli dell'acque.

Si accomodano le Colombaje, rimettendovi i cestini a' loro soliti posti.

Si storchiano e si puliscono i Grani dall'erbe, dalle vecchie domestiche e selvatiche.

Si colgono le Pine.

Si accomodano, e si rifanno quel poggi o cigli caduti nella passata invernata.

Si mettono a utile le Cavalle, e le Somare, facendole figliare anche a' Muletti.

Si rivedono più volte l'Uve, e le frutta, esitando sempre le più imperfette.

Si riempiono più volte le Botti, e si scemono più volte i vini, esitando i più fatti e viziosi.

Si

Si comincia a vangare la terra per seminarla a saggina, ed altre biade.

Si riconoscono tutt'i Bestiami, che tengono i Contadini, ricordandoli che governino più del solito que' vecchi per poterli esitare a' primi mercati di Giugno; e si proibiscono i bestiami da tutte le praterie.

Si tagliano e si conservano sotto la terra gentile, ovvero rena fresca; le mazze di gelfo, per cavarne poi gli anelletti per fare gl'innesti; e si scelgono, si tagliano, e si conservano come sopra, i capi delle viti di buona razza, per farne poi gl'innesti.

Si rivedano i grani ed altre robe, esitando sempre le più imperfette.

Si rivedano i Boschi, terminando di tagliare le legna per il fuoco.

Si mescolano, e si rivoltano più volte i contimi.

Si comincia a pensare a trovare le famiglie per quei Poderi, che si vogliono mutare i Contadini; essendo questa una cosa di somma importanza, ed altrettanto difficile a trovare famiglie che siano veramente buone.

CAPITOLO IV.

De' lavori, semente, ed altre cose da farsi nel mese d'Aprile.

IN questo mese si vangano le terre per seminarle a Saggine, Migli, Panichi, Grani turchi, ed altre biade; e si vangano al fondo più del solito le terre, che devono servire per uso de' Cocomeri, Zatte, Meloni, o siano poponi, e simili.

Si seminano le Saggine tanto quelle per mangiare, che l'altre chiamate spargole, che servono per uso di granate. Si semina il Miglio bianco, e giallo, il panico come sopra, i Cocomeri, le Zatte, ed i Meloni, le Zucche di tutte le sorte. Si semina il seme delle Viglie, che servono per Granate grandi per uso dell'Aje. Si seminano i Ceci bianchi, i faggiuoli di tutte le sorte, il finocchio dolce, il Granturco, o, come altri dicono, il Formentone, e si semina il seme delle More di Gelfo. Si seminano i Capperi, i Piselli, e molti, e diversi semi d'erbaggi da Orti. Si semina il seme de' Porri, de' Cetrioli, della Canapa, de' Meloni dall'Inver.

verno, il seme di diverse qualità di Cavoli, de' Ravanelli, e delle radici.

Si piantano i Cavoli Cappuccini, i Cavoli Piacentini, e diverse qualità d'insalate lattughe. Si pianta il Serapollino, o, come altri dicono, peporino e altre diverse qualità d'erbe odorose.

Si piantano gli Ulivi nelle terre forti, e sottoposte alla soverchia umidità; laddove nelle terre gentili, ed asciutte, è sempre più utile, e vantaggioso il piantarli più anticipatamente che sia possibile. Si piantano i magliuoli delle Viti nelle terre come sopra, i rami de' Fichi, le piante degli Agrumi, gli Alberelli, i Gelsi, le Saliche, i Peri, Meli, Susini, ed altre piante di frutti.

Si fanno i Vivai d'Uovoli d'Olivo, i Vivai d'Uliverelli selvatici, che nascono dal seme; vivai di Gelsini, di Peri, Meli, Susini selvatici, Pruni bianchi, e simili; avvertendo che questi suddetti vivai anderebbero fatti al principio del mese, quando non si siano fatti ne' mesi di Febbraio e Marzo, che sono i tempi molto più propri.

Si fanno gl'Innessi di più e diverse sorte di frutti, siccome gl'innessi de' Gelsi, e de' Castagni.

Si mette a nascere il seme de' bachi da seta.

Si potano i Gellomini, gli Ulivi, le piante de' Frutti; e si potano, e si mutano da un vaso all'altro le piante degli Agrumi.

Si comprano gli Agnelli di razza grossa per allevarli, e farne Castrati, o come altri dicono, mannerini.

Si puliscino i Grani dall'erbe, e dalle Vecce selvatiche, e domestiche.

Si riempiono più volte le botti, e si sentono i Vini, esitando sempre i più fatti, e viziosi.

Si rivedono più volte l'Uva, e le frutta, esitando quelle più fatte.

Si rivedono minutamente le possessioni, chiamando i Contadini, facendo i conti campo per campo delle Fave, Scandelle, Vecce, Orzi, e altro che hanno seminati, per vedere se riscontrano almeno all'incirca col seme dato.

Si mescolano più volte i concimi.

Si rivedono i Bestiami, e le pecore che tengono i Contadini, pigliando nota degli allevi nati quell'anno.

Si comincia a tendere agli Ortolani passata la metà del mese.

Si

Si scoprono i boschetti degli Agrumi, vangando e governando subito il terreno.

Si cavano dagli stanzoni le piante degli Agrumi.

Si rivedono minutamente le selve, dove si ricavano, e s'accomoda gli aquaj, o siano rastegni per l'acque intorno al piè de' Castagni, essendo cosa molto importante, e necessaria.

CAPITOLO V.

De' lavori, semente, ed altre cose da farsi nel mese di Maggio.

IN questo mese si semina il Miglio bianco, e giallo, il Panico come sopra, i Ceci bianchi, i Faggiuoli di tutte le sorte, i Cocomeri, i Meloni, e le Zatte, i Meloni dall'Inverno, le Zucche di tutte le sorte, i Cetriuoli, gli erbaggi da Orto di diverse sorte, i semi delle radici, e ravanelli, il Gran turco, o sia Formentone, la Saggina, anticipando più che sia possibile non solo per questa, ma per tutte l'altre cose suddette, poichè passati dieci o dodici giorni del mese, ce ne andiamo troppo nel tardi, e si fanno più scarse le raccolte.

Si piantano i Cavoli fiori, ed altri di diverse sorte, i Porri, i Sedani, diverse qualità d'insalate, ed altri erbaggi.

Si cavano le fosse che sono accanto alle terre vangate del medesimo anno.

Si comanda a' Contadini che governino più del solito i Bestiami vecchi per venderli a' mercati di Giugno, non ostante la perdita.

Si tolgono le pecore.

Si scacchiano, o come altri dicono, si sbastardano le Viti, levando tutt' i capi senz' Uve, ed altri bastardi, inutili, e dannosi.

Si scacchiano le piante de' Peri, e degli Agrumi, levandole tutte le nuove sortite, superflue, inutili, e dannose.

S'innestano gli Ulivastrelli selvatici, cominciando al principio del mese, pigliando sempre le mazzette domestiche da Ulivi gagliardi, e di buona razza.

Si rivedono minutamente i Bestiami, che tengono i Contadini, e si vendono subito tutti quelli che mostrano di voler far poca buona riuscita, per non tenerli
(come

(come suol facilmente accadere) tutta la State con poco o niente d'utile.

Si puliscino i grani dall'erbe, e dalle Vecce selvatiche; si puliscano i Lini, e le Canape come sopra.

Si cominciano a farchiare, e diradare i Grani turchi, e le Saggine.

Si farchiano, e si diradano i Cocomeri, Zatte, Meloni, Zucche, Cetriuoli, e simili, lasciando solamente un gambo, o due per buca; si comincia a diradare, e farchiare il Miglio, Panico, Ceci, Faggiuoli, e simili.

Si colgono, e si stillano le rose, altri fiori, ed erbe medicinali.

Si rompono, o, come altri dicono, si smaggesano le terre per seminarle a Grano nel medesimo anno.

Si preparano, o si mettono all'ordine i vasi chiamati bugni per i nuovi sciami dell'Api.

Si cominciano a zappare le Vigne, ed i filari delle Viti, tagliandoli sempre tutte le barbe che si trovano fra le due terre, e nel medesimo tempo, silevano (non solo per il fusto vecchio, ma anche per il capo piegato di quell'anno) tutte le sortite che si vedono senz'Uve, ed altre superflue, inutili, e dannose.

Si potano, e si puliscono i Gelsi subito colta la foglia, cominciando a coglierla sempre dalle piante più giovani.

Si cercano i Prugnoli.

Si trasportano le legna alle Città.

Si marchiano i Cavalli.

Si castrano i Bestiami.

Si tende agli Ortolani.

Si mescolano più volte i concimi.

Si riempiono più volte le botti, e si sentono i Vini, esitando i più fatti, e viziosi.

Si rivedono più volte l'Uve, e le frutta; si fanno gl'Innesti degli Agrumi, e de' Castagni ne' Paesi alti.

Si tagliano le piante de' Carcioffi al pari della terra subito terminati di cogliere, e si tagliano le piante delle Fraule subito terminate di cogliere.

Si rivede spesso, rivoltando e stagionando il Formaggio, acciò si conservi bene, perchè non tenendolo ben custodito, facilmente si guasta.

De' lavori, semente, ed altre cose da farsi nel mese di Giugno.

CAPITOLO VI.

IN questo mese si sbarbano, si seccano, e s'ammucchiano i lini, vangando subito quel terreno per seminarlo a miglio, e faggiuoli dall'occhio, che sono le cose più proprie per questa sorta di terreni scelti per i lini.

Si sarchiano, e si ricalzano i Grani turchi, e le Saggine, i Migli, Panichi, Ceci, Faggiuoli, e simili; si sarchiano, e si ricalzano i Cocomeri, Meloni, Zatte, Zucche, Cetriuoli, ec.

S'innestano gli Agrumi, Peri, Balloccchi, o siano meliachi, ec.

Si cava il seme delle more de' Gelsi, che siano perfettamente mature.

Si zappano le Vigne, ed i filari delle Viti, tagliandoli sempre tutte le barbe che si trovano fra le due terre, e si strappino, o si taglino tutte le nuove sortite inutili e dannose.

Si mescolano, e si rivoltano più volte i concimi.

Si vendono i bestiami Vaccini, massime i vecchi, non ostante la perdita.

Si potino, o come altri dicono, si spuntino i tralci de' Meloni, Cocomeri, Zucche, e simili.

Si segano, si stagionano, e si ripongono i fieni, facendosi prima e dopo, secondo che sono i paesi più caldi, o più freddi, e le terre più o meno pronte, e attive.

Si cominciano a segare, abbicare o abbarcare i Grani, Vecciati, Segalati, ed altre robe.

Si licenziano i Contadini, facendosi prima o dopo, secondo che porta il costume del paese.

Si potano, e si puliscono i Gelsi, secondo che richiede il loro bisogno.

Si riempiono più volte le botti, sentendosi i Vini, esistendo sempre i più fatti, e viziosi.

Si rivedono l'Uve e le Frutta, quando ve ne siano.

Si diradano, o, come altri dicono, si scannellano i Cannai, tagliando solamente qualcheuna delle cannuccie più sottili e minute, che non vengono mai buone da nulla, con l'avvertenza di non tagliarne mai una.

una ceppaja tutte affatto, ancorchè siano piccolissime; ma solamente si diradano, non levandone mai più che la terza parte, e le più miserabili.

Si cominciano a rompere e lavorare le terre subito abbicato, o abbascato il Grano per seminarle a Miglio, Faggiuoli, e fagginelle per i Bestiami.

Si farchiano i vivai d'Ulivi, di Gelsi, di Castagnuoli, e d'altri frutti, tenendoli sempre benissimo puliti; e netti da tutte l'erbe; e per quelli che fossero innestati e attaccati, è necessario rivederli esattamente una volta o due la settimana; levandoli tutte le sortite selvatiche, ed altre superflue, e dannole; venute sopra il domestico.

S'allacciano, e si legano leggermente i capi delle Viti, obbligando i Contadini a farlo prima che comincino a segare il grano, ed altre robe.

Si travasa, o come altri dicono, si muta l'Olio da un vaso all'altro, cavandolo dalle sue fondate, e deposizioni, quali si restringono tutte insieme; in uno o più vasi, come ho detto nel secondo Capitolo del trattato dell'Ulivo, e dell'Olio.

Si cominciano a cavare le cipolle, e le radici de' fiori; osservando però che siano compiutamente perfezionate, mettendosi ad asciugare in luogo sano ed arioso, ma non esposto al Sole.

Si coglie il seme delle Rape, del Trifoglio, o sia erba Lupina.

S'obbligano i Contadini, che mentre legano, scelgano, e mettino da parte il grano necessario da serbarsi per seminare il medesimo anno; essendo questa una cosa di somma importanza.

Si coglie il seme de' Cavoli dall'Inverno.

Si rivede spesso, rivoltando e stagionando il Formaggio, acciò si conservi bene; perchè non tenendolo ben custodito facilmente si guasta.

CAPITOLO VII.

De' lavori, semente, ed altre cose da farsi nel mese di Luglio.

IN questo mese si terminano di segare, abbicare, o abbascare i Grani, Vecciati, Segalati, Fave; Orzi, Scandelle, ed altre robe.

Si

Si lavorano, o come alioi dicono, si rompono quelle terre che devono seminarfi di Grano Vecciato, e segalato per raccolte dell'anno venturo.

Si ricalzano i migli, panichi, ceci, faggiuoli e simili prima di cominciare la battitura delle robe.

Si battono i Grani, Vecciati, Segalati, ed altre robe, cominciando a pulirle, seccarle, e stagionarle perfettamente subito battute.

Si tagliano le piante de' Carcioffi, e delle Fraule, adacquando subito l'une, e l'altre.

Si piantano le Cipolle Porraje, o, come altri dicono, i cipolloni; ed alcune cipolle di razza piccola, chiamate scalogni.

Si seminano le Sagginelle per i Bestiami, purchè si faccia al principio del mese; seminando nel medesimo terreno rape, rambolacci, e ravanelli mescolate con la Saggina.

Si fanno gl'Innessi di meliache, o siano ballacocche.

Si potano i tralci de' Cocomeri, Meloni e simili.

Si mettono a utile le Vaccine.

Si rivedono, e si sciorinano i pani lani per liberarli dalle tarme.

Si cominciano a ritirare gli affatti, e le mezzanità delle raccolte benissimo pulite e stagionate, avvertendo che i Contadini mezzajoli diano conto di tutte quelle robe che hanno già prese, e consumate per loro vivere, e per pagare i loro debiti, rasse di Compagnie, ec.

Si cominciano a ricomprare i Bestiami per riempire le stalle già vuote, non aspettando che i Contadini ne facciano loro l'istanza, perchè la maggior parte nè pur vi pensano, e intanto stanno quasi tutta la state con poco o niente di Bestiame, perdendo insieme l'utile, e il contume.

Si rivedono le case, che abitano i Contadini, osservando se vi siano cose che minacciano rovina, per rimediarle sempre colla minore spesa; essendovi verissimo che di questa stagione è molto più facile il trasporto de' materiali, e de' legnami.

Si travasa l'olio di fondi verso la fine del mese, separando il buono venuto a galla: e l'altro torbido ed inferiore si restringa in uno, o in più vasi posti in una stanza più calda, come ho accennato nel secondo Capitolo del trattato dell'Olive, e dell'Olio.

Si

Si rivede spesso il Formaggio, rivoltandolo, ungendolo, e stagionandolo, acciò si conservi bene, perchè altrimenti facilmente si guasta.

CAPITOLO VIII.

De' lavori, semente, ed altre cose da farsi nel mese di Agosto.

IN questo mese si fanno i Vincigli di frasche di Quercia, d'Alberi, o sia Pioppo, che sono i migliori, e d'altre qualità d'alberi per uso de' Bestiami.

Si segano, e si stagionano le Felci per far letto alle pecore, ed altri bestiami, facendo queste il concime molto migliore e più sostanzioso, e attivo della Paglia, delle foglie, e di qualsivoglia altra cosa.

Si cominciano a seminare i Lupini, l'Orzo, il Trifoglio, ed altre erbe, che devono servire per pastura de' bestiami; ma sarebbe bene che il terreno fosse bagnato.

Si erpicano, e si cominciano a rompere la seconda volta le terre, cominciandole a preparare, e mettere all'ordine per le semente de' grani, Vecciati, segalati, ec. pulendole benissimo dalla gramigna, ed altre erbe, radiche, ec.

Si colgono, si battono, e si stagionano i Migli, Pannichi, Ceci, e Faggiuoli, seminati d'Aprile e Maggio.

Si sbarbano, si battono, e si stagionano i lupini.

Si mettono a macerare i Lini, e le Canape.

Si fa l'Agresto; o come altri dicono, l'agresta prima della metà del mese.

Si cavano i fossi, massime nei luoghi padulinghi, e molto umidi.

Si fanno, e si cavano i fossetti, che servono per lo scolo dell'acque delle terre prative: cosa molto utile e necessaria.

Si terminano di pulire, seccare, e stagionare i Grani, ed altre robe.

Si pianta l'Insalata detta Indivia.

Si cominciano a cogliere, e vendere l'Uve pratiche.

Si mettono a utile le Vaccine.

Si cominciano a seccare, e stagionare i Fichi.

Si rivedono, e si mettono all'aria i panni lani.

Si semina il seme dell'Insalato, Lattughe capuocce, i Ramolacci, i Ravanelli.

Si

Si trapiantano i Sedani in solchetti, adacquandoli subito.

Si cominciano a seccare, e stagionare le Mela, Persiche, Sufine, ed altre frutta.

Si sentono i Vini, esitando subito tutti quelli che non si trovano totalmente sani e perfetti.

Si rivedono tutte quelle piante piantate nel medesimo anno; e trovando che patiscino l'asciuttore (come suol facilmente accadere,) sarebbe benissimo fatto l'adacquarele copiosamente, almeno i Gelsi, ed i Fichi, che sono più soggetti a patire dell'altre piante.

Si rivedono minutamente i poderi possi in Colline, sollecitando almeno i Contadini mezzajoli, che rompin le terre, zappandole più al fondo che sia possibile, purgandole dall'erbe, e dalle radiche, mettendole all'ordine per la sementa del Grano ed altre robe. Questa cosa è molto necessaria in quei poderi, che sono alle mani di Donne, e di Garzoni.

Si rivedono le Vigne, ed i filari delle Viti, alzando un poco i capi piegati nel medesimo anno, per alzare un poco l'Uve dalla terra,

Si piantano le Cipolle porraie, o, come altri dicono, Cipolloni.

Si rivede, e si rivolta spesso il formaggio, ungendolo, e stagionandolo, perchè altrimenti riscalda, e si guasta, particolarmente in questo mese.

CAPITOLO IX.

De' lavori, semente, ed altre cose da farsi nel mese di Settembre.

IN questo mese si rimondano, e si cavano le fosse, facendovi i dovuti rattegni, affinchè l'acqua delle grosse piogge non porti via molta terra, cosa molto utile, e necessaria nelle possessioni poste in Colline.

Si rivedono le vigne, ed i filari delle Viti, alzandosi l'Uve che toccano la terra, e scoprendo quelle troppo adombrate da' pampani.

Si semina il Lino, i Lupini da seme, la Vena, ed altre erbe per pastura de' Bestiami.

Si rivedono, s'accomodano, e si mettono all'ordine le Tine, Tinelle, Bigoncie, ed altri arnesi per uso della Vendemmia.

R

Si

Si comincia a seminare il Grano nelle terre forti; che sono in paesi un poco soggetti al freddo, non trattandosi delle montagne alte, dov'è necessario seminarlo di Luglio, e Agosto.

Si segano, si battano, e si stagionano, i Migli, Pannichi, Saggine, Faggiuoli dall'occhio, simili, ec.

Si rimpono, o, come altri dicono, si sbroccano, s'accomodano, e si preparano quelle terre, dove erano già seminati i Migli, saggine, ed altro, per seminare a Grano, Vecciato, segalato, ec.

Si colgono, si seccano, e si stagionano i Fichi.

Si cominciano a cogliere verso la fine del mese le frutta dall'Inverno, che sono in paesi caldi, e mostrano d'esser fatte.

Si colgono le Zuccheda serbarsi all'Inverno, mettendole per qualche giorno al Sole, ed all'aria aperta.

Si visitano esattamente le stalle de' Contadini; e trovandovi Bestiami incapaci di buona riuscita (che si conoscono facilmente,) si vendano, benchè comprati nel medesimo anno, e che vi sia della perdita, ricomprandoli subito più scelti, e capaci di migliore, e più sicure speranze; non lasciandosi persuadere in contrario dalle sognate, e false ragioni de' Contadini di corta vista, già affezionati a quella sorta di Bestie; e benchè forse concludino la perdita, o il poco utile, si lusingano vanamente, e intanto si perde inutilmente il tempo, e le fatiche.

Si terminano di comprare tutti quei Bestiami Vaccini, ed altri che mancano alle stalle.

Si vendono le Pecore per stima de' Contadini vecchi o nuovi.

Si contrassegnano tutte quelle Viti, dalle quali si vogliono staccare i Magliuoli.

Si cominciano a cogliere verso la fine del mese l'Uve da serbare, che sono in paesi caldi, e mostrano d'esser fatte.

Si accomodano, e si cominciano a tendere alla fine del mese l'Uccelliere, o, come altri dicono, boschetti, o frasconaje.

Si rivedono alla fine del mese esattamente i poderi, osservando contadino per contadino quanto terreno abbiano preparato e messo all'ordine per seminarlo a Grano, Vecciato, segalato, ec. per vedere la qualità del

le-

femè, che può bisognarli, acciò le cose vadano a dovere; e questo è solamente per quei Contadini mezzajoli, alli quali il Padrone è obbligato a dare la metà del seme: cosa che non sarebbe mal fatta, anche a Contadini affittuari, massime a quelli un poco pigri, e che poco l'importa il pagare, o no.

Si colgono le Mandorle, le Noçi, e le Nocelle, mettendole a seccare, e stagionare, acciò si mantenghino buone.

Si trapianta l'insalata Indivia per l'Inverno, e si trapiantano i Cavoli neri dell'Inverno.

Si feminano le Bietole, gli Spinacci, l'insalate lattughe cappucce dall'Inverno, quando non si sia fatto nel mese d'Agosto.

Si feminano le Favè napolitane negli Orti, ed in altri luoghi, i Piselli ne'ridossi caldi per averli anticipati.

Si colgono l'Ulivo per indolcirle.

Si salano, e si seccano i funghi.

Si tosano le Pecore.

Si trapiantano le Fragole ne'Giardini, ed in altri luoghi, adacquandole subito piantate.

Si contrassegnano, ovvero si scapezzano tutte le Viti di cattiva razza, per innestarle a suo tempo; o pure sbarbarle, e tirarvi delle proppagini d'altre viti, o mettervi de' magliuoli di buona razza.

Si rivedono i Grani, ed altre robe, essendo sempre le più imperfette.

Si raccattano i semi di tutte le frutta, che si mangiano alle tavole, mettendoli separati sorta per sorta.

Si mescolano più volte i concimi.

Si castrano i Vitelli, ed altri bestiami.

Si travala la seconda volta l'Olio da'fondi, separando il chiaro e buono dal torbido e cattivo; come ho insegnato nel secondo Capitolo del trattato dell'Ulivo, e dell'Olio.

Si piantano le Cipolle, e le radiche di diversi fiori:

Si piantano le Cipolle porraje, o, come altri dicono, i Cipolloni, e le Cipolle del zafferano passata la metà del mese.

Si rivolta, s'ungè, e si stagiona il Formaggio; facendolo spesso, perchè altrimenti facilmente riscalda, e va a male.

260 LAVORI DI SETTEMBRE

Si piantano le talle, o, come altri dicono, i tralci delle Viole di tutte le sorte.

S'innestano i persichi a scudetto, al principio del mese, ovvero alla fine d'Agosto.

Si stallano, e si piantano i Carcioffi, e si piantano i mazzocchi per insalate.

CAPITOLO X.

De' lavori, semente, ed altre cose da farsi nel mese d'Ottobre.

IN questo mese si colgano le frutta dall'Inverno, purchè siano compiutamente fatte; non potendosi limitare appunto il tempo, perchè un anno si fanno più presto, e l'altro più tardi; essendovi anche la sua differenza da una qualità all'altra; neppure si fanno tutte in un tempo quelle che sono sopra un'istessa pianta, benchè d'una medesima specie; e perciò anche in questo si ricerca qualche sorta di pratica, e di cognizione, come ho insegnato nel Capitolo del Trattato delle piante de' Peri.

Si colgono l'Uve da serbare.

Si vendemmiano l'Uve per fare i Vini.

Si coglie il Zafferano verso la fine del mese.

Si falano, e si seccano i funghi.

Si semina il grano, il Vecciato, e Segaiato, il Farro, le lenticchie, la vena, la spelta, il seme dell'indivia, lattuga, ed altri erbaggi; si seminano le Fave napoletane negli Orti, ed in altri luoghi, i Piselli, le Fave vernine.

Si rivedano, e si puliscano benissimo le Cantine, mettendo all'ordine tutte le Botti, osservando esattamente quelle ch'avevano cattivi odori, o che vi fosse marcito il Vino, empiendo sempre le migliori, e più sane di quei Vini più nobili, e delicati, che devono fervire per le tavole de' Padroni, e di quelle che si vogliono serbare alla state, mettendo queste botti sempre nelle migliori Cantine.

S'imbottano i Vini, facendo i dovuti necessari afforimenti, destinando i più deboli e fiacchi, per esitarli nell'Inverno; i mediorri per la Primavera; ed i migliori, e più sani per la State, e per l'Autunno.

Si

Si piantano le Cipolle, i Cavoli neri, l'insalata Indivia, e lattuga, le piante delle Fragole, le talle delle Viole, le radici degli Sparagi, le mazze del rosmarino, e della Salvia.

Si stallano, e si piantano i Carcioffi.

Si raccolgano le Castagne.

Si cominciano a seminare le Castagne ne' Vivaì.

Si rivedono i Grani, ed altre robe, esitando le più imperfette.

Si raccattano i semi di tutte le frutta, che si mangiano alle tavole, e che marciscono.

Si cominciano a comprare i majali piccoli per allevare.

Si fanno gl'innesti di frutti di diverse sorti.

Si mescolano più volte i concimi.

Si rivedono, e si crivellano i Grani ed altre robe, che si danno per seme, osservando che siano di tutta perfezione, essendo questa una cosa di somma importanza.

Si vende il miele, e la Cera, che fanno l'Api nelle cassette, o, come altri dicono, ne' bugni.

Si piantano i mazzocchi per insalate.

Si rivede il Formaggio, tenendolo spesso rivoltato, e ben custodito, acciò non si riscaldi, e vada a male.

CAPITOLO XI.

De' lavori, semente, ed altre cose da farsi nel mese di Novembre.

IN questo mese si colgono le Sorbe, le Nespole, le Mela, e le Pera cotogne, quando non si sia fatto alla fine d'Ottobre.

Si semina il Grano, il Vecciato, il Segalato, le Lenticchie, la Spelta, la Vena per seme, la Scagliola per le Canarie, le Fave vernine, anticipandosi più che sia possibile; perchè seminandosi le suddette robe, passata che sia la metà del mese, difficilmente si possono fare copiose raccolte; si seminano le Castagne ne' vivaì, i semi delle Mela e delle Pera, i Noccioli, o siano ossi delle Persiche, delle Cerase, delle Prune, delle Meliache, o siano Ballacocchi, e Abbicocche, le Noci, le Nocelle, e il seme degli oppi.

Si fanno gl'Innesti di frutti di diverse sorte, fino alli

dieci o dodici del mese, affinchè si attacchino più vapidamente.

Si cominciano a piantare magliuoli; si piantano gli Ulivi, i Gelsi, i Persichi, i frutti di diverse sorte, purchè non siano in terre troppo forti, e atez a ritenere in se stesse della soverchia umidità; si piantano le Cipolline, l'Insalate Indivie, e lattughe, i Nocelli, gli Alberelli, o, come altri dicono, Pioppetti, gli Ontani, e le Vetrice dentro agli argini de' Fiumi per difesa de' Beni; si piantano i Ciragi, le rose di tutte le sorte, e si trapiantano le rape, i ramolacci, e ravanelli per seme.

Si fanno i vivaï di Peri, Meli, Susini selvatici, Pruni bianchi, e simili, ec.

Si fanno i vini, e si travasano quelli che si vogliono dolci.

Si stringono le vinacce per cavarne l'aceto.

Si puliscono, e s'asciugano benissimo tutte le Tine, cavando le Vinacce, mescolandole subito con il concime che deve servire per uso delle piante de' Cocomeri.

Si comincia a potare le Viti, facendosi sempre dalle più deboli; e si cominciano a potare le piante de' frutti di tutte le sorte, principiando in quelle pure sempre dalle più deboli.

Si cominciano a seccare, e stagionare le Castagne; dando loro il fuoco adagio, e più temperato, che sia possibile.

Si raccolgono le Ghiande.

Si coprono i Boschetti degli Agrumi, e si mettono i vasi negli stanzioni.

Si rivedono le Cantine, e si riempiono le Botti per il meno ogni due giorni una volta.

Si comanda ai Contadini, che passato questo mese, non semino più Grano, nè Vecciato, nè Segalato.

Si rivedono tutte le terre seminate, possessione per possessione, osservando se corrispondono alla quantità de' semi dati a' Contadini, e se questi abbiano fatte le dovute, e necessarie fossate per li scoli dell'acque.

Si mescolano più volte i concimi.

Si scalzano, si governano, e si ricalzano tutti gli Ulivi, Magliuoli, Gelsi, Frutti, ed altre piante, piantate nel medesimo anno, tagliando loro tutte le barbe, che si trovano troppo alte fra le due terre.

Si

Si piantano le piante del rosmarino, e le rami della salvia; ma è da sapersi ch'è meglio farlo nel mese di febbrajo. quando non si piantano in terra molto leggiera, e ben sanata dall'acque.

Si fanno le fosse per gli Ulivi, Gelsi, Magliuoli, ed altre piante.

Si piantano i Canali, ed alla positura del suolo, rimediando a tempo a quei danni che potrebbero far l'acque, portando via la terra.

Si fanno le propaggini, o, come altri dicono, sottomesse di viti di buona razza.

Si rivedono minutamente le Coltivazioni fatte nel medesimo anno, mutando tutte quelle piante che non si sono attaccate, ed altre che non danno certa sicura speranza di far buona riuscita.

Si comprano i majali piccoli per allevare.

Si tagliano le Canne de' Canneti fatti nel medesimo anno; indi si governano, e si cavano le fosse, coprendo colla terra i quadrati, in maniera che piovinò da per tutto nelle fosse.

Si piantano le piante de' Lamponi, o siano Flambuesse, le piante del Ribes; si piantano ne' vivai Meli, e Peri selvatici, ed altri frutti.

Si comanda ai Contadini che rivedino minutamente tutt'i Comuni dell'e loro possessioni, e che tenghino obbligate l'acque ne' loro soliti vecchj letti, e trovando mutazioni, o altre cose di nuovo, ne diano subito avviso.

Si cominciano a potare i Castagni, subito cadute le Castagne.

Si cominciano a cogliere gli Aranci dolci da serbare verso la fine del mese, purchè siano compiutamente fatti.

Si coglie il Zafferano.

Si rivede il Formaggio, tenendolo spesso rivoltato, e stagionato.

Si cavano i cestini dalle Colombaje, e si scuotono, e si puliscono benissimo dallo sterco de' Colombi.

CAPITOLO XII.

De' lavori, semente, potature, ed altre cose da farsi nel mese di Dicembre.

IN questo mese si cominciano a seminare le Fave marzuole, si semina l'Orzo, le Vecce, e i Ceci rossi.

Si piantano gli Agli, i Magliuoli, gli Ulivi, i Gelfi, i Mandorli, i Persichi, i Noci, i Nocelli, le rose di tutte le sorte, gli Alberelli, o, come altri dicono, Piopetti, gli Ontani, le Vetrice, le Saliche, e le mazzette de' Salci. Si piantano i Peri, Meli, Ceragi, Sufini, Melagrani, ed altri frutti.

Si fanno i vivaj di Peri, Meli, Sufini, Ceragi selvatici, e simili.

Si piantano gli Oppj nelle Coltivazioni.

Si cominciano a tagliare i legnami per legate, e farne travi.

Si mescolano più volte i concimi.

Si raccattano, e si stagionano l'Ulive.

Si sentono, e si travatano i Vini, evitando sempre i più fatti, e viziosi.

Si fanno le propaggini, o, come altri dicono sottomesse di buona razza.

Si fanno, e si rivedono le fosse che servono per gli scoli dell'acque, acciò portino via a due terzi, o a più possibile.

Si rivedono minutamente le possessioni, e passando delle terre già seminate, dove per l'ordinario si per tutto ugualmente le robe, e che si cominciano a tirar di fila, si facciano riseminare di Fave, di Ceci, e Vecce; nè si stia alle relazioni de' Contadini, che si lusingano al solito vanamente.

Si fanno le fosse per gli Ulivi, Gelfi, Viti, ed altre piante.

Si ammazzano i Majali, salando i presciutti, e la carne.

Si riconoscono i Grani, ed altre robe, evitando le più imperfette.

Si scalzano, si governano, e si ricalzano subito gli Ulivi, le Viti, Gelfi, ed altre piante di frutti, piantate nel medesimo anno, tagliando loro tutte le barbe, che si trovano troppo alte fra le due terre.

Si potano gli Ulivi, Peri, Meli, ed altre piante di frutti, Viti, e Castagni, cominciando subito cadute le Castagne.

Si piantano i Castagni nelle Selve, riparando a quei danni, che potrebbero far l'acque, portando via il terreno.

Si cominciano a tagliar le legna per uso del fuoco.

Si rivedono l'Uve, e le frutta, esitando quelle più fatte.

Si stringe la vinaccia per cavarne l'aceto, quando non sia riscaldata, e inforzata tanto da poterlo fare nel mese passato.

Si cominciano a far picchiare le Castagne secche, ritirando subito da' Contadini la parte dovuta al Padrone, interrogandoli minutamente, se ne abbiano consumate per loro vivere, ovvero se ne abbiano date via, o vendute, o mangiate in quantità delle fresche, e ne diano conto.

Si cominciano a far macinare le Castagne secche, subito ritirate dai Contadini, acciò non piglino l'umido, cosa che suol facilmente accadere, particolarmente quando non si hanno luoghi bene a proposito per conservarle.

Si colgono gli Aranci dolci da serbare, purchè siano compiutamente fatti.

Si riempiono più volte le Botti.

Si rivede il Formaggio, rivoltandolo, e stagionandolo spesso.

TRATTATO

SOPRA IL GOVERNO DE' CAVALLERI.

CAPITOLO PRIMO.

Del tempo, e modo di mettere i Cavalieri.

Corre detto comune tra' Villici, che il buon esito de' Cavalieri è gioco di fortuna, e non esser ancora nato colui, ch'abbia imparato la maniera d'allevarli; ma ciò credo un'inganno, anzi un mezzo termine per sfuggire i rimproveri, che si volessero fare a chi vanno male; mentre osservo per esperienza non esser cosa sì facile, che male riescano ai diligenti osservatori delle buone regole, tanto quanto ai negligenzi. Io son benissimo persuaso, coll'opinione di molti, che se venissero da' Contadini osservate le debite regole nel farli nascere, nell'allevarli, nel mantenerli, nel porli al lavoro, e ordinare i boschi, nello scoprirli e far la semenza; maggior quantità vi farebbe di feta, di quel ch'ora si faccia; delle quali cose ad una ad una anderò parlando.

Premessa dunque la benedizione della semenza, ed imploratone da Sua Divina Maestà l'effetto per tale importante entrata; quanto al metterli dirò: Non è forse vero che se nascono male, ordinariamente parlando, riescono anche male nel decorso della lor vita? non abbiano pertanto troppa sfetta le Donne nel farli nascere; ma vadino a tempo, e con caldo naturale senza servirsi di fuoco, o delle Stufte; procurando che venuta la stagione opportuna, che suol esser nel Mele d'Aprile, nascano almeno prima dell'ultimo quarto della Luna, col fine che vadino al lavoro entro la Luna vecchia susseguente. Si vada dunque disponendo la semenza al nascere per una settimana e più, ponendola in pannolino; avvertendo di porne poca quantità per fazzoletto e distesa, quando si mette a covare, acciò nascano sani, vigorosi ed uguali. Consiglierei ancora a far soccede piccole; oppure se grandi, mettere la semenza in due tempi, qualora la stagione non dia fretta,

ta, come nell'anno corrente; cioè colla distanza di almeno tre giorni da una muta all'altra, per dar facilità a' Villici di usarne il dovuto governo nel fine, mentre promettono molto, ma attendono poco, massimamente in questo particolare. Le stanze per li Cavalieri siano asciutte, perchè poi non divengano Calcimeroli. Quelle che sono situate verso Levante e Ponente sone le migliori.

CAPITOLO II.

Del modo di allevarli.

QUanto all'allevarli ognuno sa, che sul principio devesi servire delle fesse più tenere e più piccole. Nati che sono i Cavalieri, si levano dalla semenza, stando in luogo caldo, al fuoco, e meglio al Sole, purchè si tengano coperti in una miera, che sentano il calore, ma raggittolare non li tocchi ponendo sopra la semenza già nata primeramente o una Carta forata a foggia di Crivello, eppure certa erba ben nota, detta volgarmente Danea, e poi sopra quella o quella le foglie piccole e tenere di Moraro; acciò formontando all'odore delle medelime i soli Cavalieri nati, restino sotto la Carta o Erba suddetta i semi da nascere. Allorchè sono formontati si levano e si pongano sopra fogli di carta grossa, stropicciati o sia fregati prima con erbe odorifere, e si portano vicini al fuoco in luogo caldo già preparato, e difeso dall'aria. E perchè per lo più nascono in due o tre giorni; così si deve usar diligenza nel tener separati quei del primo giorno da quei del secondo, e susseguentemente tanto sopra le carte, quanto sopra i tavolini, quando coll'andar del tempo non si raggiungeranno, come spesso volte succede. Talvolta avviene che da piccoli per la lor debolezza restano sotto la foglia, e si perdono; in tal caso è necessario trasportar di frequente in altri fogli quelli che son venuti al di sopra, ajutando con nuova foglia gli altri ad ascendere.

Si mutano i Cavalieri immediatamente avanti e dopo le dormite, levandoli destamente, e non ripiegandoli a rotolo per non nuocerli, e ponendo i letti a parte per raccogliere con foglia sparsavi sopra quelli che vi restano dentro. Quando sono delle quattro, si mutano,

tano ogn' altro giorno; e più spesso, s'è tempo caldo, nettando sempre i tavoloni con erbe odorose. Si avverte che nel mutarli la prima volta dopo le dormite, si trasportino in altro sito quei che non sono levati, gettando via i guasti acciò non infettino i sani. Per tali riguardi sarebbe più utile e sicura regola il servirsi delle reti, come usano i Trentini, i quali ogni volta che mutano i Cavalleri principiando dalla dormita delle tre, o almeno delle quattro, stendono sopra i tavoloni una rete fatta a tal uso, dandovi sopra il suo passo di foglia; e frattanto che i Cavalleri formontano, attaccano la rete suddetta d'intorno al tavolone di sopra, alzando il quale resta in aria la rete co' Cavalleri: quindi hanno pronto il comodo di trasferire quelli che ancora dormono, e di nettare i tavoloni. Ciò fatto, calano la rete, e restano ivi i Cavalleri netti, eguali, e senza pericolo che siano offesi. E siccome in tal modo rimangono obbligate le reti sotto a' Cavalleri, ne riservano una sempre in libertà per servirle successivamente all'istessa maniera.

Riguardo al fuoco, alcuni sono d'opinione che male sia usarlo; l'esperienza però ne insegna tutto il contrario, mentre a vero dire dal fuoco usato in buona forma dipende in miglior parte l'esito de' Cavalleri, accelerandone questo la vita, e rendendone più breve e meno pericolosa l'infermità delle dormite; e perciò più vegeti riuscendo, maggior quantità, e qualità migliori di gallette producono. La regola dunque del fuoco sia questa. Si procuri di far ascendere col fuoco l'aere delle Camere dove si nutriscono i Cavalleri nel principio della lor vita a quel grado di caldo, a cui nel fine ascenderà col beneficio della stagione, moderando nel progresso conforme avanzerà il caldo naturale. Si offervi però che la mattina, la sera, e la notte fa più fresco ordinariamente che nel decorso del giorno; così ancora succedono alcuni giorni più freddi a cagion di pioggia o di vento; onde in simili casi ove manca natura, arte supplisca. Piaceci perciò l'uso del termometro da alcuni introdotto con sommo vantaggio, il quale appuntato al grado temperato più o meno, giusta la cognizione di chi governa i Cavalleri, al medesimo grado col fuoco si mantiene sino al fine, accrescendo, diminuendo, oppure levando affatto il fuoco secondo il biso-

bisogno. E' necessario anche introdurre di quando in quando ne' luoghi de' Cavalieri qualche tratto d' aria temperata alloracchè il tempo è placido affin di purgarli da qualunque mal odore e conservarli sani.

Prima che i Cavalieri dormano delle quattro, gl' ineguali di età si separino anco di camera, rari essendo quegli anni, nei quali fogliati delle quattro non abbiano bisogno di aere più che di caldo; sicchè non potendoli fogliar tutti nel medesimo tempo per la differenza dell' età, si rende necessaria tal separazione per mantenerli tutti nella loro aria competente, cioè i fogliati nella temperata, e quelli da fogliare nel caldo pur temperato. Si guardino in tal tempo dal caldo, massimamente nella notte, che più facilmente per il fresco esteriore si ferra nelle case, come succede anche ne' giorni nuvolosi. Giova ancora temperare l'umidità della mattina e della sera col fumo de' letti abbruciati al di fuori delle case. S' avverte per ultimo di riguardarli sempre con gelosia dalli strepiti e cattivi odori, come pure dal lasciarvi sopra cadere oglio per non farli tramortire, usando di tratto in tratto un qualche profumo di legni odoriferi o di carni arrostate per mantenerli vegeti e sani.

CAPITOLO III.

Del mantenerli, o sia pascerli.

Siccome dalla buona o cattiva qualità de' cibi dipende la buona o cattiva sanità de' Corpi, così deve esser molta diligenza a mantenere i Cavalieri con foglia proporzionata al lor naturale. E perchè tra' Morari alcuni sono di pola, cioè di prima battuta, altri di bronza, cioè di più battute, alcuni casativi o di terreno morbido, ed altri di terren magro, essendo necessario servirsi di tutti, si usi questa cautela. Dal principio finchè sono avanzati delle quattro, si cibino di quei Morari si vogliono, cominciando però dalli più giovani, eccettuato il primo pasto dopo ciascuna dormita, quale dev' esser di foglia di bronza. In fine poi, cioè nell' ultimi tre o quattro giorni si cibino sempre di quelli di bronza e magri, perchè la foglia di pola o morbida

bida per la sua interna umidità lor nuoce, e vanno poscia a male sopra i boschi. Nel principio li si diano tre pasti scarsi al giorno; nel progresso pure tre pasti mediocri; secondo si osserverà che ta mangino; e nelli ultimi tre o quattro giorni anche quattro pasti abbondanti, perchè quando abbiano ben mangiato in quest' ultimo tempo, fanno migliori gallette. Nel principio e fine delle dormite li si diano solamente quattro foglie sparse una volta o due al giorno, acciocchè li primi a levare e gli ultimi a dormire abbiano con che nutrirsi. In caso di continue pioggie massime quando sono delle quattro, si tenga pelata la foglia un giorno per l'altro a fine di poterla asciugare; ed abbiano da mangiare. Non essendo a tempo di poterla pelare un giorno per l'altro, è meglio in tal caso che perdano un qualche pasto interrotto per farla in tanto asciugare, mentre la foglia bagnata li rende infermi. S'osservi finalmente di separare dalla foglia per quanto mai si può le More troppo mature come nocive per la lor corruzione.

CAPITOLO IV.

Del porli al lavoro, ed ordinare li boschi.

A Guisa di nave, che dopo felice corso sul Mare patisce naufragio in porto, così avviene alcune volte a' Cavalieri, che dopo essersi mantenuti belli e sani fino alla metà di tanti disagi; periscono poi sopra i boschi con doppio rammarico di chi li mantenne ed allevò. S'abbia dunque questa attenzione: Come non dormono, nè levano mai tutti d'accordo, così non si pongono al lavoro tutti ad un tempo; ma in due o tre volte, secondo appariscono maturi; perchè se sono garbi, non fanno buona galletta: Se troppo maturi, non hanno lena di lavorare. Nel levarli da' tavoloni non vi si frammischino i guasti, nè si empiscano troppo le mani ed i vasi per non pregiudicar alla loro delicatezza: I vasi siano larghi e piani, vorandoli subito e con destrezza sopra le fascine già preparate, affinchè non restino in alcuna parte offesi. Tutte le fascine sono buone; ma osservo, che i Cavalieri lavorano meglio sopra quelle di Moraro; forse perchè più confacenti al lor naturale; o perchè di sua natura non affettandosi tanto come l'

al-

altre, lasciano nel loro vacuo maggior traspiro dell'aria. S'aspetti qualche tempo a drizzarle e componerle in boschi fin tanto che siano ben distesi e attaccati i Cavalieri. Ciascun bosco dev'essere di mediocre lunghezza, composto di sole tre o quattro fascine al pari, con di sotto un piano di legnetti ad ogn'un pronti dalle cimature delle fascine medesime. Questi boschi si formano, come ogn'uno sa, sopra solari, fenili, e granari, o in luoghi asciutti, dove si possa dar elevar l'aria, ed anche portar fuoco se occorre. Si coprano quand'è freddo, di lenzuoli più netti e leggieri; e quand'è caldo, vi si pongano sopra solamente de' legnetti, o pazzadore di campo, o ambrogani, o gramigna ben secca e purgata. In caso di tempo umido o freddo è bene per i primi due o tre giorni profumar i boschi con fumo odoritero, perchè questo li sveglia e li fa ferrare.

CAPITOLO V.

Del scoprire i boschi, e far la semenza.

A Capo di quattro giorni dopo messi al lavoro li Cavalieri, purchè sianfi ferrati, devonsi scoprire, e disfar con maniera i boschi, acciò non si scaldino, e vadino poi malamente le gallette. Indi poi ad altri quattro giorni si raccolgano le gallette, non frammischiando le guaste con le buone; e si usi attenzione di riporle in luoghi freschi, e di tenerle separate secondo il tempo de' Cavalieri che sono stati messi al lavoro per regola di cavar la seta fresca o folata. E poichè convien pensare di far la semenza per l'anno susseguente, si scelgano fra le migliori celle prime fatte tante libbre, quante oncie di semenza si desiderano. Si faccia osservazione che quelle, le quali hanno la punta più acuta sono maschi, e quelle che l'hanno ottusa, cioè meno acuta sono femmine: poscia infilate, si pongano a nascere in luogo fresco ed asciutto, riparato dall'aria. Nate che sono le povere, si lasciano accoppiare sopra le filze medesime, poi a tempo opportuno in una ed anche due volte al giorno si levano le femmine, e si pongano sopra un telo lino netto a far la semenza in luogo lucido e temperato, gettando via li maschi, qualora di nuovo non abbisognassero. Io reputo meglio la-
sciar

sciar la semenza sul telo fin tanto ch'è passato il caldo, perchè così corte minor pericolo di nascere. Mitigata che sia la stagione, si levi la semenza destramente dalla tela con un coltello, bagnandola prima in vino puro, acciò nascano a suo tempo più vigorosi; si faccia poi ben asciugare in sito riparato dalle formiche, da' ragni, e d' altri animali che la danneggiano. Ben asciugata che sarà nel detto modo la semenza, si custodisca in qualche vaso vetriato oppure in fazzoletti, o sacchetti di tela netta, in stanza ben difesa dal freddo, perchè non patisca. In fine istimo ottima cosa il ricordare ciò ch'è debito d' ogni Cristiano, l' offerir una qualche porzione di gallette al sacro altare in segno di gratitudine, o in rendimento di grazie a Dio dator d' ogni bene.



TRATTATO

/ SOPRA LA COLTIVAZIONE DE' MORARI.

CAPITOLO PRIMO.

Del modo di piantar i Morari.

Siccome da un sodo o debole fondamento dipende la sicurezza o la rovina d'un edificio, così dalla buona o cattiva forma del piantar un albero dipenderà la di lui buona o cattiva riuscita; particolarmente parlando dei Morari da piantarsi nei tetrini magri e sassosi, dove colla cultura difficilmente ancora riescono, e senza di essa si perdono facilmente.

Stimo superfluo il dire, che le buche da piantarvi i Morari, dovrebbero prepararsi un Inverno, o un Estate avanti, della profondità di circa due piedi, e della larghezza di sei. Non credo però superfluo, ma anzi reputo necessario il ricordare che le bine de' Morari in tali luoghi si piantino sempre a fossa, la quale perchè non sia di troppo dispendio, si formerà in questa maniera: Si ari prima il terreno almeno per la larghezza di piedi sei; poi si scavi detta aratura, indi si replichi lo stesso, e poscia si ari un'altra volta bene, scavando in questa terza aratura solamente le buche distanti l'una dall'altre pertiche. Piantati li Morari nella forma che si dirà, si ripone nella fossa la terra scavata, risparmiandosi in tal modo la terza parte della spesa, e riuscendo l'Impianto, come se fosse tutta scavata. Se permesso mi fosse oltrapassare i limiti del mio assunto, suggerirei bene il non omettere di scavare la fossa interamente in quelle situazioni soggette all'umidità, nelle quali sogliono seccarsi li Morari specialmente in certe annate piovose, come appunto succedette pochi anni fa nelle contrade di Sandra, Colà, Castelnovo e simili dilatando la medesima fossa, e profundandola un terzo di più dell'ordinario, per formarvi nel fondo alla rinfusa un piano di sassi, che servono a preservarli dall'umido, e renderli men sottoposti a tale pericolo.

I Morari si possono piantare in due stagioni, cioè in quarantia di San Martino, oppure in Quaresima, in tempo però che la terra sia alciutta. Questi siano di calma, perchè in tali terreni troppo soggetti all'aridità i selvatici se s'incalmano quando sono piantati, di rado riescono. Siano parimente di buona sorta, e di mediocre altezza, piantandoli fondi poco meno di due piedi, con riguardo, che quei che fossero curvi, restino rivolti inverlo a mezzo dì, affin che si raddrizzino. Nel piantarli si empiscano le buche di terra senza ghiara o sassi, supplendo con altra terra di rive, o cavedagne, frapponendovi ancora delle glebe di codego in mancanza di letame. Subito piantati, si cuoprino i tagli di sterco bovino, mantenendoli così coperti finchè germogliano, onde non penetri l'acqua, o il rigore del freddo. Si vestano poi di canne per riparargli dagli ardori del Sole, ed in alcuni siti s'armino ancora di spine contro gl'insulti degli animali, mantenendoli in sì fatta guisa almeno cinque anni.

CAPITOLO II.

Dell' allevare e potare i Morari.

NON creda chiunque brama d' allevare Morari, d' aver fatto quanto basta piantandoli nella suddetta forma, perchè sebbene questo sia il fondamento, farà sempre il meno rispetto a tutta la fabbrica. Ciò che più importa, si è l' allevarli anche in modo debito, acciò d' anno in anno si avanzino sempre più, e si conservino.

Non rincresca dunque al Padrone di visitare alle volte queste piante, principalmente quando son picciole, e subito che han germogliato, farle ischiarire ne' butti o siano germogli, acciocchè divengano più fatti quei che vi restano. Quando poi i detti butti abbiano fatto il legno, che suol essere in Maggio, si riducano a soli tre per pianta, e a due nelle piante più deboli; non mai a quattro, perchè col tempo non potendo scorrer le piogge per la troppa unione de' rami corrodono il tronco, e s'insinuano nelle piante medesime. Ridotti che siano i Morari in tal guisa, nel terzo anno, ed anche nel secondo se hanno forza, si facciano testare in Quaresima a tempo opportuno i suddetti due o tre butti, che
for.

formano i primi rami su tronco, alti un palmo poco meno secondo la qualità della pianta e del terreno, ma sempre appresso l'occhio. Colla medesima regola del primo anno s'allevano anco sopra cadauno di questi primi rami soli altri due o tre germogli, i quali doveranno formare i secondi rami. Similmente a capo di due altri anni si tessano li detti secondi rami prima che buttino, e s'allevano pure nello stesso modo non più di tre buttiti per cadauno de' medesimi rami. In tutto questo tempo non è utile valersi della foglia perchè restino più vigorosi.

Passati li suddetti quattro o cinque anni, deve il Padrone allevarli piuttosto bassi, acciò col tempo ombreggino il pedone ogni due anni fin che s'accorge che cessano di crescere con egual vigore, facendoli lasciare due o tre soli occhi per ramo, col taglio tondo e vicino all'occhio, e levar i rami superflui. Non resti di farlo schiarire anco dopo cadauna potatura della superfluità dei germogli sino al decimo anno. Venuto poi il tempo in cui crescono con minor vigore, deve farli potare solamente ogni tre anni nella stessa maniera. Fatti alquanto vecchi, comechè hanno ancor meno di vigore, sarà meglio potarli solo ogni quattro anni, lasciandovi un occhio o due per ramo, ed alcuni anche a groppo, cioè al segno della potatura antecedente. Quelli finalmente che decadono, si tessino avanti che germoglino, alli primi, secondi, e terzi groppi sopra il tronco, secondo il lor vigore, coprendo i tagli di sterco bovino, o si allevino nel modo detto di sopra come se fossero giovani.

E qui non posso mancare di raccomandar ai Padroni con tutta premura che facciano scelta d'Uomini pratici ed onesti, procurando che siano sempre i medesimi a far le potature. Nè anche posso lodare quell'uso pessimo in alcuni luoghi introdotto d'interessare gli Operaj nella legna. Si piglino dunque a giornata, o al più ad un tanto al piede, con l'obbligo di far le fascine di giorno in giorno, dal che ne ridonda un sommo vantaggio. Voglio per ultimo ricordare ciò, che a tutti è già noto, ma importa assai, di non differire a potarli più d'una settimana all'altra dopo pelati, e mai passata la metà di Giugno, essendo allora troppo avanzata la stagione.

CAPITOLO III.

Del coltivare la terra intorno a' Morari.

Suggerito il modo di allevare i Morari, rimane ora a veder la maniera di coltivare la terra, dove sono piantati. Insistano adunque i Padroni a farla coltivare a' debiti tempi, poichè da ciò dipende in gran parte la buona riuscita di tali piante, locchè da' Villici d'ordinario trascurasi facilmente.

Tre volte all'anno devon' essere ben arati, e zappati nel seguente modo: La prima volta si distolgono con due solchi per parte, e si zappano a San Martino, e poi si colano cioè se gli dà la terra avanti che s'agghiacci, con detti due solchi. La seconda volta similmente si distolgono, e zappano a Pasqua, col solcare anche la vanezza che sia almeno di tre solchi lungo alle cavedagne, e in fine di Maggio si colano, formando in oltre la detta vanezza. La terza volta parimente si distolgono, e si zappano nel principio di Luglio, solcando di nuovo la suddetta vanezza, e nel fine di detto mese o nel principio d'Agosto si colano, riformando la vanezza predetta. Quelli poi che sono piantati ne' prati, o ne' pascoli, si coltivano con una vanezza per parte oltre i due solchi. E siccome questi intali siti sogliono patire il caldo più degli altri, qualor s'accorga che per quest'effetto decadono, suggerirei a scavarvi un fosso per parte del codegolaterale alla detta vanezza, otturandolo di mano in mano che si scava, affinchè si rimettino. A quelli finalmente situati nel mezzo delli campi arativi, osservata la regola di sopra, basteranno i soli due solchi d'ambe le parti, guardandoli tutti dall'offenderli coll'aratro.

CAPITOLO IV.

Del modo d'ingrassare i Morari.

PER ingrassare i Morari è buono ogni letame, massime se sia consumato. Ma come questi son luoghi, dov'è scarshezza di grassa, e i Villici di mal animo soffrono d'essere tassati in questo particolare; e dall'altra par-

parte essendo pur troppo necessario l'impinguarli; perciò senza disgustar i primi, si potrà beneficar i secondi, medicandoli se non altro, come suol dirsi, del loro medesimo pelo. Di grazia lor non si faccia questo sorto, si riferbino i letti dei Cavalieri, e se ve n'è anche la Gallinella o sia sterco di Galline, e con questi s'ingrassino almeno i più giovani, e bisognosi, specialmente qualora sono di potatura; tra quali crederei li situati lateralmente alle siepi, come più soggetti a patire; oppure si benefichino di menadizze, o di codeghi. Non lodo il calzarli di terra, come fanno alcuni; perchè restando in quella parte ammolita la scorza, o radicando in alto; si rendono più esposti all'intemperie delle stagioni.

CAPITOLO V.

Del trapiantarli.

TRA i molti privilegi che gode l'Agricoltura sopra tutte l'altre professioni, non è di sì poco rilievo questo; che mutando talora l'ingegnoso agricoltore l'idea, e risolvendo riordinare Arbori già piantati, lo fa, direi quasi, con quella facilità, con cui un ottimo Capitano mette in isquadra, e riordina il suo Esercito. Cosa invidiabile a chi dopo aver fabbricato un palazzo, non può rimediare agli errori, e soddisfare alle nuove idee senza prima distruggerlo.

Volendo adunque trapiantare i Morari, e perchè siano in luogo ove rendano incomodo, o per renderli più ordinati, purchè la grossezza del pedone non sia troppo eccedente, si trapiantino in Marzo con più radici che sia possibile. Questi tosto cavati si testano a' primi gruppi sopra il tronco, e si piantano di subito con tutta diligenza alquanto più fondi, e ne medesimi venti, ne quali ritrovansi posti prima di cavarli, come l'esperienza chiaramente ce lo dimostra. Si allevano poi, e si coltivano colle medesime regole dette di sopra.

T R A T T A T O

INTORNO ALLA COLTIVAZIONE
DELLE VITI.

CAPITOLO PRIMO.

Dell'Impianto delle Viti, e loro Joffegni.

CHE io voglia dar regole per piantare, e coltiva-
re le Viti, sembrerà forse inutile cosa e super-
flua, quando essendovene tanta copia per sùo nel-
le Città, si può credere che ogni benchè sem-
plice ed inesperta persona ne abbia una sufficiente cogni-
zione. Osservo però talvolta succedere, che meno di
attenzione si usa nelle quotidiane azioni, che nell' esstraor-
dinarie; onde ne avviene che ancora si manca di certe
circostanze, per trascuraggine delle quali di minor pro-
fitto riesce ogni operazione. Chiunque perciò desidera fe-
condare d'Uve le proprie Campagne, non isdegni ri-
flettere alle seguenti osservazioni.

Prima d'ogni altra cosa si scegliono i taglioli di buo-
na sorte, o nell' istesso luogo, o ne' vicini; perchè mol-
te volte accade che mutando qualità di terreno, muta-
no anche l'Uve la lor natura. Nelle Campagne magre,
per le quali s' intende dar qualche regola, si prendano
quelli di Vite Cremonese, Corvina, e Rossetta; e ne'
siti meno magri ancora di Cagnetta, Tirodola, e Ver-
nazza, come più fertili ed ubertose in questi terreni.

S' avverta che quella Corvina tirata in alto senza mai
potarla, produce l' Uva per vino labrusco. Siano i ta-
glioli piuttosto corti e grossi, quali subito tagliati si pone
in acqua la parte che va sotterrata, e vi si lascia per al-
cuni giorni; poi se ne piantano in quarantia di S. Marti-
no quattro per parte al pontezo, fondi almeno un piede di-
stesi due a due ordinatamente, e distanti quasi un piede dal-
li pontezi, per così rimettere gli uni e gli altri facilmente.

Parlando de' pontezi, pare che l'Oppio sia alle Viti
molto opportuno, tuttavia vedo dall' esperienza che nel
terren magro non cresce a sufficienza per mantenerle.
Così non lodo i Marascari, Brognari, Olmi Rizzi e si-
mili,

mili, che crescono bensì con prestezza; ma colla moltitudine de' germogli infettano i campi; nè meno la Nogara come nociva alle Viti. Sarà però meglio piantarvi Girezari, Olmi Bianchi, e Frassini; e ne' siti migliori anche l'Oppio. Mi sembra cosa assai utile il piantarvi, ad ogni due poste pure delli Moraretti selvatici, facili ad allevarsi negli Orti con la semenza di Moraro all'uso Mantovano per ricavarne oltre i pali anche la foglia, allevandoli però a modo di Pontezi, e non di Morari. Siano tutti questi Pontezi di mediocre grandezza, e di quelli non puramente seminati, ma trapiantati, ponendoli fondi un piede e mezzo; all'istessa sodezza scavando tutto il fosso. Questi ancora si benefichino con terra di cavedagne più che sia possibile prima d'otturar il fosso intieramente.

CAPITOLO II.

Dell'allevare le Viti, e i Pontezi.

LE Viti sogliono tessare tre o quattro anni dopo piantati i taglioli secondo la qualità del terreno ai primi due occhi sopra terra in Quaresima ed in Luna nuova. Nel primo anno s'allevano da detti occhi due rami per vite, liberi dalla superfluità de' germogli; la qual superfluità si dovrà levare dal tronco delle Viti in ogni tempo. Nel secondo anno pure in Quaresima si riducano i detti rami ad un solo per vite il più forte col tessare anche questo, lasciandovi due soli occhi. Nel terzo anno poi si potano parimente in Quaresima; con lasciarvi un solo ramo per Vite fatto a tirella il più vigoroso con due occhi fra la legatura del medesimo ramo e la tessatura della Vite; e così susseguentemente, affinchè producano i rami per l'anno seguente da formar le solite tirelle ad un solo ramo per Vite il principale, recidendo i rametti: alzandole d'anno in anno fin che sono arrivate alla tessatura delli rami dell'arbore. In questi anni si tengono sostenute alle frasche e pali per non aggravare il pontezo non per anco bastante a sostenerle. Ridotte che siano alla suddetta tessatura dell'arbore per quanto mai sia possibile si mantenghino a tal segno, ponendole sempre in Luna vecchia nell'istesso modo. Siccome col progresso del tempo tal una trascorre l'antedetta tessatura, così in tal caso s'abbia attenzione di lasciarvi sotto la legatura un germoglio detto da' Villici iperone con due occhi, e non essendovi di tessar la Vite a

gruppo che pare opportuno; acciò produca i consueti due rami, e non oltrepassi il legno predetto. Qualor occorra in qualunque età rimetterle, si tratteranno nella seguente maniera: Si fradica la metà d'una delle viti dalla parte più numerosa, e si sotterra ben fonda passando a quella mancante con i due rami, che si troverà avere, disposti e recisi a guisa dei taglioli, da' quali si produrranno in breve tempo due viti. In caso poi che detti rami non fossero sufficienti ed opportuni, è necessario testarli ambedue, ed allevarvi tanti rami da trattorare l'anno successivo, quante Viti si desiderano rimettere.

Tutti gli arbori che servono di sotto alle Viti si testano dal pedone presso l'occhio in Quaresima tre o quattro anni dopo piantati, alti due piedi circa. Nel primo anno sul fine d'Aprile s'allevano da questi quattro ordinati rami di moderata larghezza, acciò siano dominate dal Sole le Viti, e divenuti gagliardi possino sostener le tirelle, mantenendoli netti dai butti superflui. Passati altri tre anni, si testano parimente in Quaresima li detti quattro rami appresso all'occhio alti pure due piedi circa dal tronco. Per cadauno di detti rami s'allevino due o tre pali, tagliandone dalla stessa testatura una 3. parte all'anno, acciò restino annualmente provvedute le Viti. In detto corso d'anni non si debbono pelare, testando i pali successivamente sempre nel medesimo sito.

CAPITOLO III.

Del coltivare la terra intorno alle Viti.

ANcora le viti si arano tre volte all'anno, distogliendole, zappandole, e colandole ogni volta con due solchi per parte, cioè a S. Martino, in Primavera, e in Luglio, fin che sono ridotte allo stato di compiuta tirella. Dopo questo tempo si coltivano nel seguente modo: Si distolgano in quaresima pure con due solchi per parte, e si zappano, si colano poi con un solco per parte, allorchè principiano a germogliare, e con l'altro solco solamente in Maggio, acciò vengano meno infestate dall'erba. Di nuovo si devono distorre almeno avanti S. Giacomo di Luglio con un solco per parte, ed in Novembre colare col detto solco. I Villici vi stiano distanti colli seminati tre piedi per parte per poterle coltivare nel detto modo. Così pure non vi lascino dopo la vindemmia andare gli animali attraverso, dal che ne viene la rovina delle Viti medesime.

TRAT.

TRATTATO

SOPRA LA COLTIVAZIONE DELLE SIEPI.

CAPITOLO PRIMO.

Impianto delle Siepi.

E' Così scarso a' giorni nostri il Territorio Veronese di legne, almeno in queste contrade, che con istupore ho udito negli anni scorsi essere state pagate nel tempo dei Cavalieri le fascine di rovere anche ordinarie fino lire trenta per carro. E questo non d'altro procede a mio credere, che dai svegri fatti in ogni parte, per i quali sono stati esterminati i boschi, e cespugli. Osservo ancora che nelle magre Campagne v'è tanta penuria di frasche e di pali, onde sostentare le Viti, che i Padroni sono in necessità di spendere non poco danaro per farne provvigione. Benedetto dunque sia sempre ch' inventò la maniera di renderle fertili di legne e di pali, coll' introdurre le Siepi senza perdere l' entrate dei svegri. Volesse Iddio, che ogni Padrone s' innamorasse d' una tal coltivazione, che la nostra Patria costretta tanto non farebbe a ricorrere a' boschi forestieri con non poca perdita di soldo. Nè creda quì alcuno, che si richiedano molti anni a formarle, mentre in brevissimo tempo, come dall' esperienza si vede, si allevano, e tagliano.

Molte sono le piante atte a formar dette Siepi: Ma sopra tutte il Bolcefrino ne' luoghi magri e sassosi riesce a maraviglia: legno che da sostegno e da fuoco non la cede a qualunque altro più forte. Questi siano di quei trapiantati; e in quarantia di S. Martino, o in Marzo si piantino fondi un piede e mezzo, ed altrettanto distanti l' uno dall' altro, a fosso largo almeno due piedi, beneficandoli massime nel magro con terra di cavedagne prima di sotterrarli. Il Perlico ancora è ottimo, piantato nella stessa forma che il Bolcefrino, pur-

purchè il terreno non sia così magro. Crederei opportuna anche la Nogara, piantata nell'istesso modo, ma in maggior distanza del Bolcesfino, mentre viene in ogni luogo. Di non poco utile finalmente saran quelle formate di Moraro, ed è facile l'introdurle, o colle radici levate dalle Morarie piantate a fosso; o colla semenza degli stessi Morari seminata in quarantia di S. Martino a solco in terren ben lavorato, mescolata però con acqua, e sterco bovino, non sotterrandola troppo. Nati poi li Moraretti finettino dall'erba, e si riducano in una sol fila distanti un piede l'un dall'altro, sotterrando affatto il detto solco.

Per non occupar il terreno, tali Siepi si piantano ai lati della terra meno fruttifera, cioè lungo ai prati; agli arzeri, ai pascoli, ai fossi, e dietro alle marogne, e ne' confini de' campi. Saria perciò di grande vantaggio a' Padroni l'allevarsi negli Orti ogni sorta di piante, e specialmente di Moraro, come dote necessaria, e principale di queste nostre Campagne.

C A P I T O L O II.

Modo di allevare le Siepi.

Si allevano dette Siepi col testarle a capo di tre o quattro anni al più, alquanto prima che comincino a buttare, basse a terra, cioè agli ultimi occhj. Dopo testate convien, quando hanno germogliato, schiarire i germogli acciò divengan più forti quei che vi restano; ed allorchè avranno fatto il legno ridurne quattro circa per pianta, di que' più dritti, per poterle arare liberamente fatte grandi. Chi poi bramasse unicamente la legna per fascine, e non per pali, tralasci di schiarirle: Passati altri tre o quattro anni, secondo la qualità del terreno, si fa nuovamente il taglio in quarantia di S. Martino, e in Marzo, pure basso alla testatura prima; e così successivamente. Si guardino queste Siepi, come anche ogn'altra pianta, dagli animali, massime quando son di prima buttate.

Del coltivare la terra intorno alle Siepi.

CAPITOLO III.

LE Siepi si devono arare tre volte all'anno con due solchi per parte, cioè distorle, zapparle, e colarle in Marzo, o in Luglio, e in Novembre, e non potendole arar da una parte, si facciano vangare.

S'avverte in ultimo luogo di mai non permettere che vengano arate, o vangate piante di qual si sia sorta, qualor il terreno sia troppo bagnato, o troppo asciutto; così pure che non siano pelate se non passato il mese d'Agosto, e li Morari se non brumati, incaricando perciò i Lavoranti a seminarvi il bisognevole di pascitura affinchè non siano necessitati a pelarle prima di detto tempo. Il tutto però riescirà vano quando non si metta per fondamento di tali diligenze, spese e fatiche il santo timor di Dio.



TRATTATO

SOPRA LA COLTURA DELLE API.

CAPITOLO PRIMO.

Della qualità delle Api, Re, e Pecchioni.

Abbiamo d' Aristotile nel suo Libro *de longa Vita*, cortissimo essere il vivere degl' Insetti, e pel contrario assai più lungo d' alcuni altri Animali quello delle Api, per la ragione che suppliscono queste col miele, cibo molto salutare, di cui continuamente si pascono, a quell' umido, e caldo, che loro manca, sino agli anni 6. vivendo, com' egli scrive nel 5. della Storia degli Animali, benchè in Virgilio si abbia sino alli sette, e nello Spettacolo della Natura sino alli otto, e di vantaggio ancora. Perilehè oltre l' altre molte prerogative, anche per questa meritano essere tenute in maggior pregio di quello che in fatti quì si tengono; non dovendosi però far di tutte la medesima stima, mentre non sono tutte ugualmente fruttifere, per esservene di molte sorte.

Si trovano delle Api grandi, nere, e pelose: altre men grandi, ma più rotonde, fosche, e di pelo rosso: altre più piccole, ma lunghe, di color alquanto più chiaro: altre in fine ancor più piccole, minute, più lunghe, più agili al volo, lisce di ventre acuto, e di color d' oro; e queste sono appunto le più fruttifere, come disse l' istesso Aristotile, delle quali conviene averne più cura delle altre; e lo approva anche Virgilio nel primo della Georgica

..... *Apibus quanta experientia parvis;*

o come altri leggono, *parvis*,

e nel 4. della Georgica:

Ardentes auro, & paribus lita corpora guttis.

Una d' esse se ne trova per ogni sciame più lunga, e più grossa di tutte senza aculeo, o sia pungiglione, di color più vivo, e più rossiccio, e di portamento grave, e posato, che tengono in conto di loro Madre, e Regina, come unica atta alla generazione, e sempre

fe-

feconda; essendo le restanti Vergini e con l'aculeo; la quale, corteggiata continuamente da dieci, o dodici Api, va deponendo le sue Ova in diverse cellette, ed esce rade volte dall'Alveare, come narra il Pivati nel suo Dizionario scientifico, abbenchè nello Spettacolo della Natura Tomo I. Dialogo 6. si tenga per certo, che abbia anch'essa il pungiglione, e possi essere corteggiata da molti Pecchioni destinate, come si crede, per la generazione; e ch'essa possa produrre per sino sei, o sette mila figliuoli all'anno.

Tutte però concorrono (segue il detto Autore) alla di essa fecondità, riscaldano alcune di dette Ova finchè diventano vermicciuoli; altre innaffiandoli, ed altre provvedendoli di nutrimento, finchè si sieno a poco a poco ingrossati; altre conducendoli seco a succhiare i fiori, riguardati da ognuna come propri figli; e nel fine dell'Estate, in cui finisce la generazione, uccidono tutt' i maschi, cioè i Pecchioni superflui:

Ignarum fucos pecus a praesepibus arcent.

Virgilio in detto lib. 4. perchè questi, come scrive il Columella nel suo libro 9. *de Re Rustica*; non solo non raccolgono, ma anzi consumano il raccolto altrui; *nam neque alimenta congerit, & ab aliis inventa consumit*; reggendo, e governando mirabilmente il tutto sotto una sola Regina, o, come altri vogliono, sotto un solo Re.

Li Re sono lisci, senza pelo, senza pungiglione, e più grandi delle Api ordinarie, dal detto Virgilio distinti in due sorte nel medesimo libro 4., cioè, altri squallidi, di color cenericcio, e pigri, quali sono i peggiori; altri risplendenti a guisa dell'oro, e di bell'aspetto, ed agili, e questi sono i migliori:

Altera erit maculis auro squallentibus ardens:

(Nam duosunt genera) hic melior insignis, & ore, Et rutilis clarus squamis; ille horridus alter.

Dalle memorie dell'Accademia delle Scienze, rapportate nello Spettacolo della Natura, abbiamo, che i Pecchioni sono senza pungiglione, e d'un color più scuro delle Api, e di questi ve ne sono due sorte; alcuni più lunghi, e più grossi dell'Api; altri della grandezza dell'Api ordinarie, quali si crede, ch'esse si riservino pe' bisogni dell'anno avvenire; ciò argomentando dal vedere la Regina nella Primavera nuovamente seconda.

CAPITOLO II.

Dell' opportuna situazione, e pastura per l' Api.

SI procuri di collocar le Api in luoghi rimoti, e non soggetti troppo al vento, perchè impedirebbe loro l' uscita alla Campagna, e maggiormente il ritorno che fanno cariche di cibo; così Virgilio lib. 4.

*Quo neque fit ventis aditus (nam pabula venti
Ferre domum prohibent.*

nè soggetti molto all' Eco, perchè il rimbombo di questa le farebbe fuggire, come osserva Lucrezio lib. 4. *de rerum Natura.*

I Giardini, Orti, o altri luoghi all' aperto, ma chiusi, onde non possino essere disturbate, perchè amanti della quiete, e non esposti nè al troppo freddo, nè al troppo caldo, sono i più opportuni; lontani però dalle Tegi, e dalli Tassi, perchè queste piante, a detta del Columella nel citato libro 9. sono loro nocive?

At tiliae solae ex omnibus sunt nocentes; taxi repudiantur.

Gli Alveari, o siano Cassette delle Api, si debbono porre presso qualche muraglia, alte da terra circa tre piedi, perchè non sieno sì facilmente molestate dalle Lucertole, Vermi, Biscie, o altri Animali nocivi, nè da' Venti; ed in quanto vi fosse timore de' ladri, si debbono tenere sotto l' occhio della Casa del Padrone, o del Custode, come insegna il citato Columella libro 9.

Queste Cassette debbono essere sostenute da pietre, o sodi legni, e che abbiano qualche coperto di sopra per difesa della intemperie delle stagioni; avvertendo che sieno rivolte a mezzo giorno, partecipando alquanto di Levante, perchè le Api possino sortire alla pastura nel primo spuntare del Sole: *ut apricum*, il detto Columella, *ba-beant Apes matutinum egressum*; e se fossero molte, si mettano pure filatamente unite, che ciò riesce anzi di maggior vantaggio, perchè, essendo Animali sociabili, quanto più sono vicine, tanto più a vicenda lavorano.

In oltre è necessario che le dette Cassette sieno difese dall' ombra di qualche pianta o altro, dal Sole dell' Estate, acciocchè il troppo caldo non disseccchi, nè liquefaccia il miele, in modo però che non resti impedito alle Api il libero transito, e non imbarazzi gli Alveari.

Obvia-

Obviaque hospitibus teneat frondentibus Arbos.

Lo stesso Virgilio nel citato Lib. 4. della Georgica.

I luoghi circonvicini, oltre quella quantità de' prati, e fruttari, che parerà propria secondo la moltitudine delle Api, si rendano fertili d'erbe, e di fiori, come sono il Timo, la Melissa, Isopo, Borrachine, Maggiorana, Salvia, Rosmarino, Lavanda, Puleggio, Spigo, gigli, Viole, Rose, Papaveri, Trifoglio, ed altre di qual si sia sorta convenienti al terreno, perchè, al dir, del detto Lucrezio, le Api succhiano il loro pascolo da qualunque fiore;

Floriferis in saltibus omnia libant.

e particolarmente in questi paesi le prime quattro, come più fioriranno dell'altre; avvertendo che di queste, o di quelle de' prati, ovvero de' campi ve ne sieno sempre in abbondanza, acciocchè in ogni tempo abbiano con che nutrirsi, e che non vi vadino perciò gli Animali quadrupedi a pascolare, onde non resti illesa detta loro pastura.

..... *Neque oves, hædique petulci.*

Floribus insultant, aut errant bucula campo

Decutiat rorem, & surgentes adterat verbas.

Virgilio sul principio d'esso Lib. 4.

Presso la situazione delle Api (quando non vi sia qualche Fonte) è duopo mantener loro da vicino in poca eminenza alcuni Vasi riempiti spesso d'acqua pura con entro de' sassi, o legnetti galleggianti, acciocchè le Api dalla vicinanza, e comodità dell'acqua si preservino dalle insidie delle galline, ed altri Animali che le divorino, e non corrano pericolo d'affogarsi; tenendole perciò lontane anche dall'acque stagnanti; ma particolarmente dalle putride, e così da qualunque altro odor cattivo, quale al dir d'Aristotile nella sua storia degli Animali lib. 9. sommanente abboriscono.

CAPITOLO III.

Degli Alveari, o seno Cassette per le Api, tempo di provvederle, e modo di trasportarle.

Molti sono gli abusi, che apportano pregiudizio alla conservazione delle Api nella materia, e forma delle Cassette, principalmente di questi Territorj, voglio dire,


dire, il dannosissimo costume di porle in Alveari fabbricati di legnami amari, da esse abborriti, uniti con chiodi, ed altri ferri, ovvero di scorze d'Albero, od' Alberi forati, dritti in piedi, e l'estremità d'eiss co' buchi del transito loro troppo grandi con altri disordini di gravissimo danno, disperdimento delle Api, e pregiudizio del loro lavoro; perchè, siccome le Api principiano i favi, cioè i fieli dell'alto, e li fabbricano a perpendicolo; come si osserva nello Spettacolo della Natura Tom. I. Dialogo 6. con gli Alveari essendo in tal guisa formati, riesce il sito tanto angusto, onde non si possono far quelle operazioni, delle quali a suo luogo si tratterà.

Per levar adunque codesti pregiudizj, debbonfi fabbricare gli Alveari di tavole di Pezzo, Pino, Larice, o altro Albero odorifero, ben secche, lisce, e pulite al di fuori, e nette da ogni tarlo della grossezza d'un oncia, ma rozze al di dentro, connesse con incastri, e stecchi ben forti senza ferro di veruna sorte, perchè questo le farebbe in qualche parte putrefare, come descrive il Falchini Scrittore Fiorentino nella sua nuova e vaga Istruzione intorno le Api, stampata in Fierenzel' an. 1747.

Riguardo poi alla forma di questi Alveari (segue il detto Autore) dee esser quadrilunga, a guisa appunto di Cassetta, non dritti in piedi, ma rivolti e distesi al lungo, perchè l'Api vi si mantengano, ed alberghino più lungamente, o comodamente, della lunghezza d'un braccio, ed un terzo di Firenze, che fa due piedi, e oncie tre di Verona, secondo l'insegnamento del Perini, dell'altezza, e larghezza di mezzo braccio Fiorentino, il quale fa oncie dieci, e un quarto del piede Veronese: con cinque buchi nel mezzo della facciata pel transito dell'Api, della grandezza delli loro Re, e non più: *Augustos habeant aditus*, parla chiaro Virgilio; perchè sieno meno molestate dagli Animali; fatti però trasversalmente: avvertendo, che sia ben chiusa ogn'altra fissura con sterco bovino fresco, perchè allo scuro lavorano meglio e nel Verno restano più riparate dalla rigidità dell'aere. Nell'altezza, e larghezza de' quali Alveari mi pare che il Falchini prenda qualche sbaglio; imperciocchè, formando le Api i loro favi a perpendicolo, della lunghezza d'un piede, e larghezza di mezzo piede, come saggiamente si osserva nel



Pag. 289.



nello Spettacolo della Natura ; ogn'uno vede dover essere queste misure parimenti d' oncie dodici, che compongono appunto il piede, se vi hanno da capire i fieli medesimi giusta la figura A.

S'avverte che i lati di dette Casette sieno fermati in dentro dal piano almeno un' oncia, ed il coperchio in fuori tre oncie da tutte le parti, perchè non v'entri l'acqua ; e che la facciata sia tutta d'un pezzo, e lascia anche di dentro, e che possa aprirsi, come nella figura B; per poter visitar liberamente le Api quando occorra, e levar i fieli, cioè le panne, come in seguito andrò descrivendo, senza apportar nocumento a questi industriosi, ed innocenti Animaletti tanto encomiati da S. Francelco di Sales, e da altri Santi : il che si vede praticato nella Toscana, ed in altri Stati, e Territorj simili a questi nostri, come ce ne fa testimonianza l'anzidetto Falchini.

E perchè non accada, come avviene a molti, di lasciare miseramente fuggire le Api per mancanza di Alveari nuovi, allorchè li vecchi sono per isciamare ; convien far preparare qualche tempo innanzi le Casette occorrenti da sostituire alli detti Sciami nello stesso giorno che le Api sciamano, poichè, appena levato il Sole del giorno seguente, sen volano talmente, che non è più possibile il riaverle.

Volendo poi trasportare da una contrada all'altra, o da una Villa ad un'altra, li detti Alveari, si avverte ciò doverfi fare in tempo di notte, e chetamente, comprendone gli Alveari con Pelli, o altro, per non ismovere i fieli, e non irritar le Api, come osserva il Vveckero lib. 8. *de secretis Apum* cap. 16. da cui pure si approva la già detta maniera di fabbricare gli Alveari medesimi con queste parole: *latitudo fit cubitalis; longitudo duorum cubiterum*; intendendosi per *latitudo*, anche l'altezza ; in conseguenza stesi al lungo, come ho dimostrato di sopra.

CAPITOLO IV.

Della vera maniera di trattenerle, e prendere le Api che sciamano.

Tutte le Api, come osservo nello Spettacolo della Natura (quando sono cresciute in tal numero, che non si possono più allevare nuovi parti senza restrignersi) sciamano unitamente d'accordo per abbandonare il proprio Alveare, e fuggirne furiosamente altrove; ma non tutte, dice il Falchini, a' tempi stessi; onde conviene prima sapere, che quelle che sciamano nel mese di Maggio, e tal volta anche in quello di Giugno, sono buone, e da praticar ogni diligenza per ripigliarle, ma quelle che sciamano dopo il detto mese di Giugno, sono cattive, e vagabonde, per il più senza Re, conseguentemente difficili a trattenerli nei loro Alveari, ancorchè si prendano, e da non farne conto, perchè provenute da fiele creati fuori di tempo.

Due segni osserva il Falchini precedere la loro partenza: il primo sono vari globi, che di se stesse formano intorno ai buchi del loro Alveare; il secondo è uno straordinario rumore che fanno dentro e fuori della Casetta, in tal guisa proseguendo otto giorni circa, fin tanto ch'escano i nuovi Re colla loro giovanile committiva, per abbandonare ad un tratto la loro vecchia abitazione desiderando nuova Casa; quella lasciando sempre in possesso delle Api Vecchie, come si raccoglie dallo Spettacolo medesimo della Natura.

In questo tempo si rende perciò indispensabile l'attenzione d'una guardia, perchè non fuggano senza speranza di riacquistarle, e particolarmente nelle ore più calde del giorno, nelle quali sogliono sciamare, affine di poterle trattenerle nel seguente modo.

Primieramente bisogna aver pronto qualche metallo da battere più, o meno, secondo che sono alte, o basse, per interrompere la loro fuga, che da esse viene intrapresa colla teorra delle loro trombe: sicchè perduto il di loro incamminamento, s'arrestano ingannate dal suono del detto metallo, che vien da esse creduto il sussurrar appunto delle medesime trombe, a detto del Falchini; oppure una campanella da suonare, per avvi-

avvisarle, che vi è a loro disposizione una Casa; questo squillo è da esse forse creduto un tuono, a cui debba succedere qualche pericolosa tempesta, come si osserva nello Spettacolo della Natura: qual suono dee farsi vicino a qualsivoglia sorta d'Albero, a cui più prossimo sia il sciamè che fugge, perchè più facilmente si fermino, e posino sopra i di lui rami, come dice l'istesso Falchini.

Fermate che siensi, debbonsi tosto spruzzar di Vino generoso, e così fare di quando in quando siano passate l'ore calde, perchè non intraprendino di nuovo la fuga; dalla quale poi, al dir del Falchini, sarebbe difficile arrestarle: avvertendo, che, se lo sciamè è notabilmente diviso in due parti, bisogna porre una parte in una Cassetta da per sé, e così l'altra parte in altra Cassetta, perchè questo è indizio, che in quella compagnia vi sono due Re, oppure ammazzare uno d'essi Re, non difficile a discernersi colla cognizione data nel primo Capo per porle, come a mio credere sarebbe meglio, in un solo Alveare, massime se fossero poche; giacchè soggiornano insieme pacificamente, fin tanto che v'è sito, come osservo nello detto Spettacolo della Natura.

Circa poi l'ore ventiquattro dello stesso giorno, deesi spruzzar nuovamente le dette Api come sopra, tagliare tosto il ramo, e scuoterle tutte ad un tempo nella nuova cassetta, strofinata prima al di dentro con qualche erba odorifera, ovvero, non essendo possibile tagliare il ramo, sottoporvi la cassetta, e scuotervele con la mano inguantata, o, non potendosi sottoporvela, in tal caso ponervela al di sopra, e farvele entrar col profumo, di cui si dirà nell'ultimo Capo; ivi lasciandola detta cassetta ben chiusa tutto il giorno seguente, coi buchi però aperti acciò possino entrarvi ancora quelle che fossero cadute a terra, o in vicinanza disperse, ad unirsi con le loro compagne. Quindi il custode dell'Api, passato il detto giorno, e chiusi li buchi di detta Cassetta, l'asporterà agiatamente al luogo destinato, riaprendo li buchi medesimi, come insegna il Falchini anzidetto. Se poi ritornassero a contrastare, debbonsi spruzzar di polvere; poichè s'acquietino, come vuole Virgilio nel mentovato lib. 4.

Pulveris exigui jactu compressa quiescent.

CAPITOLO V.

Del tempo, e modo di levare i fieli, e di ammazzare le Api.

IL vero tempo di levare i fieli, a detta del Columella nel citato lib. 9. c. 15. universalmente si è, quando le Api scacciano, ed uccidono li Pecchioni come inutili, e dannosi; il che fanno nel fine dell' Estate, terminata che sia la generazione: *Mox vere transatto sequitur, ut dixi, melis vindemia, propter quam totius anni labor exercetur, ejus maturitas intelligitur, cum animadvertimus fucos ab Apibus expelli, ac fugari, quod est genus amplioris incrementi simillimum Apis*; sicchè cadendo il fine dell' Estate in questi paesi alli 21. di Settembre, non si dovranno levare li fieli, cioè le panne, dalle Caslette, prima di detto tempo; altrimenti, levandoli, il miele riesce troppo acquoso, a causa dell' uova innate, e delli vermicciuoli non completi; in conseguenza anche di minor qualità, e peso, come dall' esperienza consta.

Quanto al modo: provveduti che sieno li custodi delle Api, come dice il Falchini, d' un paio di guanti di pelle, e d' un cappuccio con gli occhj piccoli pur di pelle, o di Panno da ripararsi le mani, e la testa fin sotto il corpetto (ma per maggior sicurezza, e prestezza io direi esser meglio, che il cappuccio fosse cogli occhj grandi di vetro corcavo;) di fumacchio della qualità che dirò; giusta le Figure C. D.; d' una brenta da porre li fieli, come la Figura E, d' un Costello col taglio d' ambe le parti, e colla punta piana, e tagliente lungo quanto è alta la Casletta da levar i fieli, giusta la figura F; e di un ferro inzancato pur tagliente da radere ogni immondezza, giusta la Figura G; come descrive il Columella nel citato cap. 15. *Duobus ferramentis ad hunc usum opus est, sexquipedali, vel paullo ampliore mensura factis, quorum alterum sit culter oblongus ex utraque parte acie lata, uno capite aduncum habens scalprum, alterum prima fronte planum, & acutissimum, quo melius hoc favi succidantur, illo eradantur, & quidquid sordium deciderit, attrahatur*. Indi aperta e rivolta la Casletta colla facciata a terra, e preso il fumac-

chio

C



D



E



G



25



chio acceso, debbono girarlo attorno ai fieli, che di mano in mano vorranno levare, perchè le Api a causa del fumo sieno lontane da chi opera, ed entrino frat- tanto in quei fieli nuovi, che vi dovranno lasciare per nutrimento di sì cari e utili animaletti fino all'erbenuo- ve; oppure, in vece del già detto riparo, si coprono bene la faccia, e le mani con denso impialstro fatto d' Olio comune con polvere di Fien Greco, e sugo di mal- ve silvestri, come insegna il citato Vveckero nel detto luogo: *Ad farinam scæni græci torrefacti malvæ silvestris succum affundito cum Oleo, faciatque mellis spissitudine, faciem, & nudas corporis partes largiter illine.*

S'avverte però di lasciarvi la metà di ciò che vi si troverà dentro, per non esser questi Territorj così fer- tili d'erbe florifere come quelli d'altri Stati, ne' quali vi lasciano la quinta, o la sesta parte, secondo che so- no soggetti più o meno all' Inverno, giusta il documen- to dello stesso Columella nel detto c. 15. *atque hic ta- men modus non est in omnibus regionibus certus, quo- niam pro multitudine florum, & ubertate pabuli Api- bus consulendum est;* con osservare di levar la roba vec- chia, la qual è scura, lasciandovi la nuova ch'è gial- la; e di far tutta questa operazione speditamente, e in ora fresca: *dies vero castrandi* (segue il medesimo Co- lumella) *ferè matutinus occupandus est; neque enim con- venit æstu medio exasperatas Apes laceffiri;* poi chiudere sotto la Cassetta, riponendola a suo sito come prima.

Il fumacchio più opportuno a questo effetto, si è di gomma galbana, perchè questa non arde, ed è assai o- dorifera, oppure d'un pezzo di quelle sacchette ad uso de' Torcoli, nelle quali vi sieno state spremute l'Uli- ve, alquanto spruzzate d'acqua, perchè nè meno que- sto farà fiamma, nè offenderà le Api, o, in mancanza di esso, potrà supplire il fumo di strazze lane bagnate, o di sterco bovino secco; riguardandosi da qualunque altra sorta di fumo, che non può essere per le Api se non mortifero, come affermano il Falchini, ed il Ru- cellai ambi Scrittori Fiorentini.

Se poi vi fosse qualche Cassetta scarfa di fieli per le disavventure, o, come vuole il Columella, per le ris- se patite dalle Api con li Fuchi, cioè Pecchioni, in conseguenza scarfa di provvigione per il futuro In- verno, non dovranno levarne alcuno, ma lasciarla in-

tatta, per non perdere le Api, che pur troppo colla scarshezza del lavoro indicano aver patito; onde possono alimentarsi, e rimettersi per l'anno seguente.

Quanto è biasimevole il costume di questi paesi di ammazzare le Api ogni due, o tre anni, come scrive anche il Tanara, con tanto discapito nel ricavato dell'entrata proveniente dal loro lavoro; altrettanto è commendabile quello di non ammazzarle se non ogni sei, o sette anni, come abbiamo nello Spettacolo della Natura Tom. I. Dialogo 6. e 7. per la ragione, che, fatte vecchie, siccome sciamano sempre le giovani, come accennai nel Cap. IV. in termine di detto tempo, le Camerette, o Cellette diventano molto anguste, cominciano a guastarsi, e le Api non solamente s'infacciscono, ma il loro lavoro ancora diviene soggetto a' Vermi, ed alle Tignuole; le quali trovano il modo d'insinuarsi in quelle Pelli, con cui i Vermicciuoli addobbano le mura della loro Cameretta, giusta l'osservazione fatta dall'Accademia delle Scienze di Parigi; avvertendo in tal caso di farle morire col zolfo, come nell'accennato Dialogo 7. e non in altra maniera, perchè il miele resti purgato, e di far questa operazione in qualche distanza dalla situazione delle Api, per non apportarle nocumento.

Perciò non posso, nè debbo tralasciar di pregare, ed esortare chiunque ad usar questa pratica facile, ed utile assai più di quella, che quì ingratamente s'usa contro la vita di questi Animaletti tanto amabili nella loro condotta, quanto nel loro lavoro, come si ha nello stesso Spettacolo della Natura, e contro il proprio interesse, come dall'esperienza d'ogni genere di persone degli sopracitati Territorj, e dal non esservi alcun Autore che tratti in contrario. Per il che mi persuado, che ognuno farà conto di questa pratica, tanto più quanto che, levando oga'anno la metà dei fiele, si consegue ogni tre anni (oltre la conservazione delle Api) un terzo di entrata di più di quello che si conseguirebbe coll'ammazzarle, come quì malamente si costuma; e i fiele medesimi incorrono anche minor pericolo di guastarsi, e le Api di ammalarsi a cagione della putrefazione del miele, di cui nell'ultimo capo si tratterà.

Della maniera di cavare il Miele, e la Cera.

CAPITOLO VI.

Nello stesso giorno, in cui si levano i fieli dalle Castette, si dee anche cavar subito il miele, finchè è tepido. e far questa operazione al Sole nell'ora calda, perch' esca più facilmente; passando in vasi di terra vetriati, o di legno ben netti, e senz' alcun odore, mediante una graticola di ferro, rame, o altro, fatta a guisa di colatojo; sopra la quale si posino e scolino quasi da per se tutt' i fieli, a riserva di quelli che fossero guasti. Questo primo miele è il più perfetto, e si chiama *Miel Vergine*.

Scolati che sieno, come sopra, li detti fieli, si debbono porre in un sacchetto di tela di Canape simile a quelli, coi quali si colano i Vini, e premere con due bastoni lisci, finchè si veda uscire a forza il miele. Questo per esser così spremuto, è molto men perfetto del primo; perciò dee porsi separato in altri vasi simili, e vien detto *Miele di strucco*.

Tutti questi Vasi poi debbonsi lasciare aperti qualche giorno, affinchè il miele si purghi, anzi, prima di chiuderli, bisogna levarli la schiuma, che di mano in mano andrà facendo, per poterlo serbar in detti Vasi purgato da ogni immondezza all'uso opportuno; servendo questo, giusta il parer del Rucellai, a mantener anche incorruttibili molte frutta, che vi s'immergessero, ed a condirle, se fossero acerbe:

Atti a dolcìr con esso acerbe frutta

Nespoli, e Sorbe, e l'agro umor dell' Uva.

come nelle sue osservazioni dice venir praticato particolarmente a Napoli.

Finalmente dopo levato il miele nella forma già detta, si debbono prima lavar i fieli con acqua pura, e porre in una Caldaja di rame pulita: dentro la quale (già coperti d'altra acqua netta) bollino per lo spazio d'un'ora in circa, affinchè la Cera resti purgata; levando frattanto con minestro forato l'immondezza che vengono a galla dell'acqua bollente.

Indi si faccia passare tutto ciò che resta in detta Caldaia, per un altro sacchetto simile, e, ripulita la Caldaia; pongasi di nuovo al fuoco con dentro un terzo d'acqua, e due di Cera, e, tostocchè questa sia ben liquefatta e pulita, si vuoti in vasi larghi spruzzati d'acqua, affinchè non vi si attacchi, per ridurla in formelle da vendita. Fin quì l'antecitato Falchini.

CAPITOLO VII.

Delle più necessarie avvertenze per li Custodi, e per la preservazione delle Api.

Dice Palladio riportato nel principio delle annotazioni al Rucellai, che le Api pungono acerbamente quelli che vi si accostano macchiati d'impurità: onde lasciò scritto *purus custos frequens & castus accedat*; come anche scrisse Virgilio nel sopradetto lib. 4.

*Illum adeo placuisse Apibus mirabere morem,
Quod nec concubitu indulgent, nec corpora segnes,
In Venerem solvunt.*

e però si regolino i Custodi a contenersi, se bramano ritornarsene dalla visita illesi.

Patiscono ancora la rabbia in modo particolare, quando le vien fatto qualche oltraggio, sicchè s'adirano talmente, che loro esce dalla bocca (al dir del predetto Rucellai) un certo vapor nero, che si alza per aria a guisa di picciola nube; ed allora è, che la loro puntura è molto pericolosa:

*Allora è il morso lor rabbioso, e infetto,
E sì mortal velen l'infiamma il cuore,
Che le cieche saette entro alle piaghe
Lasciano infisse con la vita insieme.*

Perciò osservi bene il Custode maggiormente quì il fatto suo, per non accostarvisi durante tal rabido loro umore, o dovendovisi accostare, spruzzarle prima di vino puro, fintantochè sianfi mitigate.

Al dire delli sopracitati Scrittori Fiorentini, le Api non si ammalano se non per mancanza di vitto, per la putrefazione del miele cavata dalle Farfalle, e dalli Cacchioni che sono le Api innate, e per la pestilenza, alla quale sono soggetti tutti gli Animali a causa della diversità degli umori.

Quan-

Quanto alla prima, debbono i loro Custodi tenerle provvedute fino alli nuovi fiori di miele, o in mancanza di questo, di Fichi secchi, Uve, o mele secche cotte prima nell' acqua, ponendole attorno alle Calsette per loro alimento.

Riguardo alla putrefazione, debbono levare defframente con il coltello descritto nel Cap. V. li fieli guastati senza toccare li sani, e profumarle leggermente con Timo, Centaurea, Santoreggia, volgarmente detta Salezola, o altr' erbe odorifere secche, affinchè s' invigoriscano, e rilancino, oppure coll' Incenso, come insegna il Falchini.

Rispetto poi alla pestilenza, ell' è come una spezie di diarrea, detta volgarmente rilasio di corpo, alla quale sono soggette, massime a ragione delli fiori d Olmi, e Titimali, detti dal Volgo lattaroli, che dissolvono i corpi loro, come scrive il Rucellai:

*Questo con chiari segni ti sia noto,
Massimamente in sul fiorir dell' Olmo,
O del verde Titimolo, che solue
I corpi lor, come Scamonio i nostri.*

e prima di lui il Columella nell' antecitato lib. 9. e 13. ove dice: *Maximus autem annuus earum labor est initio veris, quo Titimali floret frutex, & quo sameram Ulmi premunt; namque, sicut novis pomis, ita his primitivis floribus illecta avidè vescuntur post hybernæ famem, nil aliòquin citra satietatem, tali nocente cibo, quo, cum se affatim repleverint, profluvio alvi, nisi celeriter succurritur, intereunt, nam & Titimalus majorum quoque Animalium ventrem solvit, & proprie Ulmus Apium, eaque causa est, cur in Regionibus Italiae, quæ sunt ejus generis arboris confitæ, raro frequentes durent Apes.*

A questa malattia debbono li Custodi tosto rimediare, affinchè non muojano, col porre presso l' Alveare infetto qualche vaso di mosto cotto, o di perfetto, e spiritoso Vino dolce, ovvero di miele bollito in due porzioni d' acqua con galeghe, o rose secche; sopra ponendovi un velo, o sia pezzo di lana, o di tela bianca, acciò le Api vi si fermino, e non possino affogarsi; indi con il fumacchio acceso, suggerito nel Cap. 5., con odori, e profumi farle uscir fuori dalli fieli a succhiare il detto liquore per risanarle: *hoc modo*, così Plinio

nio nel lib. delle Api citato dal Columella suddetto ,
fuccurrendum laborantibus existimat.

Per tali motivi si rende necessario visitarle di quando in quando dalli primi di febbrajo per tutto maggio, e osservare se vi sieno neli in qualche parte corrotti, essendo questo un indizio certo, che le Api sono prive di nutrimento; oppure se ve ne sieno con alcune macchie nere scure, ch'è appunto un vero contrassegno di essere guasto il miele, o finalmente se vi sieno Api tramortite, dolenti, e morte, ch'è segno infallibile del già detto morbo, come afferma il Ruellai:

*Allor si sente un sussurrar più grave
Fra loro, e un suono doloroso, e mesto,
Allor le vedi impallidirsì in volto,
E farsi estenuate, orride, e secche.*

Non solamente nelli detti quattro mesi deve il Guardiano liberare le Api dalle sopradette infermità, e infezioni, ma ancora nelli quattro altri seguenti deve levarle dalle Casette li Ragni, che colle loro tele impediscono il bel lavoro del miele, e tener sgombro, cioè libero tutto l'interno delle medesime Casette da ogni erba, e immondizia, perchè non vi si annidi alcuna specie d'Animali, difendendole sopra tutto dalli Calabroni, e dalle Farfalle più nocivi alle Api d'ogni altro Animale, come avvertono li suddetti Scrittori Fiorentini.

Questi Calabroni sono di due sorte: i primi del color delle Api, che si chiamano dal volgo Martinelloni, o sia Mattoncini grossi, da' quali vengono uccise, i secondi di color nero, detti Graloni, quali entrano nelle Casette a succhiare il miele, e talvolta mangiano anche le Api che sono nelle loro Cellette. Per le quali cose ognuno vede quanto sia necessario ammazzarli senz'altra raccomandazione, mentre non possono le Api liberarsene da per se, avendo questi la cute durissima.

Per distruggere poscia le Farfalle, o sia Poveglie (che sono del miele la peste maggiore, come asserisce Eliano nel lib. 1. della Storia degli Animali, dalle quali si producono le Tignuole, che ne deriva poscia la putrefazione predetta) convien che il Custode delle Api le prenda per mezzo d'un vaso grande senza fondo, largo
nel

nel piede, e stretto nella cima con ivi un foro, da cui possa esalar il vapore, o sia un imbuto da vino, volgarmente lora, con entro un lume fin quasi a terra, ponendo questo vaso la sera fra le malve fiorite; nel qual tempo questi Insetti sogliono in esse più germogliare; oppure presso gli Alveari, che in poche ore (tratte dal lume in esso vaso per detto foro) le avrà da se stesse imprigionate, e morte. Del che se ne assicura il citato Rucellai, seguendo l'autorità del Columella, il quale parlando delle Urne di que' tempi, scrisse nell'antedetto lib. 9. cap. 14. *Qua tempore malvae florent, cum est caelum maxima multitudo, si vas aeneum simile miliario vespere ponatur inter alves, & in fundum ejus lumen aliquod dimittatur*, con quel che segue.

Un altro rimedio del Rucellai suggerisco, per allontanare non solo le dette Farfalle, ma ancora le Racole, o Formigoni alati, li Mosconi, ed i Scorpioni col fugo dell' Appio, cioè del seleno selvatico, e del Petrotello comunemente detto Perlemolo, o col fugo dell' Origano silvestre, detto volgarmente Pulegio dai fiori pavonazzi; strofinando con detto fugo la facciata delle Casette, mentre l'odor di questo li fa ritrarre dalle medesime.

Per animar finalmente ognuno a porre in pratica sì fatte osservazioni, e cautele, voglio aggiugnere, che in questi Paesi (per quanto vengo assicurato da persone degne di fede) mezzo Alveare di Api può rendere annualmente per lo meno due pesi di pane, le quali, purgandole, come si è detto, daranno almeno quaranta lire di miele, due terzi Vergine, ed un terzo di Strucco, e quattro lire di Cera di formella; del che facendone la prova, ne vedrà l'effetto, purchè le stagioni sieno temperate.

Molte altre cose intorno alla coltivazione delle Api avrei potuto dire; ma, siccome mia intenzione fu di dar solamente alla luce le principali, e dal Falchini con la lunga esperienza osservate, e dall'Accademia delle Scienze già per l'addietro approvate, come si può vedere nel più volte citato Spettacolo della Natura, e d' altri ancora in questo mio trattato rapportati; così non mi sono molto dilungato in tale materia, bastandomi d'aver succintamente detto quel tanto, che

vaglia ad illuminar il buon Cultore, e nello stesso tempo a levar quegli abusi sopra tale coltivazione, pe' quali ritrarre non potevasi quel vantaggio, che coll' uso di questo Trattato infallibilmente si ritarrà. Se questa mia fatica, la quale a solo pubblico beneficio ho intrapresa, verrà a buon grado ricevuta, in me si accrescerà sempre più il coraggio d'indagare con continue osservazioni i secreti di quelle cose, le quali sono più in uso per la coltivazione, nella quale è diletto, e utilità somma de ricavo.

